

Nález *Cephalanthera rubra* na Jablunkovsku (foto E. Chmiel) – ke krátkému sdělení Chmiel & Chmielová
Occurrence of *Cephalanthera rubra* (photo E. Chmiel) – to the short communication of Chmiel & Chmielová



Výskyt *Mantis religiosa* v okolí Metylovic (foto Z. Lukeš) – ke krátkému sdělení Lukeš & Solná
Occurrence of *Mantis religiosa* in Metylovice surroundings (photo Z. Lukeš) – to the short communication of Lukeš & Solná



Výskyt kudlanky nábožné (*Mantis religiosa*) v okolí Metylovic (Podbeskydská pahorkatina)

Occurrence of Praying Mantis (*Mantis religiosa*) in Metylovice surroundings (Podbeskydská pahorkatina Upland)

Keywords: *Mantis religiosa*, Mantidae, faunistics, northeastern Moravia, Czech Republic

Kudlanka nábožná *Mantis religiosa* (Linnaeus, 1758) je druh rozšířený po celé střední Evropě (KOČÁREK 2005). Dosud byl výskyt druhu *M. religiosa* na území České republiky popsán na jižní a střední Moravě, ve středních Čechách (JANŠTA et al. 2008) a několik recentních nálezů pochází ze severní Moravy: Javorník, Jeseník (HANÁK & HUDEČEK 2001); Velké Karlovice (PAVELKA & TREZNER 2001); Nošovice, Šumperk a Brníčko u Šumperka (CHOBOT 2009). V dnešní době dochází k intenzivnímu přirozenému šíření kudlanky nábožné na sever (CHLÁDEK 1998).

Podle HANÁKA & HUDEČKA (2001) jde v případě nálezů ve Slezsku o šíření sarmatskou cestou z jižního Polska. Ačkoliv byla kudlanka nalezena v blízkosti železniční tratě, autoři považují za málo pravděpodobné její zavlečení vlakem. Nevyklučují však ani možnost zavlečení nebo únik jedinců z chovů.

V okolí Metylovic (6376, 400-480 m n.m., GPS 49°36'49.642''N, 18°17'59.031''E) v Podbeskydské pahorkatině byl tento druh nalezen 3.IX.2009 (1M/1F a 1 ex. v letu, observ. Z. Lukeš a P. Solná). Oba exempláře byly světle zeleně zbarvené. Místem pozorování byla louka s V až JV expozicí, která byla ještě v roce 1991 spásána skotem. Poté byla louka 2x ročně kosena (březen-duben a září-říjen), dnes se na ní majoritně vyskytují trávy, především *Alopecurus pratensis* L. Dne 9.IX.2009 byl ověřen výskyt druhu na této lokalitě (49°37'12.47''N, 18°18'29.888''E), kdy bylo zaznamenáno 5FF/15MM na deseti procentech území lokality (PAVLÍK & KOCIÁN pers. comm.). Nalezený počet jedinců dokládá existenci rozmnožující se populace. Výskyt kudlanky může být přirozený vzhledem k jejímu dobrému šířicímu potenciálu (JANŠTA et al. 2008). Kromě možnosti přirozeného výskytu nelze vyloučit ani možnost náhodné nebo záměrné introdukce.

(HANÁK F. & HUDEČEK J. 2001: Časopis Slezského muzea Opava (A), 50: 137-142; CHLÁDEK F. 1998: Tetrax, 1(1): 1-8; CHOBOT K. 2009: <http://www.biolib.cz>, adresář: /cz/taxonmap/id144/; JANŠTA P., VRABEC V., STRÁNSKÝ J., MIKÁT M. & MOCEK B. 2008: Klapalekiana, 44: 21-25; KOČÁREK P. 2005: Řád Mantodea. In: KOČÁREK P., HOLUŠA J. & VIDLIČKA L. (eds.): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín; PAVELKA J. & TREZNER J. 2001: Příroda Valašska. ČSOP, Vsetín)

Zbyněk LUKEŠ & Petra SOLNÁ

CZ-739 49, Metylovice 367, e-mail: lukes@feec.vutbr.cz