
K výskytu kovaříka *Adrastus juditae* (Coleoptera: Elateridae) na území Jablunkovské brázdy

To the occurrence of click beetle *Adrastus juditae* (Coleoptera: Elateridae) in the area of the Jablunkovská brázda Furrow

Keywords: Coleoptera, Elateridae, *Adrastus juditae*, faunistics, northeastern Moravia, Czech Republic

Adrastus juditae Laibner, 1991 je relativně nedávno popsáný druh, jehož výskyt v České republice byl zaznamenán dosud pouze na území severní Moravy, a to zejména na lokalitách v okolí Ostravy (Vratimov, Svinov, Heřmanice, Přívoz), kde se vyskytuje hlavně v povodí řeky Ostravice (LAIBNER 2000). Jednotlivé kusy byly autorem sbírány nehojně na vegetaci porostlých březích řeky Ostravice, okolních ruderalních plochách a haldách hlušiny s náletovými dřevinami.

Z faunistického hlediska je proto zajímavý nález *Adrastus juditae* na území Jablunkovské brázdy, v katastru obce Bystřice nad Olší (6378), 20.VIII.2008, 1 spec. smykem *Salix* spp., leg., det. et coll. R. Szopa, revid. J. Mertlik. Místo nálezu se nachází na zachovalém, pravidelně zaplavovaném šterkovém břehu řeky Olše (49°38'0.946''N, 18°42'32.407''E), s porosty různých druhů *Salix* spp. a *Alnus* spp. Jedná se o první nález tohoto druhu učiněný mimo dosud zjištěná místa jeho pravidelného výskytu.

(LAIBNER S. 2000: Elateridae České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín)

Richard SZOPA

Bystřice nad Olší 332, CZ-739 95, e-mail: richard.szopa@seznam.cz

K výskytu tesaříka *Mesosa curculionoides* (Coleoptera: Cerambycidae) na severovýchodní Moravě

To the occurrence of long-horned beetle *Mesosa curculionoides* (Coleoptera: Cerambycidae) in the northeastern Moravia

Keywords: Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, *Mesosa curculionoides*, faunistics, Czech Republic

Mesosa curculionoides (Linnaeus, 1761) je druh široce rozšířený po celé Evropě ALTHOFF & DANILEVSKY (1997). V České republice se vyskytuje lokálně a řidce především v nižších a teplejších oblastech, zejména v oblasti původních Quercet, kde vyhledává hlavně listnaté lesy, aleje, parky a remízky. Vývoj larev probíhá pod kůrou a v povrchové části dřeva odumírajících větví nebo slabších kmenů listnatých stromů, např. *Quercus* spp., *Ulmus* spp., *Tilia* spp., *Juglans* spp., *Carpinus* spp. aj. Doba vývoje je udávána mezi 2-3 lety, výskyt samotných imág je uváděn mezi V.-IX. měsícem (SLÁMA 1998). O rozšíření tohoto druhu na severovýchodní Moravě existují sporadické zmínky ve staré literatuře, kde je uváděn jeho výskyt na lokalitách Opava, Bohumín a Těšínské hory, bez bližších údajů (HEYROVSKÝ 1930).