
K výskytu kovaříka *Adrastus juditae* (Coleoptera: Elateridae) na území Jablunkovské brázdy

To the occurrence of click beetle *Adrastus juditae* (Coleoptera: Elateridae) in the area of the Jablunkovská brázda Furrow

Keywords: Coleoptera, Elateridae, *Adrastus juditae*, faunistics, northeastern Moravia, Czech Republic

Adrastus juditae Laibner, 1991 je relativně nedávno popsáný druh, jehož výskyt v České republice byl zaznamenán dosud pouze na území severní Moravy, a to zejména na lokalitách v okolí Ostravy (Vratimov, Svinov, Heřmanice, Přívoz), kde se vyskytuje hlavně v povodí řeky Ostravice (LAIBNER 2000). Jednotlivé kusy byly autorem sbírány nehojně na vegetaci porostlých březích řeky Ostravice, okolních ruderalních plochách a haldách hlušiny s náletovými dřevinami.

Z faunistického hlediska je proto zajímavý nález *Adrastus juditae* na území Jablunkovské brázdy, v katastru obce Bystřice nad Olší (6378), 20.VIII.2008, 1 spec. smykem *Salix* spp., leg., det. et coll. R. Szopa, revid. J. Mertlik. Místo nálezu se nachází na zachovalém, pravidelně zaplavovaném šterkovém břehu řeky Olše (49°38'0.946''N, 18°42'32.407''E), s porosty různých druhů *Salix* spp. a *Alnus* spp. Jedná se o první nález tohoto druhu učiněný mimo dosud zjištěná místa jeho pravidelného výskytu.

(LAIBNER S. 2000: Elateridae České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín)

Richard SZOPA

Bystřice nad Olší 332, CZ-739 95, e-mail: richard.szopa@seznam.cz

K výskytu tesaříka *Mesosa curculionoides* (Coleoptera: Cerambycidae) na severovýchodní Moravě

To the occurrence of long-horned beetle *Mesosa curculionoides* (Coleoptera: Cerambycidae) in the northeastern Moravia

Keywords: Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, *Mesosa curculionoides*, faunistics, Czech Republic

Mesosa curculionoides (Linnaeus, 1761) je druh široce rozšířený po celé Evropě ALTHOFF & DANILEVSKY (1997). V České republice se vyskytuje lokálně a řidce především v nižších a teplejších oblastech, zejména v oblasti původních Quercet, kde vyhledává hlavně listnaté lesy, aleje, parky a remízky. Vývoj larev probíhá pod kůrou a v povrchové části dřeva odumírajících větví nebo slabších kmenů listnatých stromů, např. *Quercus* spp., *Ulmus* spp., *Tilia* spp., *Juglans* spp., *Carpinus* spp. aj. Doba vývoje je udávána mezi 2-3 lety, výskyt samotných imág je uváděn mezi V.-IX. měsícem (SLÁMA 1998). O rozšíření tohoto druhu na severovýchodní Moravě existují sporadické zmínky ve staré literatuře, kde je uváděn jeho výskyt na lokalitách Opava, Bohumín a Těšínské hory, bez bližších údajů (HEYROVSKÝ 1930).

Recentní nález na výše uvedeném území byl učiněn s katastru obce Nošovice (6376), 31.III.2008, 2 larvy, pod kůrou *Ulmus* sp., společně s larvami *Saperda punctata* Linnaeus, 1767, leg., det. et coll. R. Szopa. Tyto larvy byly dochovány v domácích podmínkách do stadia imaga. Uvedená lokalita se nachází na břehu řeky Morávky (49°39'47.879"N, 18°25'21.569"E). Jedná se o porost listnatých stromů s keřovým a bylinným podrostem, který je součástí Národní přírodní památky Skalická Morávka. Pro uvedenou oblast se jedná o faunisticky zajímavý nález.

(ALTHOFF J. & DANILEVSKY M. L. 1997: Seznam kozličev (Coleoptera, Cerambycoidea) Evropy. Slovensko Entomologicke Družstvo Štefana Michielija, Ljubljana; HEYROVSKÝ L. 1930: Seznam brouků republiky Československé 1. Cerambycidae. Tesaříci. Entomologické příručky 15 České Společnosti Entomologické, Praha; SLÁMA M. E. F. 1998: Tesaříkovití (Coleoptera – Cerambycidae) České republiky a Slovenské republiky. M. Sláma, Krhanice)

Richard SZOPA

Bystřice nad Olší 332, CZ-739 95, e-mail: richard.szopa@seznam.cz

Nález střevlíka *Harpalus froelichi* (Coleoptera: Carabidae) na severní Moravě

Record of ground beetle *Harpalus froelichi* (Coleoptera: Carabidae) in the northern Moravia

Keywords: Coleoptera, Carabidae, *Harpalus froelichi*, faunistics, Czech Republic

Harpalus froelichi Sturm, 1818 je severopalearktickým druhem, rozšířeným od Velké Británie po Vladivostok a Koreu. V České republice se vyskytuje ojediněle v nížinách, lokálně hojněji na velmi suchých až suchých stanovištích bez zastínění (stepi, okraje polí apod.) Upřednostňuje zejména písčité půdy (HŮRKA 1996). Druh je známý i z občasných přiletů na světlo (VESELÝ 2002). Na Moravě byl výskyt tohoto druhu zaznamenán dosud jen v její jižní části, severně po Vyškov (SKOUPÝ 2004). V oblasti severovýchodní Moravy (Slezska) nebyl jeho výskyt dosud známý (cf. STANOVSKÝ & PULPÁN 2006). V Polsku je *Harpalus froelichi* známý z více oblastí, udáván je rovněž z horního i dolního Slezska (BURAKOWSKI et al. 1974).

Výskyt druhu *Harpalus froelichi* ve Slezsku byl recentně potvrzen nálezem na lokalitě Bystřice nad Olší (6378), 19.VII.2007, 1 spec. na UV-světlo, leg. et coll. R. Szopa, det. R. Láska, revid. J. Stanovský. Místo nálezu se nachází na okraji obce Bystřice nad Olší (49°38'37.834"N, 18°42'41.174"E), na jižně orientovaném svahu pravidelně udržované zahrady u rodinného domu.

(BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M. & STEFAŃSKA J. 1974: Katalog fauny polski, Chrzaszczce, Coleoptera, Biegaczowate-Carabidae, czescz, 2; HŮRKA K. 1996: Carabidae České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín; SKOUPÝ V. 2004: Střevlíkovití brouci České a Slovenské republiky ve sbírce Jana Pulpána. Public History, Praha; STANOVSKÝ J. & PULPÁN J. 2006: Střevlíkovití brouci Slezska (severovýchodní Moravy). Muzeum Beskyd Frýdek-Místek; VESELÝ P. 2002: Střevlíkovití brouci Prahy (Coleoptera: Carabidae). Flóra, Praha)

Richard SZOPA¹⁾ & Jiří STANOVSKÝ²⁾

¹⁾ Bystřice nad Olší 332, CZ-739 95, e-mail: richard.szopa@seznam.cz

²⁾ Na výspě 18, CZ-700 30 Ostrava – Výškovice, e-mail: jstanovsky@quick.cz