

Recentní nález na výše uvedeném území byl učiněn s katastru obce Nošovice (6376), 31.III.2008, 2 larvy, pod kůrou *Ulmus* sp., společně s larvami *Saperda punctata* Linnaeus, 1767, leg., det. et coll. R. Szopa. Tyto larvy byly dochovány v domácích podmínkách do stadia imaga. Uvedená lokalita se nachází na břehu řeky Morávky (49°39'47.879''N, 18°25'21.569''E). Jedná se o porost listnatých stromů s keřovým a bylinným podrostem, který je součástí Národní přírodní památky Skalická Morávka. Pro uvedenou oblast se jedná o faunisticky zajímavý nález.

(ALTHOFF J. & DANILEVSKY M. L. 1997: Seznam kozličev (Coleoptera, Cerambycoidea) Evrope. Slovensko Entomologicke Družstvo Štefana Michielija, Ljubljana; HEYROVSKÝ L. 1930: Seznam brouků republiky Československé 1. Cerambycidae. Tesaříci. Entomologické příručky 15 České Společnosti Entomologické, Praha; SLÁMA M. E. F. 1998: Tesaříkovití (Coleoptera – Cerambycidae) České republiky a Slovenské republiky. M. Sláma, Krhanice)

Richard SZOPA

Bystřice nad Olší 332, CZ-739 95, e-mail: richard.szopa@seznam.cz

Nález střevlíka *Harpalus froelichi* (Coleoptera: Carabidae) na severní Moravě

Record of ground beetle *Harpalus froelichi* (Coleoptera: Carabidae) in the northern Moravia

Keywords: Coleoptera, Carabidae, *Harpalus froelichi*, faunistics, Czech Republic

Harpalus froelichi Sturm, 1818 je severopalearktickým druhem, rozšířeným od Velké Británie po Vladivostok a Koreu. V České republice se vyskytuje ojediněle v nížinách, lokálně hojněji na velmi suchých až suchých stanovištích bez zastínění (stepi, okraje polí apod.) Upřednostňuje zejména písčité půdy (HŮRKA 1996). Druh je známý i z občasných přiletů na světlo (VESELÝ 2002). Na Moravě byl výskyt tohoto druhu zaznamenán dosud jen v její jižní části, severně po Vyškov (SKOUPÝ 2004). V oblasti severovýchodní Moravy (Slezska) nebyl jeho výskyt dosud známý (cf. STANOVSKÝ & PULPÁN 2006). V Polsku je *Harpalus froelichi* známý z více oblastí, udáván je rovněž z horního i dolního Slezska (BURAKOWSKI et al. 1974).

Výskyt druhu *Harpalus froelichi* ve Slezsku byl recentně potvrzen nálezem na lokalitě Bystřice nad Olší (6378), 19.VII.2007, 1 spec. na UV-světlo, leg. et coll. R. Szopa, det. R. Láska, revid. J. Stanovský. Místo nálezu se nachází na okraji obce Bystřice nad Olší (49°38'37.834''N, 18°42'41.174''E), na jižně orientovaném svahu pravidelně udržované zahrady u rodinného domu.

(BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M. & STEFAŃSKA J. 1974: Katalog fauny polski, Chrzaszczce, Coleoptera, Biegaczowate-Carabidae, czescz, 2; HŮRKA K. 1996: Carabidae České a Slovenské republiky. Kabourek, Zlín; SKOUPÝ V. 2004: Střevlíkovití brouci České a Slovenské republiky ve sbírce Jana Pulpána. Public History, Praha; STANOVSKÝ J. & PULPÁN J. 2006: Střevlíkovití brouci Slezska (severovýchodní Moravy). Muzeum Beskyd Frýdek-Místek; VESELÝ P. 2002: Střevlíkovití brouci Prahy (Coleoptera: Carabidae). Flóra, Praha)

Richard SZOPA¹⁾ & Jiří STANOVSKÝ²⁾

¹⁾ Bystřice nad Olší 332, CZ-739 95, e-mail: richard.szopa@seznam.cz

²⁾ Na výspě 18, CZ-700 30 Ostrava – Výškovice, e-mail: jstanovsky@quick.cz