

Výskyt listokaze kovového *Anomala dubia* (Coleoptera: Scarabaeoidea) na říčních terasách řeky Odry u Ostravy a Bohumína

Occurrence of *Anomala dubia* (Coleoptera: Scarabaeoidea) on the river terraces of the Odra river near Ostrava and Bohumín

Keywords: faunistics, *Anomala dubia*, Rutelinae, Scarabaeoidea, Coleoptera, northern Moravia, Czech Republic

Abstract. In this article, recent data on *Anomala dubia* (Scopoli, 1763) from the surroundings of Ostrava and Bohumín are presented. Its occurrence was confirmed in the faunistic grid 6275 in Polanka nad Odrou and a new occurrence was recorded in the grid 6076 near Bohumín.

Listokaz kovový *Anomala dubia* (Scopoli, 1763) je druhem rozšířeným téměř po celé Evropě, mimo extrémních jižních a severních oblastí. Kromě zemí střední Evropy je znám i ze severního Španělska, Francie, Itálie, severu Balkánského poloostrova, takřka z celé evropské části Ruska, kde zasahuje až k Uralu a Pobaltí a známe jej i z písčitých oblastí Švédska a Finska (BALTHASAR 1956; BUNALSKI 1999).

V České republice je rozšířený ostrůvkovitě po celém území. Je to velmi lokální, jen místy hojnější druh, který vyhledává biotopy s písčitými a hlinitopísčitými půdami, ale nevyhýbá se ani šterkovým terasám řek. Vývoj probíhá v zemi, kde se larvy živí kořinky různých bylin, keřů nebo mladých stromů. Imaga se vyskytují přibližně od poloviny května do konce července. Létají za dne, a to velmi rychle na kratší vzdálenosti (BALTHASAR 1956).

Z Ostravska byl doposud publikován pouze jeden recentní nález z Proskovic u Ostravy z roku 1982, bez bližšího uvedení místa a okolností nálezu (ROHÁČOVÁ & ŽIDKOVÁ 2005). V příspěvku jsou uvedeny dvě nové lokality ležící na břehu Odry v Polance nad Odrou a u Bohumína.

Materiál

Moravia bor., Polanka nad Odrou, břeh řeky Odry (6275), 49°46'26,78''N, 18°11'33,15''E, 15.VI.2011, 12ex., sedících na písku a travní vegetaci, nebo poletujících nad zemí mezi 9:00-10:15 hod., leg., det. et coll. O. Sabol.

Lokalita leží na pravém břehu Odry. Je charakteristická uměle vytvořenou, pozvolna zarůstající písčnou pláží, která plynule přechází ve šterkovou koryto. Druh je zde poměrně variabilní v barvě krovek – od žlutohnědé přes zelenou až po tmavě modrou.

Moravia bor., Bohumín, část Starý Bohumín env., břeh řeky Odry (6076), 49°55'36,32''N, 18°20'14,80''E, 18.VI.2011, 2ex. smykem travní vegetace, leg., det. et coll. D. Hřebeň et I. Boščík, rev. O. Sabol; 22.VI.2011, 12ex., většinou na travní vegetaci mezi 10:30-11:30 hod., leg., det. et coll. O. Sabol (4ex.) et D. Hřebeň (8ex.).

Pravý břeh v meandru Odry. Šterková lavice z velké části zarostlá vegetací.

BALTHASAR V. 1956: Brouci listoroží – Lamellicornia. Díl I. Pleurosticti. Fauna ČSR 8. NČSAV, Praha, 288 pp.
– BUNALSKI M. 1999: Die Blatthornkäfer Mitteleuropas (Coleoptera, Scarabaeoidea). Bestimmung – Verbreitung – Ökologie. F. Slamka, Bratislava, 80 pp. – ROHÁČOVÁ M. & ŽIDKOVÁ M. 2005: Katalog sbírek brouků IV. Coleoptera: Scarabaeoidea. Katalogy a soupisy sbírek. Svazek 10. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek: 45 pp. + 16 pls.

Ondřej SABOL

Foksova 19, CZ-724 00 Ostrava – Nová Bělá, email: ondrej.sabol@seznam.cz