

Květena Vendryně a sousedních vsí (Slezsko, Česká republika)

Flora of the Vendryně village and adjacent villages (Silesia, Czech Republic)

Nikol KANTOROVÁ

Bystřice 691, CZ-739 95 Bystřice nad Olší, e-mail: nikol.kantorova@seznam.cz

Keywords: vascular plants, Moravian-Silesian Beskids, Silesian Beskids, Western Carpathians, Dolní Lištná, Horní Lištná, Bystřice, Nýdek, Vendryně

Abstract. This article deals with the vascular flora of the villages Vendryně, Nýdek, Bystřice and of the Trinec town districts Horní Lištná and Dolní Lištná in Silesia in the north-eastern part of the Czech Republic. A review of plant records is presented, and these literature records are evaluated and supplemented by field records from April 2012 to April 2015 and additionally also from spring and summer 2018. A survey of literature and botanical databases yielded 778 species. An important source of floristic data is the database of the Czech flora and vegetation Pladias. During the field survey, 560 species from those listed in the available sources were re-recorded and further 27 not yet reported species were found by the author in the study area. Altogether 805 species are known from the study area. Most plants found during my field research are documented by herbarium specimens stored at the Herbarium of Masaryk University (BRNU).

ÚVOD

Tento článek podrobně mapuje květenu cévnatých rostlin na území několika obcí v severovýchodním výběžku České republiky. Vychází ze stejnojmenné diplomové práce (KOŽDOŇOVÁ 2015), která byla výsledkem rešerše a terénního průzkumu v letech 2012–2015 a která byla obhájena na Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v roce 2015. Údaje a vlastní nálezy z diplomové práce jsou doplněny o údaje z databáze Pladias a pozdější terénní nálezy do léta roku 2018.

Hranice studovaného území se shodují s administrativními hranicemi obcí Vendryně, Bystřice, Nýdku a trineckých městských částí Horní Lištná a Dolní Lištná (obr. 1). Tyto vsi se nacházejí ve východní části Moravskoslezského kraje v historické oblasti Těšínského Slezska. Celková rozloha studovaného území je 72,2 km². Celé studované území se nachází v základním poli 6378 středoevropského síťového mapování a jen minimálně zasahuje do vedlejších kvadrantů (obr. 1).

Vendryní prochází hranice Chráněné krajinné oblasti Beskydy a Ptačí oblast Beskydy soustavy Natura 2000. Ve studovaném území se dále nachází Národní přírodní rezervace (NPR) Čantoria.

PŘÍRODNÍ POMĚRY STUDOVANÉHO ÚZEMÍ

Zkoumané území je součástí Vnějších Západních Karpat. Tato soustava je ve studovaném území tvořena čtyřmi celky. V území dominuje geomorfologický celek Slezské Beskydy (s největším vrcholem Velká Čantoryje, 995 m n. m.), které se táhnou přes všech pět obcí. Jen okrajově do území zasahuje celek Moravskoslezské Beskydy s dvěma vrcholy do výšky 750 m n. m. Významnou osu území tvoří řeka Olše protékající přes celek Jablunkovská brázda a přes Trineckou brázdu, která spadá do celku Podbeskydská pahorkatina (DEMEK & MACKOVČIN 2006). Nejnižší položené místo se nachází v nadmořské výšce cca 300 m v místě, kde řeka Olše opouští katastrální území Dolní Lištné.

Území je budováno vnější (menilito-krosněnskou) skupinou příkrovů, tedy flyšovými horninami vznikajícími sedimentací pískovců a jílovců a méně také sedimentací vápenců a silicitů (HRUBAN 2015). Vnější skupiny příkrovů jsou ve studovaném území tvořeny podslezskou a slezskou jednotkou.

Podslezská jednotka se nachází v části Podbeskydské pahorkatiny a Jablunkovské brázdy. Z podslezské jednotky je dobře patrné menilitové souvrství na výchozech v potocích Kompařov a Hluchová.

Tvoří jej tmavě hnědé až černohnědé silicifikované vápnité jílovce (HRUBAN 2015). Ve výchozech řeky Olše a především u ústí Jatného potoka jsou také patrné i další dvě souvrství podslezské jednotky, a to frýdecké a frýdlantské. Tato souvrství obsahují šedé, vápnité i nevápnité jílovce, uhelnaté vápence, hnědošedé jílovité pískovce a šedohnědé prachovité slínovce (ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA 2012).

Zbylou část území (Moravskoslezské Beskydy a Slezské Beskydy) vyplňuje jednotka slezská. Nejstarší stratigrafickou jednotkou godulského vývoje slezské jednotky je vendryňské souvrství (ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA 2012), dříve známé jako spodní vrstvy těšínské. Tato souvrství představují tmavohnědé silně vápnité jílovce a těšínské vápence (HRUBAN 2015). Vápence přecházejí ze severozápadu obce Vendryně do obcí Horní a Dolní Lištná, kde se vyskytují podél jižních svahů hraničního hřebene Slezských Beskyd. Mezi mladší souvrství Slezské jednotky, nacházející se ve studovaném území, pak patří souvrství godulské a istebňanské.

Jižní část území podél řeky Olše leží v klimatické oblasti MT7, která na obě strany přechází do chladnější a vlhčí oblasti MT2. Severozápadní část území podél řeky Olše je nejteplejší oblastí ve studovaném území; QUITT (1971) ji označuje jako MT9. Východní svahy Moravskoslezských Beskyd a hřeben Slezských Beskyd jsou naopak nejchladnější částí nazývanou chladná klimatická oblast CH7 (QUITT 1971).

Území odvodňuje řeka Olše, mezi jejíž hlavní přítoky patří Jatný potok, Kopytná, Hluchová, Kompařov, Lištnice a Vendryňka. Ze stojatých vod se zde nachází jen několik menších rybníků. Specifický biotop představuje vodní plocha na odkališti v Dolní Lištné, zachovaná po ukončení navážky popílku vznikajícího při spalování uhlí.

Nejčastějším půdním pokryvem jsou různé subtypy a variety kambizemí. Kambizemě se nacházejí převážně v členitém terénu v nadmořské výšce 450–800 m. Jsou většinou mělké, skeletovité a na pískovcovém podloží lehké (TOMÁŠEK 2000). V Trinecké brázdě a Jablunkovské brázdě se vyvinul převážně pseudoglej modální, který se vytváří na sprašových hlínách a jílech; pseudogleje jsou těžké kyselé půdy. Podél řeky Olše a potoka Hluchová se táhne úzký pás fluvizemí (nivní půdy), které jsou vázány na nevápnité uloženiny. Část obce Vendryně pokrývají i luvizemě oglejené, které obdobně jako fluvizemě vznikají na sprašových hlínách, smíšených svahovinách nebo hlubokých zvětralinách pevných hornin. Podél větších vodních toků se vyvinuly gleje modální a fluvické. Na vápencích a na karbonátově-silikátových horninách se vyvinuly kambické parendziny a rendziny s neutrální až slabě zásaditou půdní reakcí. Jsou to vysychavé skeletovité půdy (TOMÁŠEK 2000). Vrcholy Malého Kozince, Žďáru, Mionší a jihozápadní svah Velké Čantoryje jsou kryty rankery na pískovcovém a slepencovém podloží. V Dolní Lištné na ploše odkaliště se nachází mocná vrstva tvořená struskou, škvárou a popílkem, který je silně vysychavý, avšak špatně propustný pro vodu do větších hloubek.

V nejnižších polohách představují potenciálně přirozenou vegetaci dubohabřiny svazu *Carpinion* Issler 1931, konkrétně podél Olše dubohabřina lipová (*Tilio-Carpinetum* Traczyk 1962) a na ni navazující dubohabřina ostricová (*Carici pilosae-Carpinetum* Neuhausl et Neuhauslová-Novotná 1964). Na zbytku území jsou přirozenou vegetací květnaté a acidofilní bučiny. Moravskoslezské Beskydy a Slezské Beskydy by byly přirozeně porostlé karpatskou bučinou s kyčelnicí žláznatou (*Dentaria glandulosa-Fagetum* Klika 1927 em. Mat. 1964). V Moravskoslezských Beskydách na území Vendryně by malou plochou zasahovala také smrková bučina (*Calamagrostio villosae-Fagetum* Mikyška 1972). Dále by území pokrývala dubová bučina (*Carici brizoidis-Quercetum* Neuhausl in Mikyška et al. 1968) a podmáčená biková bučina (*Luzulo-Fagetum* Meusel 1937; NEUHAUSLOVÁ et al. 1998).

Většina území spadá podle fytogeografického členění do Karpatského mezofytika suprakolinního stupně, podokresu 84a. Beskydské podhůří (SKALICKÝ 1997). Podle biogeografického členění (CULEK et al. 2005) náleží do Podbeskydského bioregionu a čtvrtého vegetačního stupně. Vrchy Malý Kozinec a Žďár patří do Karpatského oreofytika submontánního a montánního stupně, tj. oblasti s chladnomilnou květenou, a to do fytogeografického podokresu 99a. Radhošské Beskydy, zatímco hraniční pohoří Slezské Beskydy spadá do fytogeografického podokresu 99b. Slezské Beskydy (SKALICKÝ 1997). Biogeografickým členěním spadají Beskydy do Beskydského bioregionu pátého vegetačního stupně (CULEK et al. 2005).

V současnosti ve studovaném území převažuje zemědělská půda, vlhké louky a lesy tvořené kulturní smrčinou se zbytky bučin. Lesy jsou obohaceny o horské druhy, např. hořec tolitovitý (*Gentiana asclepiadea*) a kyčelnicí žláznatou (*Dentaria glandulosa*). Květena na vápencích je naopak obohacena o druhy teplomilnější. V bučinách se přirozeně vyskytuje i jedle. V lesích je často přimísen jasan ztepilý (*Fraxinus excelsior*) a javor klen (*Acer pseudoplatanus*). Na kyselých půdách v nižších polohách je ve smrkových porostech příměs olše a dubu. Na spásaných loukách, které vznikly odlesněním, lze očekávat vegetaci svazu *Cynosurion* Tuxen 1947 a na vlhkých loukách vegetaci svazu *Calthion* Tuxen 1937 em. Lebrun et al. 1949. V Beskydské části pak najdeme spíše louky svazu *Arrhenatherion* Koch 1926 (CULEK 1996; CULEK et al. 2005).

DOSAVADNÍ BOTANICKÝ PRŮZUM ÚZEMÍ

Nejstarší konkrétní údaje o květeně studovaného území pocházejí z 19. století, kdy v této části Slezska bádali WIMMER (1832) a KOLBENHEYER (1862). Další údaje přinesly dvě květeny pruského a rakouského Slezska, které vyšly koncem 19. a počátkem 20. století. Jejich autory jsou FIEK (1881) a SCHUBE (1903–1904), přičemž druhý z autorů pro zpracovávané území převzal většinu údajů ze starší květeny Fiekovy.

Regionální práci Úvod ku květeně na československém Poodří přispěl k poznání květeny Slezska PODPĚRA (1921), kde v kapitole Významné areály rostlinné zmiňuje také Vendryni a Nýdek. Znalosti o květeně té části Slezska, která připadla nově vzniklému československému státu, shrnul o několik let později OTRUBA (1925–1926) ve shrnující studii Úvod ku květeně československého Slezska I. V první části studie se věnuje vzácnějším druhům slezské květeny a k území se vztahuje jediný údaj. Větší počet floristických záznamů z Bystřice, Nýdku, Vendryně i Lištné zmiňuje v souvislosti s výskytem některých druhů až v druhé části studie. Jak J. Podpěra, tak J. Otruba z velké části přejímali údaje od dřívějších autorů, kteří působili převážně ve Vratislavi.

O tři desetiletí později vydal syntetickou práci Význam moravské brány pro migraci teplomilných rostlin z panonské oblasti do slezské nížiny také ŠMARD (1956). Údaje týkající se studovaných území však převzal ze starších prací, a to především OTRUBY (1925–1926).

V padesátých letech 20. století se květenou Těšínska zabývali Z. Kilián a O. Kilián (KILIÁN & KILIÁN 1956). Další údaje z Těšínska uveřejnil Z. Kilián ještě ve dvou svých pozdějších pracích (KILIÁN 1960, 1969). V Příspěvků ke květeně Těšínska a Beskyd přináší několik nálezů MÍČKOVÁ (1958) a o rok později také DUDA (1959) v Příspěvků ke květeně Těšínska a Beskyd II.

K podrobnějšímu poznání květeny studovaného území významně přispěl floristický kurs z července roku 1975 ve Frýdku-Místku (SKALICKÝ et al. 1978). V území se pohybovalo několik exkurzí, jejichž vedoucími byli V. Skalický, F. Mladý, J. Houfek, M. Král a J. Vicherek.

J. Vicherek, rodák z Petřvaldu, se věnoval květeně Vendryně podrobněji již předtím a zapůjčil své terénní zápisky O. Zatloukalovi, který je využil ve své diplomové práci (ZATLOUKAL 1969). Ten přejímá údaje o místě výskytu rostlin také od již dříve zmíněných autorů a uvádí i druhy, které sám našel ve Slezských Beskydech. Sporé doklady k této diplomové práci se nacházejí v herbáři Masarykovy univerzity (BRNU), které cituji prostřednictvím herbářové databáze BRNU. Zatloukal cituje i sběry Z. Kiliána, které jsou uloženy ve Slezském muzeu v Opavě (OP). Vegetaci státní přírodní rezervace Čantoria zpracovala HÁJKOVÁ (1989). Velký počet fytoecologických snímků pro svou diplomovou práci o lesní vegetaci Slezských Beskyd zapsala KUDELOVÁ (1997). Ohrožené druhy a flóru na Jahodné studovala pro svou diplomovou práci KRZYŽANKOVÁ (2004). Ruderální flóru a vegetaci odkaliště v D. Lištné v letech 2007–2008 zkoumal v rámci středoškolské odborné činnosti LADÁNYI (2008). Vodním makrofytům se ve Slezských Beskydech a v Jablunkovském mezihoří věnoval RYDLO (2010).

Na poznání květeny studovaného území se dále podíleli fytoecologové, většinou při příležitostných návštěvách. Např. Z. Kropáč zapsal několik snímků plevelné vegetace ve Vendryni v roce 1974, E. Balátová-Tuláčková zapisovala fytoecologické snímky v okolí naučné stezky Jahodná v roce 1993, D. Láníková-Simonová studovala antropogenní místa v Bystřici v roce 2005, Š. Cimalová zapisovala vegetaci v Nýdku v roce 2001 a L. Šigutová v povodí Kopytné v roce 2008. Pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR mapovala biotopy pro soustavu Natura 2000 M. Derková v roce 2001 v přírodní rezervaci (PR) Čerňavina, která hraničí s obcí Vendryně. Lesní plochy v Bystřici mapoval O. Holuša v roce 2002, J. Wolfová zapisovala vegetaci na kopci Žďár v roce 2003 a v nivě Olše a potoce Kopytná K. Hustáková v letech 2003 a 2004. Tyto biotopy revidovali a mapování aktualizovali B. Hutýrová v roce 2007, P. Chytil v roce 2009 a R. Višňák v roce 2012. V témže roce zpracovali R. Kočvara a A. Czerník biologické hodnocení úprav potoka Kopytná. Inventarizační průzkum NPR Čantoria prováděla v roce 2014 S. Čížková. Další terénní šetření pro Agenturu ochrany přírody a krajiny prováděla I. Páleníková v roce 1990 a J. Ševčík v roce 2015. Zápisy na lesnických typologických plochách ve studovaném území pořizoval v letech 1965–1976 M. Satora. V herbářích muzeí ve Frýdku-Místku, v Novém Jičíně a v Českém Těšíně jsou uloženy sběry muzejních botaniků A. Hájkové, M. Sedláčkové, R. Míčkové a K. Švendové, které ve studovaném území průběžně bádały.

Také v jiných regionálních muzeích, např. ve Slezském zemském muzeu v Opavě nebo v Ostravském muzeu v Ostravě, se nacházejí mnohé herbářové doklady dalších botaniků, profesionálních i amatérských, kteří studované území jednorázově nebo opakovaně navštívili. Mezi ně patří S. Trapl, F. Kryška, J. Gill, E. Burša, K. Kubát, I. Knápková, R. Řepka, J. Čáp, M. Kociánová, D. Hlišnikovský, D. Křenek a J. Michalík, dále pak L. Ekrť a D. Tlalka, kteří se zabývali především kapradinami, a konečně i R. Vašut, B. Trávníček a J. Holub, kteří sbírali druhy rodu *Rubus*. Všechny terénní nálezy botaniků uvedených v tomto odstavci jsou uloženy v různých databázích, které jsou dostupné přes Databázi české flory a vegetace (KAPLAN et al. 2015).

METODIKA

Článek vychází z textu diplomové práce (KOŽDOŇOVÁ 2015) a je doplněn o nové údaje z databázi a nové floristické nálezy z pozdějších jednorázových terénních průzkumů. Jsou zde vzaty v potaz i výsledky revize některých herbářových dokladů nebo ověření výskytu dalších druhů pozdějším terénním průzkumem.

Mapu s topografickým vymezením studovaného území jsem připravila v programu ArcGIS verze 10. (ESRI 2013).

K rešerši jsem použila údaje z regionální floristické literatury, citované v předchozí kapitole. Z národních monografií jsem excerpovala data zejména z Květeny České republiky (HEJNÝ & SLAVÍK 1990, 1992, 1997; SLAVÍK & ŠTĚPÁNKOVÁ 2004; SLAVÍK 1995, 1997, 2000; ŠTĚPÁNKOVÁ 2010) a dále práce o rozšíření jednotlivých druhů, např. jestřábníku hroznatého (*Hieracium racemosum*; MOLTAŠOVÁ et al. 2014) nebo o rozšíření vzácných druhů polních plevelů (CIMALOVÁ 2006).

Popisy některých lokalit bylo třeba upravit. Například lokalita z floristického kurzu (SKALICKÝ et al. 1978) uváděná jako *Bystřice: les Z potoka Kopytná podél modré turisticky značené cesty 2,7 km JV [správně JZ] žel. stanice Bystřice n. Olší...* se podle slovního popisu i přiložené mapy nachází na území Vendryně. V práci bratrů Kiliánových (KILIÁN & KILIÁN 1956) se uvádí lokalita *Babí hora u Nýdku*; zde se však domnívám, že se nacházejí spíše v Polsku, jsem převzala obvykle v původním znění i jazyce. Z diplomové práce ZATLOUKALA (1969) jsem lokality vztahené k *Vavříkové hoře* pravopisně opravila na *Vavřkovu horu*.

Veškeré údaje jsem citovala z původního nebo alespoň nejstaršího zdroje, který jsem měla k dispozici, tudíž znovu citované a přejímané údaje jsem do rukopisu nezařadila. Starší údaje, u kterých nešlo jednoznačně rozhodnout, zda se vztahují k české, anebo polské straně hraničního hřebene, a údaje, z nichž vyplývá, že se nacházejí spíše v Polsku, jsem převzala obvykle v původním znění i jazyce.

Všechny takto získané údaje jsou doplněny záznamy z České národní fytoecologické databáze (ČNFD), Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP) a Databáze lesnické typologie (DLT), které byly v době přípravy rukopisu diplomové práce dostupné v Databance flóry České republiky (DANIHELKA et al. 2009). Situace se změnila s postupným rozvojem databáze Pladias (KAPLAN et al. 2015–2018), do které byly převedeny tytéž datové soubory a postupně i některé další. Z nich jsou pro dané území relevantní zejména Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti (ND MSP ČBS), Slavíkův floristický archiv, Floristická dokumentace (Fldok), Excerpce pro atlas (srov. KAPLAN et al. 2015–2018) a jednotlivými nálezy také Databáze rostlin kraje Vysočina (Vysočina). Vzhledem k obrovskému a dosti nepřehlednému množství údajů, které je v databázích k dispozici, jsem nepřebírala veškeré nálezy všech sběratelů, ale většinou jediný údaj s nejmladším datem nálezu, a to jen k obcím a místním částem, u nichž doposud nebyl v jiných zdrojích uveden záznam o výskytu daného druhu. U každého nálezu je uvedena zdrojová databáze. Výjimkou jsou druhy, jejichž mapy vyšly v řadě článků věnovaných rozšíření cévnatých rostlin v České republice (KAPLAN et al. 2015–2018) a vycházejících z databáze Pladias 1–7. V tomto případě je uveden zkrácený odkaz na příslušný článek, a to formou sec. PLADIAS 1–6 u již uveřejněných částí, případně PLADIAS 7 u připravovaného dílu. U těchto prací je výčet přijatých nálezů uveden v elektronickém dodatku, kde je možné najít podrobnosti.

Pro často se opakující lokality byl vytvořen seznam lokalit se zkratkami (kódy), viz. níže. Kódy jsem přidělila lokalitám z floristického kurzu Československé botanické společnosti (SKALICKÝ et al. 1978), diplomové práce KUDĚLOVÉ (1997), práce středoškolské odborné činnosti LADÁNYIHO (2008), lokalitám fytoecologických snímků vodní a mokřadní vegetace (RYDLO 2010), jakož i dalším často se opakujícím lokalitám z databázi ČNFD a NDOP.

V seznamu zjištěných taxonů jsem u běžných a hojných druhů nahradila všechny popisy lokalit z výše uvedených zdrojů příslušným kódem. Pokud byly údaje o výskytu i v další literatuře, pak jsem uvedla jejich citace. Konkrétní lokality lze ověřit jak v primárních zdrojích, tak v mé diplomové práci (KOŽDOŇOVÁ 2015). U většiny chráněných a méně běžných druhů, pro něž existuje jen málo publikovaných záznamů a které byly nalézány v oblasti jen sporadicky, jsou lokality uvedeny v plném znění a v závorce je uveden také kód lokality (viz. níže).

Terénní průzkum pro diplomovou práci probíhal v letech 2012 výhradně na území Vendryně. V letech 2013–2015 pak průzkum pokračoval zejména ve zbývajících vsích a s menší intenzitou ve Vendryni. Průzkum probíhal na základě vytipování několika lokalit v různých částech území a také na základě ověřování a vyhledávání publikovaných lokalit. Některé lokality jsem navštívila v několika ročních aspektech.

Kromě toho byly doplněny, většinou jen k neověřeným druhům z diplomové práce, i nálezy z terénních exkurzí na jaře a v létě 2018, a to včetně floristického minikurzu MSP ČBS ve Slezských Beskydech a Jablunkovském mezihoří v červnu 2018. Druhy, které jsem během tohoto minikurzu v terénu viděla, jsou uvedeny jako mnou ověřené druhy spolu s odkazem na připravovanou zprávu (TKÁČIKOVÁ in prep.).

Lokality vlastních nálezů z Vendryně z jižních a jihovýchodních svahů Vruzné se nacházejí především na svazích Wrózné, jejíž vrchol s nadmořskou výškou 571 m leží na česko-polské hranici, ale všechny vzdálenosti uvedené v seznamu floristických nálezů jsou vztaheny k vrcholu Vruzná na české

straně s kótou 530 m n. m. Dále jsem vzdálenosti vztahovala k následujícím vrcholům: v katastru Vendryně – Babí hora (492 m n. m.), Ostrý vrch (709 m n. m.), Prašivá hora (542 m n. m.), Vavřkova hora (530 m n. m.), Malý Kozinec (654 m n. m.) a Žďár (748 m n. m.); v katastru Dolní Lištná – Jahodná (407 m n. m.) a Hradisko (405 m n. m.); v katastru Horní Lištná – k vrcholu Vružné (530 m n. m.); v katastru Bystřice a Nýdek – Loučka (835 m n. m.) a Polední (672 m n. m.); a konečně pouze v katastru Nýdek – Velká Čantoryje (995 m n. m.), Mionší (745 m n. m.), Vrchhora (483 m n. m.), Malý Sošov (763 m n. m.) a Velký Sošov (886 m n. m.).

Dokladový herbář k diplomové práci, který čítá 614 položek, byl předán do herbáře Masarykovy univerzity (BRNU 621241, 624796–625031, 633343–633717, 648881–648882). Také některé sběry z roku 2018 byly předány do herbáře Masarykovy univerzity. Texty herbářových sched, nacházející se v herbářové databázi Virtual Herbaria (HERBARIUM WU 2018), jsou přístupné na adrese <http://herbarium.univie.ac.at/database/search.php>. Tam lze najít i záznamy o revizích a GPS souřadnice všech dokladovaných druhů. Součástí jednotlivých záznamů jsou i sběratelská čísla uvedená také v textu. Nedoložené nálezy lze najít v databázi Pladias (KAPLAN et al. 2015–2018), kromě druhů nalezených během floristického minikurzu v červnu 2018 (TKÁČIKOVÁ in prep.), aby nedošlo k duplicitě těchto nálezů. V této databázi jsou všechny lokality podrobně popsány včetně GPS souřadnic. Z tohoto důvodu nejsou v tomto článku GPS souřadnice součástí popisu lokalit. GPS souřadnice u starších publikovaných sběrů nelze spolehlivě doložit.

Ve floristickém seznamu jsou pro každou obec nejprve uvedeny údaje, které jsem získala z literatury nebo databází. Starší, široce lokalizované nálezy, které se nedaly vztáhnout k žádné obci, jsou uvedeny na začátku hned za jménem druhu. Za dlouhou pomlčkou (—) následují lokality vlastních nálezů. Vykřičník v závorce s rokem sběru (např. 2014!) u vlastních nálezů odkazuje ke sběrům, které sice revidoval nebo kontroloval dr. J. Danihelka, avšak nebyly zařazeny do dokladového herbáře. Iniciály NK s pořadovým číslem a s rokem sběru (např. 2012 NK001) odkazují na čísla sběrů na schedách v herbářové databázi. Je-li za vlastním názvem uveden pouze rok (např. 2013), znamená to, že v tomto roce byl druh v terénu zaznamenán, ale nebyl sebrán. Komentáře a informace o všeobecném výskytu ve zkoumaném území jsou uvedeny ve zvláštním odstavci pouze u druhů, které jsem sama potvrdila.

U hojných druhů neuvádím veškeré nálezy ani konkrétní lokality. V textu uvádím pouze rok, kdy byl druh v dané obci zaznamenán, případně skutečnost, že je to doložený nález. Konkrétní výčet lokalit lze najít v diplomové práci (KOŽDOŇOVÁ 2015).

Taxonomické pojetí a jména cévnatých rostlin se řídí Klíčem ke květeně České republiky (KUBÁT et al. 2002) s výjimkou druhů *Centaurea erdneri*, *Dryopteris borrieri* a *D. cambrensis*. Tato jména jsou přejata z nejnovějšího seznamu cévnatých rostlin české květeny (DANIHELKA et al. 2012). Jména *Polystichum setiferum*, *Rubus macromontanus* a *Rubus montanus* jsou převzata z databáze Pladias (KAPLAN et al. 2015). Autorská jména taxonů už proto nejsou uváděna.

Za jmény zavlečených rostlin jsou v závorce uvedeny informace o době zavlečení a invazním statutu taxonu (PYŠEK et al. 2012), případně stupeň ohrožení podle třetího vydání Červeného seznamu cévnatých rostlin květeny České republiky (GRULICH 2012), jak jej souhrnně uvádí DANIHELKA et al. (2012).

Pokud považuji některé floristické údaje za mylné nebo jinak problematické, není jméno taxonu tučně zvýrazněno.

Význam zkratk určující stupeň ohrožení (GRULICH 2012): **C1** – kriticky ohrožený taxon; **C2** – silně ohrožený taxon; **C3** – ohrožený taxon; **C4a** – vzácnější taxon vyžadující další pozornost – méně ohrožený; **C4b** – vzácnější taxon vyžadující další pozornost – dosud nedostatečně prostudovaný; **aut** – hodnocena pouze autochtonní populace.

Význam zkratk určujících původ a zdomácnění (PYŠEK et al. 2012): **ar** – archeofyt, tj. rostlina zavlečená do konce 15. století; **neo** – neofyt, rostlina zavlečená v novověku, tj. od začátku 16. století; **cas** – přechodně zavlekaný nebo přechodně zplaňující druh (casual); **nat** – zdomácnělý druh (naturalized); **inv** – invazní druh (invasive).

Akronymy herbářů použité v druhovém soupisu: **BRNL** – Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie Mendelovy univerzity v Brně; **BRNU** – Ústav systematické botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno; **ČESK** – Muzeum Těšínska, Český Těšín; **FMM** – Muzeum Beskyd Frýdek-Místek; **MP** – Východočeské muzeum v Pardubicích; **NJM** – Muzeum Novojičína, Nový Jičín; **OL** – Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; **OP** – Slezské zemské muzeum, Opava; **OSM** – Ostravské muzeum, Ostrava; **PR** – Botanické oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea v Praze; **PRA** – Botanický ústav Akademie věd České republiky, Průhonice; **PRC** – Herbářové sbírky Univerzity Karlovy v Praze; **ZMT** – Muzeum Vysočiny Třebíč.

Herbářové doklady jsou citovány příjmením sběratele, rokem sběru a akronymem herbáře (např. Zatloukal 1968 BRNU), zatímco nedoložená terénní pozorování jsou citována rokem nálezu, jménem sběratele a zdrojem dat (např. 2004 Hustáková in NDOP). Tento úsporný způsob umožňuje snadno odlišit doložené nálezy, nedoložená terénní pozorování a literární citace (autoři literárních zdrojů jsou vyznačeni kapitálkami).

V textu jsou dále použity následující zkratky: **sev.** – severní/severně; **vých.** – východní/východně; **již.** – jižní/jižně; **záp.** – západní/západně; **sv.** – severovýchodní/severovýchodně; **ju.** – jihovýchodní/jihovýchodně; **jz.** – jihozápadní/jihozápadně; **sz.** – severozápadní/severozápadně; **ssv.** – severoseverovýchodní/severoseverovýchodně; **vsv.** – východoseverovýchodní/východoseverovýchodně; **vju.** – východjihovýchodní/východjihovýchodně; **jju.** – jihojihovýchodní/jihojihovýchodně; **jjz.** – jihojihozápadní/jihojihozápadně; **zjz.** – západojihozápadní/západojihozápadně; **zsz.** – západoseverozápadní/západoseverozápadně; **ssz.** – severoseverozápadní/severoseverozápadně; **žel.** – železniční.

Seznam kódů často se opakujících lokalit

Bystřice

1975 Houfek in SKALICKÝ et al. (1978)

- B1 – křoviny, okraj lesa a modře značené turistické cesty poblíž mostku přes potok Kopytná 1,1 km jjz. od železniční (dále žel.) stanice Bystřice nad Olší, 340 m n. m.
- B2 – okraj pole poblíž žel. stanice Bystřice nad Olší, 330 m n. m.

Kudělová in KUDĚLOVÁ (1997)

- B3 – pravý břeh Olše, olšina proti ústí Kopytné, střední část, 1996
- B4 – pravý břeh Olše, olšina proti ústí Kopytné, sev. část, 1996
- B5 – pravý břeh Olše, olšina proti ústí Kopytné, již. část, 1995
- B6 – pravý břeh Olše, olšina proti ústí Kopytné, ju. část, 1996
- B7 – pravý břeh Olše, olšina proti ústí Kopytné, sz. část, 1995
- B8 – pravý břeh Olše, poblíž ústí Hluchové, 1996
- B9 – pravý břeh Olše poblíž mostu na Karpentnou (asi 100 m), 1996
- B10 – pravý břeh Olše poblíž mostu na Karpentnou (asi 300 m), 1996
- B11 – levý břeh Olše vých. od místní části Na Pasekách, 1996
- B12 – V Pasekách, asi 0,5 km záp. od osady, 1996
- B13 – V Pasekách, asi 0,3 km od konečné zastávky autobusu, 1996
- B14 – V Pasekách, asi 0,5 km sv. od Loučky (kóta 835 m), 1996
- B15 – V Pasekách, asi 0,8 km záp. od Loučky (kóta 835), 1996
- B16 – V Pasekách, asi 0,5 km záp. od Loučky (kóta 835), 1996
- B17 – V Pasekách, podvrcholové jz. svahy Loučky (kóta 835 m), 1996
- B18 – Suchý, sv. svah Javorového (kóta 627 m), 1996
- B19 – Suchý, ssz. rozsocha Loučky (kóta 835 m), 1996
- B20 – Suchý, jz. úbočí Poledního (kóta 656,8 m), 1996

2005 Láníková-Simonová in ČNFD

- B21 – ju. okraj obce, u žel. přejezdu poblíž hnojiště asi 1 km jju. od kostela
- B22 – zarostlá plocha uprostřed louky, asi odvodněný močál, sv. okraj obce asi 1 km sv. od kostela
- B23 – okraj asfaltové cesty, mez u louky, sv. okraj obce asi 1 km sv. od kostela
- B24 – sjížděná plocha poblíž hnojiště u žel. přejezdu, vjezd na louku, ju. okraj obce asi 1 km jju. od kostela
- B25 – kamenná zídka kolem dřevěného kostelíka naproti domu č. 857

Dolní Lištná (dále jen D. Lištná)

1975 Vicherek in SKALICKÝ et al. (1978)

- DL1 – fragment *Querco-Carpineta* na sz. a záp. svahu kóty 403, 370–400 m n. m.
- DL2 – příkopy a travníky podél silnice směr Horní Lištná, 350 m n. m.
- DL3 – travinná vegetace na vých. a sev. svahu kóty 403 sev. od obce, 370–400 m n. m.
- DL4 – polokulturní louka v kulminační části (náhorní plošina) kóty 403, 400 m n. m.

1975 Skalický in SKALICKÝ et al. (1978)

- DL5 – vých. část obce, 340 m n. m.
- DL6 – středně zalesněná část vápencového hřebene Jahodná, 0,5 km ju. od ústí potůčku již. od středu obce, 400 m n. m.
- DL7 – osada Sosna, ju. exponovaný les podél červeně značené turistické lesní cesty 1 km sv.–vsv. od osady, 390 m n. m.
- DL8 – osada Sosna, již. okraj lesa ve vých. části vápencového pahorku Jahodná, 0,6 km ssv. od osady, 420 m n. m.
- DL9 – křovinaté porosty a travnaté lemy v záp. části vápenného vrchu Jahodná (mezi sv. cípem Trince a potůčkem s tokem k jihu ze středu obce), 380 m n. m.
- DL10 – travnaté a křovinaté porosty vápencového hřebene Jahodná u cesty do Sosny, 410 m n. m.
- DL11 – opuštěný vápencový lom na sev. svazích Jahodné, 400 m n. m.

- DL12 – okraj lesa vápencového hřebene Jahodná, 400 m n. m.
 DL13 – křovinaté svahy 0,3 km vých. od vých. okraje obce, 360 m n. m.
 DL14 – sz. okraj lesa u vsv. okraje města, 350 m n. m.
 DL15 – vsv. část města při silnici do Vendryně přes Sosnu, mezi údolím Olše a pravostranným přítokem, 320 m n. m.
 DL16 – u potůčku 1,7 km sv. od Babí hory (kóta 492), nejvýchodnější domky obce, 340 m n. m.

1993 Balátová-Tuláčková in ČNFD

- DL17 – naučná stezka Jahodná

Kudělová in KUDĚLOVÁ (1997)

- DL18 – Sosna, asi 300 m již. od nemocnice, 1996
 DL19 – poblíž silnice asi 200 m sv. od nemocnice, 1996
 DL20 – poblíž silnice asi 150 m vsv. od nemocnice, 1996
 DL21 – asi 0,5 km jv. od vrchu Jahodná (kóta 406,7 m), 1996
 DL22 – asi 100 m vých. od vrchu Jahodná (kóta 406,7 m), 1996
 DL23 – asi 0,5 km ssv. od vrchu Jahodná (kóta 406,7 m), poblíž vleku, 1995
 DL24 – asi 0,7 km sv. od vrchu Jahodná (kóta 406,7), 1995
 DL25 – asi 0,8 km sv. od vrchu Jahodná (kóta 406,7), 1996
 DL26 – krátký kaňon bezejmenného potoka asi 0,5 km již. od nemocnice, 1995
 DL27 – kaňon bezejmenného potoka jv. od vrchu Jahodná, asi 0,1 km od ústí potoka do Olše, 1995

2008 Ladányi in LADÁNYI (2008)

- DL28 – odkaliště

Horní Lištná (dále jen H. Lištná)

1975 Skalický in SKALICKÝ et al. (1978)

- HL1 – hřebenové pastviny mezi lesem 0,7 km záp.–zsz. od vrcholu Vružná (kóta 532), 430 m n. m.
 HL2 – *Carpinetum* na hřebenu Vružné, 0,3 km záp. od vrcholové kóty 532, 500 m n. m.
 HL3 – lesík 0,9 km zsz. od vrchu Vružná (kóta 532), 400 m n. m.

1975 Vicherek in SKALICKÝ et al. (1978)

- HL4 – polokulturní louky a polní cesta mezi záp. okrajem obce a kótou 403, CaCO₃, 380 m n. m.
 HL5 – příkopy, trávníky a okraje polní kultury (kukuřice) podél silnice v obci při státní hranici, 400 m n. m.
 HL6 – vlhký příkop podél polní cesty při státní hranici směr Kojkovice 0,5 km sv. od obce H. Lištná, 400 m n. m.

Nýdek

1975 Mladý in SKALICKÝ et al. (1978)

- N1 – Góra, osada Ostrý, 1 km jv. od kóty 709, 530 m n. m.
 N2 – Góra, nad osadou Ostrý 0,6 km jv. od kóty 709, 600 m n. m.
 N3 – Góra, podél lesní silnice nad osadou Ostrý 0,3 km jv. od kóty 709, 650 m n. m.
 N4 – Góra, vrchol Ostrého vrchu (kóta 709)
 N5 – Góra, lesní okraje a pastviny 1 km záp. od autobusové zastávky, 510 m n. m.
 N6 – Góra, u autobusové zastávky, 450 m n. m.
 N7 – Góra, travnaté stráně podél cesty záp. od Horského potoka, 480 m n. m.
 N8 – Góra, u Horského potoka záp. od autobusové zastávky, 450 m n. m.
 N9 – podél silnice v obci 0,5 km ssv. od kostela, 420 m n. m.
 N10 – vlhké svahové louky sev. od odbočky na Velkou Čantoryji (dále jen V. Čantoryji), 450 m n. m.

1975 Král in SKALICKÝ et al. (1978)

- N11 – osada Střelma, 1,5 km zsz. od vrcholu Malého Sošova (dále jen M. Sošova) (kóta 764), 480 m n. m.
 N12 – osada Střelma, údolí potoka Střelma podél zeleně značené turistické cesty, 450 m n. m.
 N13 – osada Střelma, údolí prvního přítoku potoka Střelma 0,5 km vsv. od ústí, 520 m n. m.
 N14 – osada Střelma, lesní potůček u zeleně značené turist. cesty k Beskydskému sedlu, 600–650 m n. m.
 N15 – les mezi osadami Zakámen a Díly 1,7 km svv. od okraje Nýdku, 650 m n. m.
 N16 – osada Zakámen, 2,4 km svv. od sv. okraje Nýdku, 760 m n. m.
 N17 – osada Zakámen, okraj pole 2,4 km ssv. od sv. okraje Nýdku, 750 m n. m.
 N18 – podmáčená svahová louka jv. od osady Padový, 600 m n. m.
 N19 – vápenný pahorek 0,7 km sv. od obce, 470 m n. m.
 N20 – V. Čantoryje (kóta 995), pokračování hřebene podél červeně značené turistické cesty 0,5 km jjv. od vrcholové kóty, 930 m n. m.
 N21 – hřebenové pastviny u státní hranice 1,5 km již. od vrcholu V. Čantoryje (kóta 995), 750 m n. m.

- N22 – les podél červeně značené turistické cesty 0,9 km zj. od vrcholu V. Čantoryje (kóta 995), sev. od osady Zakámen, 900 m n. m.
 N23 – chaty při státní hranici 0,7 km záp. od vrcholu V. Čantoryje (kóta 995), 950 m n. m.
 N24 – sev. část osady Díly 1,3 km sv. od Nýdku, 580 m n. m.
 N25 – v obci, 410 m n. m.

Kudělová in KUDELOVÁ (1997)

- N26 – začátek údolí Střelmy, 1996
 N27 – údolí Hluchové, asi 3 km od středu obce, 1996
 N28 – údolí Hluchové asi 3,5 km od jv. obce, 1996
 N29 – údolí Hluchové záp. rozsochy Velkého Sošova (dále jen V. Sošova) (kóta 885,6), 1996
 N30 – údolí Hluchové, záp. svahy V. Sošova (kóta 885,6 m), 1996
 N31 – údolí Hluchové, vrstevnicová cesta jz. svahem, 1996
 N32 – sv. svahy údolí Hluchové asi 0,5 km jv. od osady Poledňa, 1996
 N33 – sv. svahy Mionší (kóta 744,7 m), 1996
 N34 – jv. svah Mionší (kóta 744,7 m) poblíž okraje louky Balcarka, 1996
 N35 – vrcholová část Mionší (kóta 744,7 m), 1996
 N36 – sv. svahy Loučky (kóta 835 m), 1996
 N37 – vrcholová část Poledního (kóta 656,8 m), 1996
 N38 – vrchol Poledního (kóta 656,8 m), 1996
 N39 – rezervace Čantoria, střední část, 1996
 N40 – rezervace Čantoria, jižní cíp, 1996
 N41 – rezervace Čantoria, horní část, 1996
 N42 – vrstevnicová cesta jz. úbočím V. Čantorie (kóta 994,5 m), 1996
 N43 – asi 0,5 km sz. od Beskydského sedla, 1996

2001 Cimalová in ČNFD

- N44 – Gora

2010 Rydlo in RYDLO (2010)

- N45 – dolní rybníček 610 m vjv. obecního úřadu
 N46 – prostřední rybníček 690 m vjv. obecního úřadu
 N47 – horní rybníček 700 m vjv. obecního úřadu
 N48 – ostřicová louka 750 vjv. obecního úřadu

Vendryně

1974 Kropáč in ČNFD

- V1 – 0,6 km sev. od kostela, 390 m n. m.

1975 Skalický in SKALICKÝ et al. (1978)

- V2 – vých. okraj borového lesa a přilehlé travinné porosty na již. svazích Vružné (kóta 532) u samoty 0,3 km již. od vrcholu, CaCO₃, 470 m n. m.
 V3 – vlhká lesní světlna při lesní cestě mezi Babí horou a Vružnou sev. od obce, 440 m n. m.
 V4 – lesní cesta mezi Babí horou (kóta 492) a Vružnou (kóta 532), 440 m n. m.

1975 Mladý in SKALICKÝ et al. (1978)

- V5 – křovinaté stráně nad potokem v sv. části obce, 380 m n. m.
 V6 – ruderální stanoviště kolem žel. stanice, 330 m n. m.
 V7 – v obci 0,5 km vých. od kostela, 360 m n. m.
 V8 – louky a údolní svahy podél potoka již. od odbočky silnice do Trince, 340 m n. m.
 V9 – pramenné louky nad potokem 0,6 km od Babí hory (kóta 492), 390 m n. m.
 V10 – u mostu přes potok 0,6 km sv. od žel. stanice, 330 m n. m.
 V11 – podél státní hranice 0,5 km záp. od vrcholu Ostrý (kóta 709), 1,5 km sv. od údolí potoka na vých. okraji obce, 610 m n. m.
 V12 – u potoka 1,5 km vsv. od Babí hory (kóta 492), 450 m n. m.
 V13 – u samoty nad potokem 2 km vsv. od Babí hory (kóta 492), 520 m n. m.
 V14 – lesní louky při státní hranici 1 km sz. od Ostrého vrchu (kóta 709), 530 m n. m.

1975 Houfek in SKALICKÝ et al. (1978)

- V15 – vlhká louka na pravém břehu řeky Olše 0,15 km jz. od žel. zastávky, podél zeleně značené turistické cesty do lesa Rovná, 340 m n. m.
 V16 – les Rovná, podél zeleně značené turistické cesty 1 km jz. od kóty 384, 390 m n. m.
 V17 – podél potoka v lese Rovná 1,6 km jz. od žel. stanice, 360 m n. m.
 V18 – Karpentná, okraje silnice a příkopy podél silnice mezi kótou 419 a potokem tekoucím do obce, 390 m n. m.

- V19 – příkopy, travnaté okraje polí podél polní cesty (zelená turistická značka) mezi údolím Olše a okrajem lesa Rovná, 350 m n. m.
 V20 – okraje polní cesty (zelená turistická značka), přechodná tůňka poblíž sv. okraje lesa Rovná 1,3 km jz. od žel. stanice, 365 m n. m.
 V21 – les záp. od potoka Kopytná podél modře značené turistické cesty 2,7 km jz. („původně jv.“) od žel. stanice Bystřice nad Olší, 415 m n. m.
- Kudělová in KUDELOVÁ (1997)
 V22 – jz. svahy Ostrého (kóta 709,1m), 1995
 V23 – již. svahy Vružné (kóta 531,3 m), 1996
- 2008 Šigutová in ČNFD
 V24 – podél Kopytné
- 2012 Kočvara & Czernik in NDOP
 V25 – podél Kopytné

VÝSLEDKY

V následujícím přehledu uvádím seznam všech taxonů cévnatých rostlin, které byly na studovaném území zaznamenány.

***Abies alba* (C4a). Bystřice:** B17. **D. Lištná:** DL21, DL24. **Nýdek:** N1, N2, N12, N29, N30, N34, N35, N36, N38, N41, N43. — 2014. **Vendryně:** V2. — 2012!.

Často v lesích, část porostů nejspíš z výsadby.

***Abutilon theophrasti* (nat neo). Vendryně:** řeka Olše (2015 Ševčík in NDOP).

***Acer campestre*. Bystřice:** 2003 Hustáková in NDOP. **D. Lištná:** fragment *Quercus-Carpineta* na sz. a záp. svahu kóty 403 (DL1); asi 0,5 km ssv. od vrchu Jahodná (kóta 406,7 m), poblíž vleku (DL23). — Les na Jahodné 1,6 km zsz. od vápenných pecí (2013!). **H. Lištná:** hřebenové pastviny mezi lesem 0,7 km záp.–zsz. od vrcholu Vružná (kóta 532; HL1). **Vendryně:** 2007 Hutýrová in NDOP. Vzácně.

***Acer platanoides*. Bystřice:** B3, B16. — 2014. **D. Lištná:** DL18, DL20, DL21. — 2014. **H. Lištná:** — 2014. **Nýdek:** N13, N31, N36, N42. — 2014. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969), V23. — 2012!.
 Hojně podél cest, potoků a v lesích.

***Acer pseudoplatanus*. Bystřice:** B9, B10, B11, B18, B19. **D. Lištná:** DL1, DL19, DL21, DL22, DL23, DL24, DL25, DL28. — 2014. **H. Lištná:** 1990 Páleníková in NDOP. **Nýdek:** N9, N13, N27, N28, N29, N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N42. — 2014. **Vendryně:** V22, V23. — 2012 NK008.
 Hojně podél cest, potoků a v lesích.

***Achillea millefolium*. Bystřice:** — 2014. **D. Lištná:** DL1, DL2, DL3, DL6, DL28. — 2014. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. **Nýdek:** N11. — 2014 NK500. **Vendryně:** V1 (agg.). — 2012 NK004, 2014.
 Hojně podél cest a na okrajích luk a polí.

***Aconitum lycoctonum* (C4a). Bystřice:** zahrada (KOLBENHEYER 1862; srov. Skalický in HEJNÝ & SLAVÍK 1997).
 Údaj se nejspíše vztahuje k pěstovaným rostlinám, přičemž není zcela jistá ani druhová příslušnost.

***Aconitum variegatum* (C3). Nýdek:** Hluchová (Míčková CESK ut *A. napellus*, Hliseníkovský in litt.).
 Rostlina vyžaduje revizi.

- Acorus calamus* (nat neo). **Bystřice:** vyschlá tůň jen s nepatrným zbytkem vody v centru obce u potoka Prašivka (2012 Višňák sec. PLADIAS 3). **Nýdek:** ostricová louka 750 vjv. od obecního úřadu (N48).
- Actaea spicata*. **D. Lištná:** KILIÁN (1969), DL6, DL7, DL19, DL21, DL25. — 2014. **H. Lištná:** HL2. **Nýdek:** KILIÁN (1969), ZATLOUKAL (1969), N33, N34. — 2014. **Vendryně:** KILIÁN & KILIÁN (1956), KILIÁN (1960), ZATLOUKAL (1969), V23. — 2012 NK011.
Roztroušeně v listnatých lesích.
- Adonis aestivalis* (C3). **Vendryně:** Vružná, okraj pole (ZATLOUKAL 1969).
- Adoxa moschatellina*. **D. Lištná:** asi 0,5 km ssv. od vrchu Jahodná (kóta 406,7 m), poblíž vleku (DL23); kaňon bezejmenného potoka jv. od vrchu Jahodná, asi 0,1 km od ústí potoka do Olše (DL27). **Nýdek:** bučina na V. Čantoryji; Velký Stožek (dále jen V. Stožek) v bučině (ZATLOUKAL 1969). **Vendryně:** strže při ústí bezejmenného potoka z Jahodné do Olzy (2015 Hliseníkovský in ND MSP ČBS). — Listnatý les na již. svahu kopce Vružná 750 m ssv. od vápenných pecí (2012!).
Vzácně v listnatých lesích.
- Aegopodium podagraria*. **Bystřice:** B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12. **D. Lištná:** DL1, DL21, DL24, DL25. **Nýdek:** N9, N12, N26, N27. — 2014. **Vendryně:** V22. — 2012!.
Hojně podél cest, na okrajích polí a luk.
- Aesculus hippocastanum* (nat neo). **D. Lištná:** — Jírovcová alej podél silnice 1,2 km sz. od vrcholu Jahodné (2014). **H. Lištná:** ve stromořadí (ZATLOUKAL 1969). **Vendryně:** stráně nad potokem v sv. části obce (V5). — Okraj lesa na již. svahu kopce Vružná 700 m sv. od vápenných pecí (2012!).
Roztroušeně podél cest, převážně vysázené exempláře.
- Aethusa cynapium*. **Bystřice:** — 2014. **D. Lištná:** DL2. **H. Lištná:** HL6. **Vendryně:** V1, V6. — 2013 NK240.
Roztroušeně v lesním okraji podél potoka Kopytná.
- Agrimonia eupatoria*. **D. Lištná:** KILIÁN & KILIÁN (1956), ZATLOUKAL (1969), DL2, DL3, DL4, DL9. — 2014. **H. Lištná:** HL5. — 2014. **Nýdek:** — 2014 NK507. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969). — 2012 NK001.
Roztroušeně na nesečených loukách a v lesních lemech.
- Agrostemma githago* (C1, cas ar). **Bystřice:** na polích mezi obilím (ZATLOUKAL 1969). **Nýdek:** vrch Čantoryje, na poli za vesnicí Zakámen (Gill 1970 OP sec. CIMALOVÁ 2006).
Dnes ve studovaném území vymizelý.
- Agrostis capillaris*. **D. Lištná:** DL3, DL4, DL28. **H. Lištná:** HL4, HL5. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N15. — 2013!, 2014 NK543. **Vendryně:** 2004 Hustáková in NDOP. — 2012!, 2014!.
Hojně na loukách, na rozvolněných lesních okrajích a pastvinách.
- Agrostis gigantea* (nat neo). **D. Lištná:** odkaliště (DL28).
- Agrostis stolonifera*. **Bystřice:** B22 (agg.). — 2014! **D. Lištná:** — 2014!. **H. Lištná:** — 2014!. **Nýdek:** N11 — 2013!, 2014 NK440. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969), V1.
Hojně na vlhkých loukách, náplavech nebo lesních cestách.
- Aira caryophyllea* (C1). **Vendryně:** mezi Vendryní a Konskou (FORMÁNEK 1887).
Jen nepřesný literární údaj z 19. století (FORMÁNEK 1887); výskyt jistě dávno zanikl.
- Ajuga genevensis*. **D. Lištná:** stráž v lomu (ZATLOUKAL 1969); travinná vegetace na vých. a sev. svahu kóty 403 sev. od obce (DL3). **H. Lištná:** příkopy, trávníky a okraje polní kultury (kukuřice) podél silnice v obci při státní hranici (HL5).

Nýdek: osada Střelma, údolí prvního přítoku potoka Střelma 0,5 km vsv. od ústí (N13).

Ajuga reptans. Bystřice: B3, B5, B6, B7, B18. — 2014 NK323. **D. Lištná:** DL1, DL4, DL6, DL7, DL18. — 2014!. **H. Lištná:** HL4, HL5. — 2014!. **Nýdek:** N27. **Vendryně:** V25. — 2012 NK010.

Hojně na loukách a rozvolněných lesních okrajích.

Alchemilla crinita. Bystřice: — 2014! (cf.). **Nýdek:** N12, N18.

Alchemilla glabra. **Nýdek:** N12, N16.

Alchemilla glaucescens. **D. Lištná:** DL10.

Alchemilla micans. **D. Lištná:** DL8.

Alchemilla cf. monticola. Bystřice: — 2014!.

Alchemilla subcrenata. **D. Lištná:** DL14. **Nýdek:** N19, N20.

Alchemilla vulgaris agg. **D. Lištná:** DL3, DL4. **H. Lištná:** HL4, HL5. **Nýdek:** — 2014!. **Vendryně:** — 2012!.

Zde jsou uvedeny nálezy všech blíže neurčených rostlin rodu *Alchemilla*.

Alchemilla xanthochlora. **D. Lištná:** DL14.

Alliaria petiolata. Bystřice: B3, B4, B5, B9. — 2014 NK322. **D. Lištná:** DL6, DL21. — 2014 NK287. **H. Lištná:** — 2014!. **Nýdek:** N26. **Vendryně:** V7. — 2012!.

Hojně na okrajích listnatých lesů.

Allium oleraceum. **H. Lištná:** příkopy, trávníky a okraje polní kultury (kukuřice) podél silnice při státní hranici (HL5). **Vendryně:** na louce u Vružné, kóta 570 (Vicherek sec. ZATLOUKAL 1969). — Pastvina na již. svahu kopce Vružná 780 m sv. od vápenných pecí (2012 NK015, rev. M. Duchoslav); listnatý les na jv. svahu kopce Vružná 680 m jv. od vrcholu (2014 NK492).

Vzácně v listnatých lesích.

Allium scorodoprasum. **D. Lištná:** Sosna (Duda 1987 OP sec. DUCHOSLAV & KRAHULEC 2009). **Vendryně:** — Listnatý les na již. svahu kopce Vružná 750 m ssv. od vápenných pecí (2012!).

Spolu s *Allium oleraceum* v listnatém lese.

Allium ursinum. Bystřice: B6, B9, B10. **D. Lištná:** — 2014. **H. Lištná:** — 2014!. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969). **Vendryně:** V23. — 2012 NK007.

Hojně v listnatých lesích a v lesích podél vodních toků. Sběr NK007 patří nominátnímu poddruhu (rev. M. Duchoslav). Z těsného sousedství studovaného území je však doloženo také *A. u.* subsp. *ucrainicum* (sec. Duchoslav & Krahulec in Excerpta pro atlas).

Allium vineale. **D. Lištná:** stráň v lomu na sv. úpatí Jahodné (Zatloukal 1968 BRNU sec. DUCHOSLAV & KRAHULEC 2012). **Vendryně:** kóta Vružná (Gill 1967 OP ibidem). — Nesečená louka uprostřed lesů 500 m ssz. od vápenných pecí (2018, TKÁČIKOVÁ in prep.).

Vzácně na loukách.

Alnus glutinosa. Bystřice: B3, B8. — 2014 NK580. **D. Lištná:** 2004 Hustáková in NDOP. **H. Lištná:** — 2014!. **Nýdek:** — 2014. **Vendryně:** V25. — 2012!.

Hojně podél vodních toků a kolem vodních nádrží.

Alnus incana. Bystřice: B6, B8, B11. — 2014!. **D. Lištná:** — 2014 NK460. **Nýdek:** N9, N26. **Vendryně:** V5. — 2013!.

Hojně podél vodních toků a kolem vodních nádrží.

Alopecurus aequalis. Bystřice: — Náplavy řeky Olše 740 m jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014 NK433; rev. J. Danihelka). **D. Lištná:** — U vodní plochy odkaliště 880 m sv. od vrcholu Jahodné (2014). **Vendryně:** podél Kopytné (V25). — Levý

břeh potoka Kopytná 1,9 km jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2013 NK241; rev. J. Danihelka).

Roztroušeně na březích vodních toků a jejich náplavech.

***Alopecurus geniculatus*. Nýdek:** vypuštěná nádrž na Hluchové pod Malým Stožkem (2012 Višňák in NDOP).

***Alopecurus pratensis*. Bystřice:** 2003 Hustáková in NDOP. — 2014 NK328. **Nýdek:** 2003 Hustáková in NDOP. **Vendryně:** 2004 Hustáková in NDOP. — 2012 NK016. Hojně na mezofilních loukách a pastvinách.

***Alyssum alyssoides*. Nýdek:** na štěrkopísčitém náplavu v údolí potoka Hluchová (KILIÁN 1960).

***Ambrosia artemisiifolia* (inv neo). Vendryně:** — Ruderalizované místo na louce 80 m ssz. od žel. stanice Vendryně (2013!).

Jediný nález z narušeného stanoviště.

***Anacamptis pyramidalis* (C1). Bystřice:** Bystřice (OTRUBA 1926); levý břeh řeky Hluchová u Bystřice (Ascherson sec. FIEK 1881; PODPĚRA 1949).

Poslední nález před r. 1881. Procházka in ŠTĚPÁNKOVÁ (2010) považuje výskyt v Bystřici a H. Lištné za zaniklý. Je velmi pravděpodobné, že Podpěra i Otruba jen přejímají Aschersonův nález.

***Anagallis arvensis* (nat ar). D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), DL2. **H. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), HL6. **Nýdek:** N6, N11. **Vendryně:** — 2014 NK478 (rev. P. Kúr).

Roztroušeně v polích a na narušených místech.

***Anemone nemorosa*. Bystřice:** B9, B10. — 2014!. **D. Lištná:** DL18, DL19, DL20. — 2014 NK286, 2015. **H. Lištná:** — 2014 NK285. **Nýdek:** N26, N28. — 2014. **Vendryně:** V25. — 2012!.

Hojně v rozvolněných lesních okrajích a vlhkých loukách.

***Anemone ranunculoides*. Bystřice:** pravý břeh Olše, olšina proti ústí Kopytné (B6, B7). — Les proti ústí Kopytné 480 m jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014).

D. Lištná: 1990 Páleníková in NDOP. — Les u Bezejmen. potoka 550 m již. od vrcholu Jahodné (2015). **Vendryně:** — Les podél řeky Olše 1,4 km sz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2015).

Vzácně v listnatých lesích.

***Angelica archangelica* (inv ar). Nýdek:** v pobřežních křovinách Hluchové (ZATLOUKAL 1969).

Nejspíš mylný údaj, který se ve skutečnosti vztahuje k druhu *Angelica sylvestris*.

***Angelica sylvestris*. Bystřice:** 2009 Chytil in NDOP. — 2014 NK324. **D. Lištná:** DL4. **H. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), HL6. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N10, N13. — 2014!. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969). — 2012 NK005.

Hojně podél vlhkých lesních cest a na vlhkých loukách v blízkosti lesa.

***Antennaria dioica* (C2). Bystřice:** 2011 Kociánová in NDOP. **Nýdek:** hřebenové pastviny u státní hranice 1,5 km již. od vrcholu V. Čantoryje (kóta 995; N21). **Vendryně:** okraj borového lesa na Prašivé hoře (ZATLOUKAL 1969).

***Anthemis arvensis* (nat ar). Bystřice:** — 2014!. **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969). **Nýdek:** N11. **Vendryně:** V8. — 2012 NK114, 2014 NK479.

Roztroušeně na polích a narušených místech.

***Anthemis tinctoria*. D. Lištná:** opuštěný vápencový lom (DUDA 1959); křovinatá stráň kóty 403 (ZATLOUKAL 1969); travinná vegetace na vých. a sev. svahu kóty 403 sev. od obce (DL3). **Vendryně:** Uechtritz sec. FIEK 1881; Prašivá hora, lom na již. úpatí (Vicherek sec. ZATLOUKAL 1969).

Anthoxanthum odoratum. Bystřice: 2004 Hustáková in NDOP. — 2014!. **D. Lištná:** DL2, DL3, DL4. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. **Nýdek:** N12, N21. — 2014. **Vendryně:** V9. — 2012!.

Roztroušeně na mezofilních loukách a pastvinách.

Anthriscus cerefolium. Vendryně: v habrovém lese na již. úpatí Vružné (ZATLOUKAL 1969).

V herbáři BRNU není k tomuto údaji žádný doklad. Velmi pravděpodobně jde o mylný údaj, poněvadž SLAVÍK (1997) žádný nález z fytogeografického podokresu 84a. Beskydské podhůří neuvádí. Žádný nález není ani v připravované mapě (Dřevojan & Prančl in PLADIAS 7).

Anthriscus nitida. Bystřice: B3, B4, B5, B6, B8, B10, B11. — 2014 NK325 (rev. P. Dřevojan). **D. Lištná:** DL6, DL7, DL15, DL25. **H. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), HL2. **Nýdek:** N26, N27. **Vendryně:** Babí hora (Zatloukal 1968 BRNU, rev. P. Dřevojan, srov. ZATLOUKAL 1969 in PLADIAS 7), V22. — 2013!.

Roztroušeně v lesích podél vodních toků.

Anthriscus sylvestris. Bystřice: 2009 Chytil in NDOP. — 2014. **D. Lištná:** DL20, DL22. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N11. — 2014!. **Vendryně:** V25.

Roztroušeně podél lesních cest.

Anthyllis vulneraria. **D. Lištná:** na louce (ZATLOUKAL 1969); travinná vegetace na vých. a sev. svahu kóty 403 sev. od obce (DL3). **Nýdek:** les podél červeně značené turistické cesty 0,9 km zjz. od vrcholu V. Čantoryje (kóta 995), sev. od osady Zakámen (N22). **Vendryně:** Vružná, křovinatá stráň. (ZATLOUKAL 1969).

Apera spica-venti (nat ar). **Vendryně:** — Pod Prašivou 1,7 km vjv. od žel. stanice Vendryně (2014 NK547); pole pod Prašivou 900 m zjz. od vrcholu (2014 NK562).

Roztroušeně mezi obilím.

Aquilegia vulgaris (C3). Bystřice: 2003 Hustáková in NDOP. **Lištná:** SCHUBE (1903–1904). **D. Lištná:** vrch Jahodná (KILIÁN 1960). **Nýdek:** údolí Hluchová (KILIÁN & KILIÁN 1956); Střelma (KILIÁN 1960); Zakámen (ZATLOUKAL 1969); vrchol Ostrého vrchu (kóta 709; N4). — Sev. svah Vrchhory 730 m sv. od dřevěného kostela (2014). **Vendryně:** údolí Kopytné (KILIÁN & KILIÁN 1956); Babí hora, na pasece; Vružná, stráň (ZATLOUKAL 1969). — Okraj lesní cesty na vých. svahu kopce Babí hora 390 m sv. od vápenných pecí (2012 NK013); listnatý les podél potoka Kopytná 1,9 km jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2013!); louka na záp. svahu kopce Žďár 460 m záp. od vrcholu (2014).

Vzácně podél lesních cest a lesních lemů.

Arabis hirsuta. **D. Lištná:** křovinatá stráň v lomu (Zatloukal & Vicherek sec. ZATLOUKAL 1969); křovinaté porosty a travnaté lemy v záp. části vápencového vrchu Jahodná (mezi sv. cípem Třince a potůčkem s tokem k jihu ze středu obce (DL9); opuštěný vápencový lom na sev. svazích Jahodné (DL11). **Vendryně:** Vavřkova hora, kóta 529, na již. svahu (Vicherek sec. ZATLOUKAL 1969).

Arabis glabra. **D. Lištná:** Vrch Jahodná (KILIÁN & KILIÁN 1956). **Vendryně:** Vružná, na křovinaté stráni (ZATLOUKAL 1969). — Okraj lesa na již. svahu kopce Vružná 800 m sev. od vápenných pecí (2012 NK014, rev. J. Štěpánek).

Pravděpodobně vzácný.

Arctium lappa (nat ar). Bystřice: — 2014 NK599 (rev. P. Koutecký). **D. Lištná:** DL14. — 2014 NK596 (rev. P. Koutecký). **Nýdek:** — 2014!. **Vendryně:** — 2013!.

V území nejhojnější z lopuchů. Podél cest v příkopech a lesních lemech.

Arctium minus. **D. Lištná:** vsv. část města při silnici do Vendryně přes Sosnu, mezi údolím Olše a pravostranným přítokem (DL15). — Louka nad kalištěm 470 m sv.

od vrcholu Jahodné (2014). **Vendryně:** les Rovná, podél zeleně značené turistické cesty 1 km jz. od kóty 384 (V16).

Vzácně.

Arctium nemorosum (C4a). **Bystřice:** 2009 Chytil in NDOP. **Vendryně:** již. svahy Vružné (V23). — Sz. svahy Vendryňského háje 1,3 km vsv. od vápenných pecí (2013!); les u potoka Kopytná 1,9 km jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2013!).

Vzácně podél lesních cest a lesních lemů.

Arctium tomentosum (nat ar). **D. Lištná:** kóta 350, v opuštěném kamenolomu (ZATLOUKAL 1969); příkopy a trávníky podél silnice směr H. Lištná (DL2).

H. Lištná: — U cesty na sz. svahu Vružné 1,1 km sz. od vrcholu (2014 NK595, rev. P. Koutecký). **Vendryně:** u mostu přes potok 0,6 km sv. od žel. stanice (V10); podél státní hranice 0,5 km záp. od vrcholu Ostrý (kóta 709), 1,5 km sv. od údolí potoka na vých. okraji obce (V11). — Louka u červeně značené turistické cesty 390 m vjv. od vrcholu Vružná (2015).

Poměrně vzácně.

Arctium ×ambiguum (*A. lappa* × *A. tomentosum*; cas ar). **Vendryně:** V6.

Arenaria serpyllifolia. **Bystřice:** ZATLOUKAL (1969). **D. Lištná:** DL28. — 2014 NK466. **H. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), HL5. **Nýdek:** N12. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969). — 2013 NK239.

Hojně na narušených místech a místech se sporou vegetací.

Armoracia rusticana (nat ar). **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), DL28. **Nýdek:** N19. — 2014. **Vendryně:** V7. — 2012.

Roztroušeně na narušených místech a vlhkých loukách.

Arnica montana subsp. montana (C3). **Vendryně:** pod Ostrým (Mičková 1973 BRNM sec. PLADIAS 5).

Arrhenatherum elatius subsp. elatius (inv ar). **Bystřice:** B23. — 2013 NK238, 2014!.

D. Lištná: DL2, DL3, DL4, DL28. — 2014 NK327. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. **Nýdek:** N10, N11. — 2014 NK326. **Vendryně:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), V5. — 2012 NK018.

Hojně na loukách.

Artemisia vulgaris. **Bystřice:** B24. — 2014. **D. Lištná:** DL2, DL28. — 2014.

H. Lištná: HL5. **Nýdek:** — 2014. **Vendryně:** V25. — 2012 NK006.

Hojně na narušených místech a podél cest.

Arum cylindraceum (C4a). **Nýdek:** háj v příkrém svahu nad levým břehem bezejmenného. potoka jv. od Vrchhory (2012 Višňák in NDOP).

Aruncus vulgaris (C4a). **Bystřice:** B3, B7. **D. Lištná:** DL27. **H. Lištná:** HL2. **Nýdek:** KILIÁN (1969), ZATLOUKAL (1969), N5, N23, N30. — 2014. **Vendryně:** KILIÁN (1969), V5. — 2012 NK012.

Roztroušeně v suťových lesích.

Asarum europaeum. **Bystřice:** B4, B5, B6, B18, B19. — 2014!. **D. Lištná:** DL3, DL7, DL9, DL18, DL20, DL21, DL23, DL24. — 2014!. **H. Lištná:** HL2. — 2014!.

Nýdek: N5, N13, N22, N26, N27, N28, N31. — 2014. **Vendryně:** V12, V22, V23. — 2012!.

Hojně v listnatých lesích.

Asparagus officinalis (nat neo). **Vendryně:** v obci 0,5 km vých. od kostela (V7).

Ve studované oblasti není výskyt v polopřirozených biotopech, např. na suchých polopřirozených trávnících, znám. Nález se nejspíš vztahuje k pěstovaným nebo zplanělým rostlinám.

Asperula cynanchica. Vendryně: v bučině na sv. svahu Babí hory (Vicherek sec. ZATLOUKAL 1969).

Vzhledem k uvedenému biotopu a k faktu, že z fytogeografického podokresu 84a. Beskydské podhůří není žádný výskyt znám (srov. Kubát in SLAVÍK 2000), považují tento údaj za mylný.

Asplenium adiantum-nigrum (C1). Vendryně: na Ostrém u Líštné (Zlik in Oborny sec. SCHUBE 1903–1904).

ZATLOUKAL (1969) se domnívá, že jde o mylný údaj, protože tato kapradina je vázána na serpentinity, které se v území nevyskytují. Ve skutečnosti jde o petrofyt bez vazby na hadcové substráty. Navzdory tomu je údaj nejspíš mylný, poněvadž žádné sběry tohoto téměř nezaměnitelného druhu ze studovaného území ani jeho sousedství nejsou známy (Křisa in HEJNÝ & SLAVÍK 1997 a L. Ekrt in PLADIAS 3).

Asplenium ruta-muraria. Bystřice: kamenná zídka kolem dřevěného kostelíka naproti domu č. 857 (B25). — Tamtéž (2014).

Z území jediný známý výskyt, který jsem ověřila.

Asplenium trichomanes subsp. *trichomanes*. D. Líštná: kaňon bezejmenného potoka jv. od vrchu Jahodná, asi 0,1 km od ústí potoka do Olše (DL27; J. Kudělová 1995 CESH sec. PLADIAS 3). — Svah nad bezejmen. potokem 640 m jjz. od vrcholu Jahodná, 100 m před ústím potoka do Olše (2015). Nýdek: kamenitá zídka u potoka Střelma (ZATLOUKAL 1969; bez subspecie). — Zakámen, na skále u památníku J. Třanovského 1,8 km jz. od vrcholu V. Čantoryje (2014; bez subspecie). Vendryně: skalky v habrovém lese na již. úpatí Vružné (ZATLOUKAL 1969; bez subspecie). — Strmý svah nad bezejmen. potokem 640 m jjz. od vrcholu Jahodná, 100 m před ústím potoka do Olše (2015; bez subspecie).

Vzácně na skalních výchozech. Nález z D. Líštné a Vendryně se vztahuje k jediné lokalitě na obou březích bezejmenného potoka.

Asplenium trichomanes subsp. *quadrivalens*. D. Líštná: ve vápencovém lomu (Trapl 1940 PRC sec. PLADIAS 2). Nýdek: Hluchová, na skalnatém srázu, 900 m n. m. (Míčková 1995 CESH sec. PLADIAS 2).

Aster novi-belgii (inv. neo). D. Líštná: — U cesty kolem odkaliště 740 m ssv. od vrcholu Jahodné (2014 NK613).

Vzácně, v území zaznamenána jen na odkališti.

Astragalus cicer. Nýdek: Hluchová, na pasece (R. Míčková 1958 CESH sec. PLADIAS 2; srov. DUDA 1959).

Astragalus glycyphyllos. Bystřice: — 2014. D. Líštná: ZATLOUKAL (1969), DL3, DL11, DL12, DL28. — 2014. Nýdek: N19. — 2014. Vendryně: Zatloukal 1968 BRNU, V11. — 2012 NK009 (rev. J. Danihelka).

Roztroušeně v rozvolněných lesních okrajích a podél lesních lemů.

Astrantia major. D. Líštná: 1990 Páleníková in NDOP. Nýdek: podél silnice v obci 0,5 km ssv. od kostela (N9). — Okraj lesa na pravém břehu Horského potoka 2,8 km jz. od vrcholu V. Čantoryje (2018 NK616). Vendryně: Babí hora, bučina na sv. svahu (Vicherek sec. ZATLOUKAL 1969).

Vzácně.

Athyrium distentifolium. Nýdek: záp. rozsochy V. Sošova (kóta 885,6 m; N29); údolí Hluchové, vrstevnicová cesta jz. svahem (N31); sv. svahy a vrcholová část Mionší (kóta 744,7 m; N33, N35); V. Stožek, vrchol (Duda 1975 OP sec. PLADIAS 6). — Les na sev. svahu V. Stožku 360 m zsz. od vrcholu (2014 NK593).

Vzácně nebo z důvodu neznalosti možná přehlížena a zaměňována za běžnější *A. filix-femina*.

- Athyrium filix-femina.** Bystřice: B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20. — 2014!. **D. Lištná:** DL18, DL27. — 2014. **Nýdek:** N8, N12, N21, N26, N28, N29, N30, N31, N32, N33, N34, N35, N36, N39, N40, N41, N42, N43. — 2013!, 2014. **Vendryně:** V17, V22. — 2012 NK003 (rev. L. Ekrt).
Hojně v lesích.
- Atriplex patula** (nat ar). Bystřice: jv. okraj obce, u žel. přejezdu asi 1 km jjv. od kostela poblíž hnojiště (B21). **Vendryně:** — Ve vsi u cesty 780 m vsv. od kostela (2012!).
V území vzácná nebo spíš jen přehlížená.
- Atropa bella-donna.** Bystřice: Polední (1965, 1976 Satora in DLT). — U lesní cesty 1,6 km sv. od žel. stanice Hrádek (2014 NK494). **D. Lištná:** na vrchu Jahodná (KILIÁN 1960); středně zalesněná část vápencového hřebene Jahodná, 0,5 km jv. od ústí potůčku již. od středu obce (DL6); osada Sosna, jv. exponovaný les podél červeně značené turistické lesní cesty 1 km sv.–vsv. od osady (DL7). **Vendryně:** KOLBENHEYER (1862); v jehličnatém lese na Prašivé (KILIÁN 1960). — Podél pěšinky v lese 1,8 km jjv. od vápenných pecí (2018).
Vzácně u lesních cest.
- Avena fatua** (nat ar). **Vendryně:** 0,6 km sev. od kostela (V1).
- Avenella flexuosa.** Bystřice: B13, B17. **Nýdek:** KOLBENHEYER (1862), N14, N34. — 2013!, 2014. **Vendryně:** V17. — 2012 NK002, 2014!.
Roztroušené v lesích a lesních lemech.
- Avenula pubescens.** **Vendryně:** Vružná, křovinatá stráň (ZATLOUKAL 1969).
- Barbarea vulgaris.** Bystřice: ZATLOUKAL (1969). — 2014!. **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969). **Nýdek:** — 2014!. **Vendryně:** V12. — 2012 NK116, 2013!, 2014!.
Hojně na náplavech a narušených místech. V území je běžnější *B. vulgaris* subsp. *arcuata* (C4a; Hlisenkovský in litt.).
- Batrachium aquatile** (C4b). **D. Lištná:** odkaliště, vodní plocha (DL28).
Jedná se spíše o druh *Batrachium peltatum*, který je ze severní Moravy znám (Hlisenkovský, in litt.).
- Bellis perennis.** Bystřice: 2003 Hustáková in NDOP. — 2014. **D. Lištná:** DL3, DL4. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. — 2013!. **Nýdek:** N9, N12. **Vendryně:** V8. — 2012!.
Hojně na pravidelně sečených trávnících.
- Berberis thunbergii** (cas neo). **Vendryně:** pod Prašivou, pruh listnatého lesa pod cestou (2012 Višňák in NDOP). — Lesní lem pod Prašivou horou nedaleko rodinného domu č. p. 1106, 960 m jjv. od kostela (2012 NK020).
Jedná se pravděpodobně o zplanělý výskyt, snad přechodného rázu.
- Berteroa incana** (nat ar). **D. Lištná:** odkaliště (DL28).
- Betonica officinalis.** Bystřice: — 2014. **D. Lištná:** KILIÁN & KILIÁN (1956), ZATLOUKAL (1969), DL2, DL3, DL9. — 2014. **H. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), HL1, HL5. **Nýdek:** KILIÁN & KILIÁN (1956), N7, N10, N17, N24. — 2014!. **Vendryně:** KILIÁN & KILIÁN (1956), Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969), V8, V11. — 2012!, 2014.
Roztroušeně na jednosečných loukách, pastvinách a v lesních lemech.
- Betula pendula.** Bystřice: 2003 Hustáková in NDOP. — 2014. **D. Lištná:** DL1, DL28. — 2014. **Nýdek:** N9, N20. — 2013!, 2014. **Vendryně:** V25. — 2012!.
Hojně na okrajích listnatých lesů, na sutích a narušených místech.
- Betula obscura.** Bystřice: 1887 Schube in SCHUBE (1903–1904).
- Bidens frondosa** (inv neo). Bystřice: 2014. **D. Lištná:** DL15. — 2014!. **Nýdek:** Střelma, levý přítok Střelmy nad zelenou značkou, lesní cesta, asi 550 m n. m.

- (Sedláčková 1999 NJM sec. PLADIAS 2). **Vendryně:** — 2012 NK021, 2012 NK022, 2012 NK023 (vše rev. J. Štěpánková).
Roztroušeně na vlhkých okrajích lesních cest, v příkopech.
- Bidens tripartita.** **D. Lištná:** odkaliště (DL28). — Křoviny severně od vodní plochy na kališti 860 m sv. od vrcholu Jahodné (2014). **Vendryně:** — Zaolší, louže ve smrkovém lese 2,5 km jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2012!).
Vzácně na zamokřených lokalitách.
- Bifora radians** (C1, nat ar). **D. Lištná:** dva exempláře na rumišti (KILIÁN 1969).
- Blechnum spicant** (C4a). **Bystřice:** B19, Gill 1978 CESH sec. PLADIAS 4. — 2014. **D. Lištná:** KILIÁN (1960). **Nýdek:** Zatloukal 1967 BRNU sec. PLADIAS 4, N42. — 2014 NK391. **Vendryně:** KILIÁN (1960), V17, Hrabovský 1995 FMM sec. PLADIAS 4. — 2012 NK115 (rev. L. Ekrť).
- Roztroušeně v listnatých i jehličnatých lesích ve vyšších polohách.
- Blysmus compressus** (C2). **Vendryně:** M. Ostrý (KOLBENHEYER 1862; Oborný sec. SCHUBE 1903–1904); křovinaté stráně nad potokem v sv. části obce (V5); u potoka 1,5 km vsv. od Babí hory (kóta 492; V12).
- Botrychium lunaria** (C2). **D. Lištná:** Ve vápencovém lomu při sv. okraji Třince u D. Lištné (Trapl 1946 PRC sec. PLADIAS 4). **Nýdek:** Čantoryje (Oborný sec. SCHUBE 1903–1904; OTRUBA 1925–1926).
- Botrychium matricariifolium** (C1). **Vendryně:** jz. svahy Ostrého (kóta 709,1m; V22); 0,7 km jz. od Ostrého (kóta 709,1), okraj společenstva *Carici remotae-Fraxinetum*, 3 exempláře (Kudělová 1996 BRNU, CESH a FMM sec. PLADIAS 4).
- Brachypodium pinnatum.** **D. Lištná:** travinná vegetace na vých. a sev. svahu kóty 403 sev. od obce (DL3); polokulturní louka v kulminační části (náhorní plošina) kóty 403 (DL4). **H. Lištná:** příkopy, trávníky a okraje polní kultury (kukuřice) podél silnice v obci při státní hranici (HL5).
- Brachypodium sylvaticum.** **Bystřice:** B11. — 2014!. **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), DL1, DL3, DL15, DL18. — 2014!. **H. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), HL2. — 2014!. **Nýdek:** N10, N26, N31. — 2014 NK439. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969), V11, V12, V22, V23. — 2012 NK019, 2012 NK025, 2014!.
Hojně v bohatém lesním podrostu a podél lesních cest.
- Briza media.** **Bystřice:** — 2014. **D. Lištná:** DL3, DL4, DL11. — 2013 NK242. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. **Nýdek:** N9, N13, N22. — 2014. **Vendryně:** — 2012 NK024, 2014!.
Roztroušeně na jednosečných nebo nepravidelně sečených loukách.
- Bromus benekenii.** **D. Lištná:** DL7. **H. Lištná:** HL2. **Nýdek:** 1989 Hájková in NDOP. **Vendryně:** V12. — Louka na jv. svahu Vružné 120 m jjv. od vrcholu (2014 NK329).
Vzácně v lesích a lesních lemech.
- Bromus erectus.** **D. Lištná:** příkopy a trávníky podél silnice směr H. Lištná (DL2). **H. Lištná:** příkopy, trávníky a okraje polní kultury (kukuřice) podél silnice v obci při státní hranici (HL5). **Vendryně:** lom na již. úpatí Prašivé hory (Vicherek sec. ZATLOUKAL 1969); křovinaté stráně nad potokem v sv. části obce (V5).
- Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus** (nat ar). **Bystřice:** — 2014 NK330 (rev. J. Danihelka). **D. Lištná:** Vicherek 1956 BRNU. **Nýdek:** N10, N11, N19. **Vendryně:** V12. — 2012 NK026, 2012 NK027 (obojí rev. J. Danihelka).
Roztroušeně na loukách a pastvinách.
- Bromus inermis.** **Nýdek:** v obci (N25).

- Bromus ramosus** (C3). **D. Lištná:** osada Sosna, již. okraj lesa ve vých. části vápencového pahorku Jahodná, 0,6 km ssv. od osady (DL8). **H. Lištná:** *Carpinetum* na hřebenu Vružné, 0,3 km záp. od vrcholové kóty 532 (HL2). **Vendryně:** mezi Jahodnou a Vružnou (1966, 1975 Satora in DLT).
Výskyt na Třinecké Sosně potvrdil Hlisnikovský (2014 in litt.).
- Bromus secalinus** (C1, cas ar). **Vendryně:** Ascherson sec. FIEK (1881); louky a údolní svahy podél potoka již. od odbočky silnice do Třince (V8).
Pravděpodobně dávno zaniklý výskyt plevle ozimých obilnin.
- Bromus sterilis** (nat ar). **Bystřice:** — Na dlážděném chodníku podél hlavní cesty Na Pasekách 1,8 km jž. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2018!). **D. Lištná:** U Olše (Trapl 1946 PR sec. Excerptce pro atlas).
Vzácně zavlékaný, nejspíš s pískem; výskyt zřejmě jen přechodný.
- Bromus tectorum** (nat ar). **Bystřice:** — Na dlážděném chodníku podél hlavní cesty Na Pasekách 1,8 km jž. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2018!).
Spíše vzácně na chudých stanovištích na propustných půdách, možná jen přechodně zavlékaný s pískem.
- Bryonia alba** (nat ar). **H. Lištná:** KILIÁN & KILIÁN (1956).
- Bunias orientalis** (inv neo). **D. Lištná:** vrch Hradisko, na suché louce ve dvou exemplářích (KILIÁN 1960, Kilián OP sec. ZATLOUKAL 1969).
- Bupleurum longifolium** (C2). **D. Lištná:** na vápencích u D. Lištné, pouze v jediném exempláři (MÍČKOVÁ 1958).
Údaj je nejspíš mylný: Květena České republiky ze Slezska ani severovýchodní Moravy žádný výskyt nezná (srov. Šourková & Hrouda in SLAVÍK 1997).
- Butomus umbellatus** (C4a). **Bystřice:** litorál rybníka 250 m sz. od žel. nádraží v Bystřici (2011 Hlisnikovský in Excerptce pro atlas).
Pravděpodobně jde o vysazenou populaci.
- Calamagrostis arundinacea**. **Bystřice:** B17, B18, B19. **D. Lištná:** DL1. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N4, N11, N15, N28, N29, N30, N31, N34, N35, N38, N39, N40, N41, N42, N43. — 2013!, 2014!. **Vendryně:** Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969), V17. — 2012 NK042 (rev. M. Štech), 2012 NK043 (rev. M. Štech), 2014!.
Hojně v lesích a na sutích.
- Calamagrostis epigejos**. **Bystřice:** B14, B16. — 2014!. **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), DL28. — 2014. **H. Lištná:** HL5. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N11. — 2013 NK283, 2014. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969), V5. — 2012 NK044 (rev. M. Štech), 2012 NK045 (rev. M. Štech), 2013 NK284.
Hojně na narušených místech a pasekách.
- Calamagrostis pseudophragmites** (C1). **Bystřice:** 2004 Hustáková in NDOP; Šigutová 2008 FMM, Hlisnikovský 2011 FMM sec. POPELÁŘOVÁ et al. 2011. — Břehy řeky Olše 630 m jjv. od žel. stanice Bystřice (2018). **Vendryně:** podél Kopytné (V24).
Na řece Olši je třtina pobřežní poměrně hojná na rozsáhlých náplavech od Hrádku až po Vendryni. Nevelké polykormony tohoto druhu byly zaznamenány také na Kopytné před jejím soutokem s Olší (POPELÁŘOVÁ et al. 2011).
- Calamagrostis villosa**. **Bystřice:** 2003 Hustáková in NDOP. **Nýdek:** Stožek u Jablunkova (1896 Schube in SCHUBE 1903–1904). **Vendryně:** Babí hora, bučina na sv. svahu (Vicherek sec. ZATLOUKAL 1969). — Kamenné moře a les na jz. svahu kopce Žďár (2018); u lesní cesty 1,2 km vsv. od vápenných pecí (2018, TKÁČIKOVÁ in prep.).
Roztroušeně na okrajích lesních cest.

- Calla palustris*** (C3, aut). **Bystřice:** v lučních průhonech u Bystřice na levém břehu řeky Olše (KILIÁN 1960; Kilián OP sec. ZATLOUKAL 1969). **Vendryně:** 2003 Hustáková in NDOP. — Lesní tůňka nedaleko potoka Kopytná 2 km jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2013!).
Velká populace potvrzena jen v katastru Vendryně.
- Callitriche cophocarpa***. **Bystřice:** — Na Pasekách, na potoce Jatný 1,7 km již. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014 NK428 jako *Callitriche* sp.; 2018 NK634, cf.) **Vendryně:** 1000 m záp. od vrchu Ostrý (Hlisenkovský 2011 FMM sec. PLADIAS 7). Vzácně.
- Calluna vulgaris***. **Bystřice:** 2003 Hustáková in NDOP. — U cesty 1,5 km sv. od žel. stanice Hrádek (2014). **Nýdek:** osada Střelma, údolí potoka Střelma podél zeleně značené turistické cesty (N12); osada Zakámen, 2,4 km svv. od sv. okraje Nýdku (N16). — Vlhká louka 1,4 km zjz. od vrcholu Mionší (2014). **Vendryně:** — Lesní stezka na jz. svahu kopce Žďár 340 m jz. od vrcholu (2014!).
Vzácně ve vlhkých lesních průsecích.
- Caltha palustris***. **Bystřice:** B3. **D. Lištná:** — 2014. **H. Lištná:** HL6. — 2014 NK344. **Nýdek:** N10, N12. — 2014. **Vendryně:** V12. — 2012 NK056.
Roztroušeně v prameništích, podél potůčků a na vlhkých loukách.
- Calystegia sepium***. **Bystřice:** B25. — 2014!. **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969). **H. Lištná:** — 2014 NK584. **Vendryně:** V25.
Roztroušeně na vlhkých okrajích lesů a v příkopech.
- Campanula glomerata* subsp. *glomerata***. **D. Lištná:** travinná vegetace na vých. a sev. svahu kóty 403 sev. od obce (DL3). **H. Lištná:** polokulturní louky a polní cesta mezi záp. okrajem obce a kótou 403 (HL4); příkopy, trávníky a okraje polní kultury (kukuřice) podél silnice v obci při státní hranici (HL5). **Vendryně:** Vružná; Babí hora, na louce (ZATLOUKAL 1969); vých. okraj borového lesa a přilehlé travinné porosty na již. svazích Vružné (kóta 532) u samoty 0,3 km již. od vrcholu (V2).
- Campanula patula***. **Bystřice:** 2002 Holuša in NDOP. **D. Lištná:** DL4. — 2014 NK338. **Nýdek:** N9, N11, N12, N22. — 2014 NK337. **Vendryně:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), V11. — 2012 NK048, 2012 NK049, 2014 NK475.
Hojně na nepravidelně sečených a horských loukách.
- Campanula persicifolia***. **D. Lištná:** DL7, DL8. **Vendryně:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), V2. — 2012 NK050, 2014 NK339.
Roztroušeně ve světlých lesích a rozvolněných lesních okrajích.
- Campanula rapunculoides***. **Bystřice:** — 2014 NK563. **D. Lištná:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), DL1, DL15. **Nýdek:** N9, N11, N25. **Vendryně:** V1, V23. — 2012 NK046.
Roztroušeně na loukách a ve světlých lesích.
- Campanula rotundifolia***. **D. Lištná:** travinná vegetace na vých. a sev. svahu kóty 403 sev. od obce (DL3); Kovanda in SLAVÍK (2000).
- Campanula trachelium***. **Bystřice:** — 2014. **D. Lištná:** DL1. — 2014. **H. Lištná:** HL2. **Nýdek:** N8, N13, N15, N26. — 2014. **Vendryně:** V25. — 2012 NK047.
Roztroušeně ve světlých lesích a na pasekách.
- Capsella bursa-pastoris*** (nat ar). **Bystřice:** — 2014 NK342. **D. Lištná:** DL2. **Nýdek:** N11. **Vendryně:** V8, V10. — 2012!.
Roztroušeně na polích a na loukách v blízkosti polí.
- Cardamine amara***. **Bystřice:** 2009 Chytil in NDOP. — 2014 NK336. **D. Lištná:** 2004 Hájková in ČNFD. **Nýdek:** N12. **Vendryně:** V12. — 2012 NK031, 2014 NK603.
Roztroušeně kolem pramenišť, lesních potůčků a příkopů.

- Cardamine flexuosa***. **H. Lištná**: 1900 Schube in SCHUBE (1903–1904). **Nýdek**: Uechtritz sec. FIEK (1881), N12, N14. — 2014 NK335. **Vendryně**: V24. — 2012 NK032, 2014 NK290.
Roztroušeně kolem pramenišť, podél příkopů a na lesních cestách.
- Cardamine hirsuta*** (nat ar). **Nýdek**: Čantoryje (KOLBENHEYER 1862; ZATLOUKAL 1969); mokrá louka na úpatí V. Stožku (ZATLOUKAL 1969). **Vendryně**: — V okrasném záhonu 720 m sv. od vápenných pecí (2013!).
Hojný plevel v zahrádkách.
- Cardamine impatiens***. **Nýdek**: stinný les na Čantoryji (Kilián OP sec. ZATLOUKAL 1969); v údolí Hluchové; Mionší (KILIÁN & KILIÁN 1956).
- Cardamine pratensis***. **Bystřice**: ZATLOUKAL (1969). — 2014!. **D. Lištná**: — 2014 NK291. **Nýdek**: ZATLOUKAL (1969), N8. **Vendryně**: — 2012!.
Roztroušeně na vlhkých loukách.
- Cardamine trifolia*** (C3). **Vendryně**: Zaolší, do Mlýnka (1966, 1976 Satora in DLT).
Pokus o ověření výskytu v říjnu 2017 byl neúspěšný (J. Parusel, Katovice, in litt.).
Údaj je skoro jistě mylný.
- Cardaminopsis arenosa***. **Bystřice**: — U žel. trati 980 m sz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014 NK345). **D. Lištná**: odkaliště (DL28). — Tamtéž (2018).
Vendryně: podél Kopytné (V24).
Roztroušeně na lehkých půdách, na železničních náspech a říčních náplavech.
- Carduus acanthoides*** (nat ar). **Bystřice**: ZATLOUKAL (1969). **D. Lištná**: kóta 350 (ZATLOUKAL 1969). **Vendryně**: u mostu přes potok 0,6 km sv. od žel. stanice (V10). — Ruderalizované místo na Černovském 80 m ssz. od žel. stanice Vendryně (2013 NK250).
Vzácně na narušených místech.
- Carduus nutans*** (C4a). **Vendryně**: Babí hora na sv. okraji v lesním zářezu (Vicherek sec. ZATLOUKAL 1969).
Doklad se v herbáři BRNU nepodařilo najít a vzhledem k tomu, že další nálezy ze studovaného území nejsou známy (Hliseníkovský in litt.; srov. J. Štěpánková in PLADIAS 5), jde pravděpodobně o determinační omyl.
- Carex acuta***. **Bystřice**: — Louka u cesty 1,5 km ssv. od žel. stanice Hrádek (2014 NK484). **D. Lištná**: odkaliště (DL28).
R. Řepka revidoval sběr NK484 jako přechodný morfortyp mezi *Carex acuta* a *C. nigra*.
- Carex brizoides***. **Bystřice**: zarostlá plocha uprostřed louky, asi odvodněný močál, sv. okraj obce, asi 1 km sv. od kostela (B22). **Nýdek**: 2002 Holuša in NDOP.
Vendryně: Babí hora (ZATLOUKAL 1969).
- Carex canescens***. **Bystřice**: vyschlá tůň jen s nepatrným zbytkem vody v centru obce u potoka Prašivka (2012 Višňák in NDOP; srov. PLADIAS 4).
- Carex caryophylla***. **Bystřice**: — 2014 NK341. **D. Lištná**: ZATLOUKAL (1969), DL3, DL10, DL11. — 2014 NK292. **Nýdek**: ZATLOUKAL (1969). — U skokanských můstků 1,6 km sv. od dřevěného kostela v Nýdku (2018). **Vendryně**: Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969), V2.
Roztroušeně na loukách a mezích.
- Carex contigua***. **D. Lištná**: ZATLOUKAL (1969), DL6. **H. Lištná**: u cesty vlevo za hasičskou zbrojnicí (Gill 1969 OP, PR sec. PLADIAS 2). **Nýdek**: N12. — 2014!.
Vendryně: ZATLOUKAL (1969), V3. — 2012 NK034 (rev. R. Řepka), 2014.
Roztroušeně na loukách a ve světlých listnatých lesích.

- Carex demissa.** **H. Lištná:** vlhký příkop podél polní cesty při státní hranici směr Kojkovice 0,5 km sv. od obce (HL6). **Nýdek:** les mezi osadami Zakámen a Díly 1,7 km svv. od okraje Nýdku (N15); osada Zakámen, 2,4 km svv. od sv. okraje Nýdku (N16); podmáčená svahová louka jv. od osady Padový (N18).
- Carex digitata.** **D. Lištná:** fragment *Quercus-Carpineta* na sz. a záp. svahu kóty 403 (DL1). — Listnatý les na jv. svahu kopce Jahodná 200 jz. od vrcholu (2014 NK288). **Vendryně:** Babí hora, bučina na sv. svahu (Vicherek sec. ZATLOUKAL 1969). — Břehový porost potoka Vápenka 720 m sv. od vápenných pecí (2012!). Roztroušeně v listnatých lesích.
- Carex distans** (C3). **D. Lištná:** — Podmáčená louka nad odkalištěm 380 m sv. od vrcholu Jahodné (2014 NK355). **H. Lištná:** vlhký příkop podél polní cesty při státní hranici směr Kojkovice 0,5 km sv. od obce (HL6). **Vendryně:** ONDRASZEK et al. (2004).
Vzácně na vlhkých loukách.
- Carex echinata.** **Bystřice:** V Pasekách, na mokré louce u silnice pod lesem (Gill 1984 OL sec. PLADIAS 4). **Nýdek:** podmáčená svahová louka jv. od osady Padový (N18).
- Carex flacca.** **H. Lištná:** příkopy, travníky a okraje polní kultury (kukuřice) podél silnice v obci při státní hranici (HL5); vlhký příkop podél polní cesty při státní hranici směr Kojkovice 0,5 km sv. od obce (HL6.)
- Carex flava s. str.** (C4a). **Bystřice:** 2003 Hustáková in NDOP. **H. Lištná:** Kilián 1956 OP sec. PLADIAS 1. **Nýdek:** vlhké svahové louky sev. od odbočky silnice na V. Čantoryji (N10). — Louka 1 km vjv. od dřevěného kostela v Nýdku (2014!). **Vendryně:** Prašivá, mokrá louka (ZATLOUKAL 1969). — Vlhká louka u červeně značené turistické lesní stezky mezi smrkovými lesy na sev. svahu Ostrého vrchu 1,5 km vsv. od vápenných pecí (2013!).
Roztroušeně na podmáčených loukách.
- Carex hirta.** **Bystřice:** Zatloukal 1968 BRNU, rev. V. Grulich srov. ZATLOUKAL (1969). — 2014 NK352 (rev. V. Grulich). **D. Lištná:** DL2. — 2014 NK353 (rev. V. Grulich). **H. Lištná:** HL5, HL6. **Nýdek:** N10, N13, N18. **Vendryně:** V25. — 2012 NK035 (rev. V. Grulich), 2014.
Hojně na suchých i podmáčených loukách, na říčních náplavech i v lesních lemech.
- Carex muricata.** **D. Lištná:** odkaliště (DL28; agg.). — Odkaliště 670 m sv. od vrcholu Jahodné (2014!). **Vendryně:** — Smrkový les na sev. svahu Vendryňského háje 1,2 km vsv. od vápenných pecí (2012 NK037).
Vzácně na druhotných stanovištích.
- Carex nigra.** **Bystřice:** 2003 Hustáková in NDOP. **D. Lištná:** — 2014 NK347 (rev. R. Řepka). **H. Lištná:** HL6. **Nýdek:** N18. — 2013!. **Vendryně:** 2004 Hustáková in NDOP.
Roztroušeně na vlhkých loukách a lesních lemech.
- Carex —e** (C4a). **Bystřice:** — 2014. **D. Lištná:** — 2014 NK354. **H. Lištná:** HL4, HL6. **Vendryně:** V3.
Roztroušeně na vlhkých loukách.
- Carex ovalis.** **Bystřice:** — 2014. **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969). **H. Lištná:** HL6. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N14, N20, N21, N22. — 2013 NK252, 2014 NK348. **Vendryně:** V18. — 2012 NK033 (rev. R. Řepka).
Hojně na vlhkých loukách a v lesních lemech.
- Carex pallescens.** **D. Lištná:** — 2014 NK351. **H. Lištná:** HL6. **Nýdek:** N1, N14, N18, N21. — 2014 NK350. **Vendryně:** V4, V11. — 2012 NK036, 2014!.
Hojně na vlhkých loukách.

- Carex panicea.** Bystřice: 2003 Hustáková in NDOP. **D. Lištná:** — 2013 NK251. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. **Nýdek:** N18. **Vendryně:** 2001 Derková in NDOP. Roztroušeně na vlhkých loukách.
- Carex pendula** (C4a). **Nýdek:** Nýdecká seč (Kotschy sec. KOLBENHEYER 1862); Čantoryje (Kotschy sec. KOLBENHEYER 1862; PODPĚRA 1921; OTRUBA 1926). **Vendryně:** jz. svahy Ostrého (kóta 709,1 m; V22). — Travnatý břeh rybníka na potoce Vápenka 720 m sv. od vápenných pecí (2012 NK038). Vzácně na březích vodních toků a vodních ploch.
- Carex pilosa.** **Nýdek:** 1989 Hájková in NDOP. **Vendryně:** Malý Ostrý (1859 KOLBENHEYER 1862).
- Carex pilulifera.** Bystřice: B16. **Nýdek:** N13, N21, N40, N42, N43. — Ekoton louka–les pod M. Sošovem 700 m zjz. od vrcholu M. Sošova (2014 NK349). Vzácně na rozvolněných lesních okrajích a v lesních lemech.
- Carex pseudocyperus** (C4a). **Nýdek:** lesní bažiny na Čantoryji (KOLBENHEYER 1862). Vzhledem k udávanému biotopu se jedná pravděpodobně o determinální omyl. Údaj jako „úpatí Čantoryje“ přejímá OTRUBA (1926).
- Carex remota.** **D. Lištná:** DL14. — 2014!. **H. Lištná:** — 2014. **Nýdek:** N13, N14, N15, N28. — 2014 NK504. **Vendryně:** V4, V11, V12, V22. — 2012 NK041 (rev. V. Grulich), 2014. Hojně na podmáčených loukách, podél potoků a lesních příkopů.
- Carex rostrata.** **Nýdek:** Čantoryje (OTRUBA 1926); bažiny na Čantoryji (KOLBENHEYER 1862).
- Carex sylvatica.** Bystřice: 2009 Chytil in NDOP. — 2014 NK346. **D. Lištná:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), DL7, DL8, DL18. — 2014!. **H. Lištná:** HL6. — 2014. **Nýdek:** N4, N14, N15, N28, N29, N31, N32, N33. — 2014!. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969), V17, V22, V23. — 2012 NK039, 2012 NK040. Hojně ve světlých lesích a v lesních mýtinách.
- Carex vesicaria.** Bystřice: — Podmáčená louka 2 km již. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014); podmáčená louka 920 m jv. od vrcholu Prašivé (2014). **D. Lištná:** odkaliště (DL28). **Nýdek:** — Podmáčená louka 1,1 km vých. od dřevěného kostela v Nýdku (2014!). Roztroušeně na podmáčených loukách.
- Carex vulpina.** **D. Lištná:** Jahodná (Duda 1987 OP sec. PLADIAS 4).
- Carlina acaulis** subsp. *acaulis*. **D. Lištná:** DL3, DL4, DL9. — 2014. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N1, N2, N9, N11, N20, N22. — 2014. **Vendryně:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), V5. — 2014. Roztroušeně na loukách, horských pastvinách a pasekách.
- Carlina vulgaris.** **D. Lištná:** DL3, DL10, DL11. — U lomu jihozápadně od odkaliště 480 m S od vrcholu Jahodné (2014!); odkaliště (2018!). **H. Lištná:** HL4, HL5. **Nýdek:** — Louka na jv. svahu Vrchhory 80 jv. od vrcholu (2018). **Vendryně:** Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969), V2, V11. V území roztroušená.
- Carpinus betulus.** Bystřice: B11. — 2014. **D. Lištná:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), DL1, DL18, DL19, DL20, DL23. **H. Lištná:** HL2. — 2014. **Nýdek:** N10. — 2014. **Vendryně:** Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969), V22, V23. — 2012!. Hojný v listnatých i suťových lesích.
- Carum carvi.** **D. Lištná:** DL3, DL4. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. **Nýdek:** N9, N12. **Vendryně:** Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969). Kmín jsem nejspíše přehlédla; snad už není v území tak běžný jako v minulosti.

Centaurea cyanus (nat ar). **Bystřice:** jako plevel mezi obilím (ZATLOUKAL 1969). — Pole 680 m jv. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014). **D. Lištná:** jako plevel mezi obilím (ZATLOUKAL 1969); vrch Jahodná, u kalové nádrže, 406 m (Burša 1975 FMM sec. CIMALOVÁ 2006). **H. Lištná:** vlhký příkop podél polní cesty při státní hranici směr Kojkovice 0,5 km sv. od obce (HL6). **Nýdek:** pole (Knápková 1991 OL sec. PLADIAS 6). **Vendryně:** plevel mezi obilím (ZATLOUKAL 1969). — Pole pod Prašivou horou nedaleko rodinného domu č. p. 512, 1,5 km jjv. od kostela (2012 NK054, rev. P. Koutecký).

Vzácně na polích.

Centaurea erdneri (C3). **D. Lištná:** DL8 jako *C. pseudophrygia*. **H. Lištná:** HL2 jako *C. pseudophrygia*. **Nýdek:** N2, N9, N12, N19 vše jako *C. pseudophrygia*. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969), V2 obojí jako *C. pseudophrygia*. — Křovinatý lesní lem pod Prašivou horou nedaleko rodinného domu č. p. 1106, 960 m jjv. od kostela (2012 NK232); louka na jv. svahu kopce Babí hora 160 m záp. od vápenných pecí (2012 NK233 a NK236); louka Pod Malým Ostrým 1,5 km sv. od vápenných pecí (2012 NK234; vše det. P. Koutecký).

Hojně na málo sečených loukách, pastvinách a podél cest.

Centaurea jacea. Vendryně: V25.

Tato chrpa se v čistých populacích ve studovaném území nevyskytuje a údaje se pravděpodobně vztahují k *C. erdneri* nebo jejím křížencům (srov. Koutecký in PLADIAS 4).

Centaurea jacea subsp. *oxylepis* (C4a). **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), DL2, DL3, DL4, DL28. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6.

Tato chrpa se v čistých populacích ve studovaném území nevyskytuje a údaje se pravděpodobně vztahují k *C. erdneri* nebo jejím křížencům (srov. Koutecký in PLADIAS 4).

Centaurea erdneri* × *C. jacea* subsp. *oxylepis. **Bystřice:** — Náplavy řeky Olše 700 m jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014 NK565). **D. Lištná:** — Odkaliště 860 m sv. od vrcholu Jahodné (2014 NK569). **H. Lištná:** vrch Vružná, louka (Burša 1976 FMM sec. PLADIAS 4). **Nýdek:** — Louka 1,2 km jz. od vrcholu V. Čantoryje (2014!). **Vendryně:** — Pastvina na již. svahu kopce Vružná 700 m sv. od vápenných pecí (2012 NK235); louka na sz. svahu Vendryňského háje 750 m sv. od vápenných pecí (2012; vše det. P. Koutecký).

Hojně na málo sečených loukách, pastvinách a podél cest.

Centaurea erdneri* × *C. jacea* × *C. jacea* subsp. *oxylepis. **Nýdek:** svahová kosená louka 0,85 km vjv. vrcholu kopce Mionší (Čáp 2001 BRNM sec. PLADIAS 4).

Centaurea* × *melanocalathia (*C. erdneri* × *C. jacea*). **Nýdek:** — U cesty 700 m zsz. od vrcholu V. Stožku (2014 NK572, det. P. Koutecký).

Centaurea scabiosa. **D. Lištná:** Kilián 1964 OP & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969), DL2, DL3, DL9, DL11, DL13. — 2014. **H. Lištná:** HL4, HL5. **Vendryně:** Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969), V5. — 2012!.

Roztroušené na loukách, pastvinách a mezích.

Centaureum erythraea* subsp. *erythraea (C4a). **D. Lištná:** louka na kótě 403 (ZATLOUKAL 1969); odkaliště (DL28). — Křoviny u vodní plochy na odkališti 860 m sv. od vrcholu Jahodné (2014 NK464). **H. Lištná:** vlhký příkop podél polní cesty při státní hranici směr Kojkovice 0,5 km sv. od obce (HL6). **Nýdek:** podmáčená svahová louka jv. od osady Padový (N18). **Vendryně:** Babí hora, pastvina na sev. okraji (ZATLOUKAL 1969); vlhká lesní světlina při lesní cestě mezi

Babí horou a Vružnou sev. od obce (V3). — Vlhký travnatý průsek v lese pod Vendryňským hájem 1,4 km sv. od vápenných pecí (2012 NK059).

Vzácně na vlhčích lokalitách. Pravděpodobně ustupuje.

Centaurea pulchella (C3). D. Lištná: na louce, kóta 403 (ZATLOUKAL 1969).

Výskyt je málo pravděpodobný a doklad k nálezu v BRNU se nepodařilo najít.

***Cephalanthera damasonium* (C4a). Bystřice:** — Les 1,5 km sv. od žel. stanice Hrádek (2014 NK340, rev. M. Kotlínek). **D. Lištná:** KILIÁN (1969); Kilián 1958 OP sec. ZATLOUKAL (1969); 1972 Kryška, 1983 Liberdová sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996); DL1; DL6; 2002 Krzyžanková in KRZYŽANKOVÁ (2004); ONDRASZEK et al. (2004); 2007 Ladányi in litt. **H. Lištná:** Kilián 1956 OP a NJM, Burša 1975 FMM, Duda 1975 OP sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996). **Nýdek:** Pawlicová 1955 OL ibidem. — Les u červeně značené turistické lesní cesty 2 km jz. od vrcholu V. Čantoryje (2014!). **Vendryně:** KILIÁN (1969); 1971 Kryška sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996); ONDRASZEK et al. (2004); LADÁNYI (2008). — Les na záp. svahu Vružné 1 km sz. od vápenných pecí (2014); les pod psím hřbitovem 620 m z. od vrcholu Žďáru (2014!).

Roztroušeně v listnatých lesích.

Cephalanthera longifolia (C3). Nýdek: Čantoryje, „pochybný“ (KOLBENHEYER 1862).

Vzhledem k tomu, že od té doby okrotici dlouholistou na Čantoryji nikdo nesbíral, jde nejspíš o mylný údaj, který ostatně zpochybnil i sám autor.

***Cerastium arvense*. Bystřice:** ZATLOUKAL (1969). **D. Lištná:** v lomu na vrchu Jahodná (Burša 1975 FMM sec. PLADIAS 3). **H. Lištná:** ZATLOUKAL (1969). **Nýdek:** N9, N22. — 2014. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969). — 2013 NK244, 2014 NK334 (obojí rev. J. Danihelka).

Vzácně podél cest a na sušších místech.

***Cerastium glomeratum*. Nýdek:** osada Střelma, 1,5 km zsz. od vrcholu M. Sošova (kóta 764; N11).

***Cerastium holosteoides* subsp. *triviale*. Bystřice:** — 2014 NK333 (rev. J. Danihelka).

D. Lištná: DL3, DL4. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. **Nýdek:** N12, N14. — 2014!.

Vendryně: V1. — 2012 NK028, 2013 NK243 (rev. J. Danihelka).

Roztroušeně na loukách, pastvinách a podél cest.

***Cerastium lucorum* (C4a). D. Lištná:** — Les u odkaliště 480 m sv. od vrcholu Jahodné (2014!). **Nýdek:** — Ekoton louka–les pod M. Sošovem 760 m záp. od vrcholu M. Sošova (2014 NK332; rev. J. Danihelka). **Vendryně:** vlhká lesní světlina při lesní cestě mezi Babí horou a Vružnou sev. od obce (V3). — U lesní cesty mezi Babí horou a Vružnou 910 m sz. od vápenných pecí (2013 NK245).

Roztroušeně v bylinném porostu podél lesních cest.

***Cerinth minor* (C4a). D. Lištná:** v kamenolomu (KILIÁN 1969; Kilián 1958 OP sec. ZATLOUKAL 1969). **H. Lištná:** pole za hřbitovem (Kilián 1958 OP sec. ZATLOUKAL 1969; DUDA 1959; KILIÁN 1960); vlhký příkop podél polní cesty při státní hranici směr Kojkovice 0,5 km sv. od obce (HL6). **Vendryně:** — Okraj lesa na již. svahu kopce Vružná 800 m sev. od vápenných pecí (2013!).

Vzácně, na Vružné jen několik jedinců. Pravděpodobně ustupuje.

***Chaerophyllum aromaticum*. Bystřice:** B1, B3, B8, B11. **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), DL2. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N9, N16, N19, N25, N26. — 2013 NK247, 2014. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969), V5, V19. — 2012!.

Hojně podél lesních cest, v blízkosti vodních toků a podél vlhkých lesních lemů.

- Chaerophyllum hirsutum***. Bystřice: B3, B4, B6. — 2014 NK331. **D. Lištná:** DL15, DL22. **H. Lištná:** HL5, HL6. **Nýdek:** N9, N12, N13, N25, N26. — 2013!, 2014!. **Vendryně:** V9. — 2012!.
Hojně podél lesních cest, v blízkosti vodních toků a ve vlhkých lesních lemech.
- Chamaecytisus ratisbonensis*** (C4a). Vendryně: Uechtritz sec. FIEK (1881); OTRUBA (1926) a PODPĚRA (1949).
Pravděpodobně jde o jediný, opakovaně přebíraný údaj, který Skalická (in SLAVÍK 1995) nejspíš oprávněně považuje za pochybný.
- Chelidonium majus*** (nat ar). Bystřice: B5, B7. **Nýdek:** — 2014. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969), V5. — 2012!.
Roztroušeně podél cest a na narušených místech.
- Chenopodium album***. Bystřice: B21 (agg.). — 2014!. **D. Lištná:** DL2. **Vendryně:** V24 (agg.). — 2012 NK103, 2012 NK104.
Hojně podél cest, na polích a narušených místech.
- Chenopodium bonus-henricus*** (C4a, nat ar). **D. Lištná:** DL2, DL15. **Nýdek:** N16, N23. **Vendryně:** V6.
- Chenopodium glaucum***. Bystřice: jv. okraj obce, u žel. přejezdu asi 1 km jv. od kostela poblíž hnojiště (B21). **D. Lištná:** vsv. část města při silnici do Vendryně přes Sosnu, mezi údolím Olše a pravostranným přítokem (DL15). **H. Lištná:** příkopy, trávníky a okraje polní kultury (kukuřice) podél silnice v obci při státní hranici (HL5).
- Chenopodium polyspermum***. **D. Lištná:** příkopy a trávníky podél silnice směr H. Lištná (DL2). **Nýdek:** Gora (N44).
- Chenopodium rubrum***. **D. Lištná:** odkaliště (DL28).
- Chrysosplenium alternifolium***. Bystřice: — 2014 NK343. **D. Lištná:** — 2014 NK293. **Nýdek:** N13. — 2014. **Vendryně:** 2007 Hutýrová in NDOP. — 2012!.
Roztroušeně na vlhkých loukách, podél vlhkých lesních lemů a vodních toků.
- Cicerbita alpina*** (C4a). **Nýdek:** Čantoryje (KOLBENHEYER 1862; Kotschy sec. FIEK 1881).
- Cichorium endivia*** (cas neo). Vendryně: křovinaté stráně nad potokem v sv. části obce (V5).
Z údaje nevyplývá, zda jde o zplanělý výskyt anebo o záznam pěstovaných rostlin. Vzhledem k tomu, že nejsou uvedeny podrobnosti, domnívám se, že se údaj vztahuje k pěstovaným rostlinám.
- Cichorium intybus*** (nat ar). Bystřice: B1. **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), DL3, DL4, DL28. — 2014. **H. Lištná:** HL4, HL5. **Vendryně:** V13. — 2012!.
Roztroušeně podél cest, v příkopech a na mezích.
- Circaea alpina***. **Nýdek:** Čantoryje (KOLBENHEYER 1862; ZATLOUKAL 1969); potok Střelma a na V. Čantoryji (KILIÁN 1969); Janula, Střelma, údolí Hluchové, V. Sošov (ZATLOUKAL 1969); V. Čantoryje (kóta 995), pokračování hřebene podél červeně značené turistické cesty 0,5 km jv. od vrcholové kóty (N20). **Vendryně:** údolí Kopytné (KILIÁN & KILIÁN 1956); Liderov (KILIÁN 1969).
- Circaea lutetiana***. Bystřice: — 2014!. **D. Lištná:** DL1, DL14. **H. Lištná:** HL2. — 2014!. **Nýdek:** N4, N20. — 2014 NK513. **Vendryně:** V12. — 2012 NK055.
Hojně podél lesních cest, na rozvolněných vlhkých lesních okrajích.
- Circaea ×intermedia*** (*C. alpina* × *C. lutetiana*). **Nýdek:** Střelma, Zakámen (ZATLOUKAL 1969); osada Střelma, 1,5 km zsz. od vrcholu M. Sošova (kóta 764; N11). — Okraj lesní cesty 2 km záp. od vrcholu V. Čantoryje (2014!). **Vendryně:**

- U potoka Kopytná 1,9 km jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2013!); lesní lem pod psím hřbitovem 600 m záp. od vrcholu Žďáru (2014 NK512).
Hojně podél lesních cest, na rozvolněných vlhkých lesních okrajích.
- Cirsium arvense** (inv ar). **Bystřice:** B22. — 2014!. **D. Lištná:** DL2. — 2014. **H. Lištná:** HL6. **Nýdek:** N9. — 2013!, 2014!. **Vendryně:** V1. — 2012!.
Hojně na narušených místech, na vlhkých loukách a podél cest.
- Cirsium eriophorum** (C3). **Vendryně:** Babí hora (Zatloukal & Vicherek sec. ZATLOUKAL 1969); Vružná (ZATLOUKAL 1969).
- Cirsium oleraceum.** **Bystřice:** B3, B8. — 2014. **D. Lištná:** DL2, DL28. — 2014. **H. Lištná:** HL5, HL6. **Nýdek:** 2002 Holuša in NDOP. — 2014. **Vendryně:** V22. — 2012!.
Hojně na mezofilních loukách a v pobřežních houštinách.
- Cirsium palustre.** **Bystřice:** 2003 Hustáková in NDOP. — 2014 NK566. **H. Lištná:** HL6. **Nýdek:** N4, N12. — 2014 NK606. **Vendryně:** V11. — 2012!, 2013!.
Hojně na vlhkých loukách a podél potoků.
- Cirsium rivulare.** **Bystřice:** KOLBENHEYER (1862), ZATLOUKAL (1969). **D. Lištná:** DL7. — 2013 NK249. **H. Lištná:** HL5, HL6. **Nýdek:** N13, N24, Bureš in SLAVÍK & ŠTĚPÁNKOVÁ (2004). — 2014 NK498. **Vendryně:** KOLBENHEYER (1862), V5, V10, V14, V15, ONDRASZEK et al. (2004). — 2014.
Roztroušeně na podmáčených loukách.
- Cirsium vulgare.** **D. Lištná:** DL4, DL28. — 2014. **H. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), HL4, HL5. **Nýdek:** Kilián 1958 OP & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969), N9, N16, N17, N25. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969). — 2012!, 2013 NK248.
Hojně na pastvinách, pasekách a v křovinách.
- Cirsium ×subalpinum** (*Cirsium palustre* × *C. rivulare*). **Vendryně:** — Vlhký travnatý průsek v lese pod Vendryňským hájem 1,4 km vsv. od vápenných pecí (2012!).
- Cirsium ×subspinuligerum** (*Cirsium palustre* × *C. vulgare*). **Vendryně:** u mostu přes potok 0,6 km sv. od žel. stanice (V10).
- Cirsium ×sessile** (*C. arvense* × *C. oleraceum*; cas ar). **D. Lištná:** Bureš in SLAVÍK & ŠTĚPÁNKOVÁ (2004).
- Citrullus lanatus** (cas ar). **Bystřice:** — Náplavy řeky Olše 700 m jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014 NK589).
Zplanělý výskyt.
- Clinopodium vulgare.** **D. Lištná:** KILIÁN & KILIÁN (1956), ZATLOUKAL (1969), DL3, DL14, DL28. — 2014. **H. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), HL4. **Nýdek:** N11. — 2014. **Vendryně:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), V8. — 2012 NK057, 2012 NK058.
Roztroušeně v lesních lemech a v travnatých lemech podél cest.
- Coeloglossum viride** (C2). „Auf der Czantory“ (KOLBENHEYER 1862; Kotschy sec. FIEK 1881).
Údaje se nejspíš vztahují k výskytu na sev. svahu vrchu, tj. dnes na polském území. Pravděpodobně jde o jediný nález, který jako první uvádí WIMMER (1832 [Bei Ustroń a. d. gr. Czantory]). Podle Květeny ČR (Procházka in ŠTĚPÁNKOVÁ 2010) se ve fytogeografickém okrese 99b. Slezské Beskydy nevyskytuje.
- Colchicum autumnale.** **D. Lištná:** DL21. — 2014. **H. Lištná:** HL4, HL6. **Nýdek:** N10, N13. — 2013. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969). — 2012!, 2014.
Vzácně na loukách, obvykle pospolitě.
- Commelina communis** (cas neo). **Vendryně:** — Okraj lesní cesty na jv. svahu kopce Babí hora 150 m jz. od vápenných pecí (2012!).
Vzácně a nejspíš přechodně na okrajích cest.

- Consolida regalis* (nat ar). **D. Lištná:** na poli (ZATLOUKAL 1969).
- Convolvulus arvensis* (nat ar). **Bystřice:** — 2014. **D. Lištná:** DL2. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. **Vendryně:** V1. — 2012!.
Hojně podél cest, na polích a narušených místech.
- Conyza canadensis* (inv neo). **Bystřice:** — 2014!. **D. Lištná:** DL28. — 2014. **Nýdek:** — 2013 NK246. **Vendryně:** V6. — 2012 NK029, 2012 NK030.
Hojně na okrajích cest, na říčních náplavech a narušených místech.
- Corallorhiza trifida* (C2). Kl. Ostry (1886 a 1889 Schube in SCHUBE 1903–1904).
Naše novější floristická literatura údaj nezmiňuje (srov. JATIOVÁ & ŠMITÁK 1996 a Procházka in ŠTĚPÁNKOVÁ 2010). Nelze totiž rozhodnout, zda šlo o výskyt na české anebo polské straně hraničního hřebene.
- Cornus sanguinea* subsp. *australis* (C4b). **Bystřice:** 2002 Holuša in NDOP. — 2014; Na Pasekách, lesní mýtina s vysazenými smrky 1,6 km již. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2018 NK619). **D. Lištná:** DL9. **H. Lištná:** HL5. **Nýdek:** N9, N19. **Vendryně:** Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969), V11. — 2012!.
Holub (in SLAVÍK 1997) uvádí *Swida sanguinea* vergentní typ k *S. hungarica* z Nýdku.
Hojně na lesních okrajích, mezích nebo v pobřežních křovinách.
- Corydalis cava*. **D. Lištná:** — Les u bezejmen. potoka 550 m již. od vrcholu Jahodné (2015). **Nýdek:** V. Čantoryje (KOLBENHEYER 1862); v údolí Hluchové v bučině (ZATLOUKAL 1969). **Vendryně:** Babí hora (Vicherek sec. ZATLOUKAL 1969). — Listnatý les na již. svahu kopce Vružná 800 m ssv. od vápenných pecí (2012!); břehový porost potoka Vápenka 720 m sv. od vápenných pecí (2012!); vlhký les blízko potoka při úpatí Jahodné 400 m jv. od vrcholu (2014 NK289).
Vzácně v rozvolněných lesních okrajích.
- Corydalis solida* (C4a). **Nýdek:** V. Čantoryje (Stein sec. FIEK 1881); Nýdek (2003 Hustáková in NDOP); Zakámen (Čížková in NDOP).
- Corylus avellana*. **Bystřice:** B8. — 2014. **D. Lištná:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), DL18, DL19, DL20, DL21, DL28. — 2014. **H. Lištná:** — 2014. **Nýdek:** N7, N12. — 2014. **Vendryně:** V22. — 2012!.
Hojně podél lesních okrajů, podél cest a v pobřežních křovinách.
- Crataegus laevigata*. **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), DL1, DL8, DL10, DL13. **H. Lištná:** ZATLOUKAL (1969). **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969). — 2014 NK588.
Roztroušeně na mezích a v křovinatém porostu lesů.
- Crataegus monogyna*. **Bystřice:** — 2014 NK612. **D. Lištná:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), DL18. **H. Lištná:** ZATLOUKAL (1969). **Vendryně:** Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969).
Roztroušeně na mezích a v křovinatém porostu lesů.
- Crataegus praemonticola* (C4b). **D. Lištná:** křovinaté svahy 0,3 km vých. od vých. okraje obce (DL13). **Vendryně:** křovinaté stráně nad potokem v sv. části obce (V5). — Břehový porost potoka Vápenka 720 m sv. od vápenných pecí (2012 NK230 a NK231).
Roztroušeně na mezích a v křovinatém porostu lesů.
- Crataegus* × *macrocarpa* (*C. laevigata* × *C. praemonticola*). **D. Lištná:** DL9.
- Crataegus* × *macrocarpa* × *C. praemonticola*. **D. Lištná:** Holub in HEJNÝ & SLAVÍK (1992).
- Crataegus laevigata* × *C. × media*. **H. Lištná:** Holub in HEJNÝ & SLAVÍK (1992).

- Crepis biennis*.** Bystřice: ZATLOUKAL (1969), B1. **D. Lištná:** DL3, DL4, DL7, DL28. — 2014. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. **Nýdek:** N9, N13, N15. — 2014 NK499 (rev. Z. Kaplan). **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969), V1. — 2012 NK051 (rev. Z. Kaplan). Hojně na loukách, pastvinách a podél cest.
- Crepis capillaris*** (nat ar). **D. Lištná:** pravý břeh potoka Lištnice (Burša 1975 FMM sec. PLADIAS 6). **H. Lištná,** vrch Vružná, louka (Burša 1975 FMM sec. PLADIAS 6). **Nýdek:** les mezi osadami Zakámen a Díly 1,7 km svv. od okraje Nýdku (N15; Zakámen srov. Kaplan & Kirschner in SLAVÍK & ŠTĚPÁNKOVÁ 2004). **Vendryně:** — Les pod kopcem Malý Kozinec 3,5 km jz. od žel. stanice Bystřice (2012!). Vzácně na loukách a v lesních okrajích.
- Crepis paludosa*.** **D. Lištná:** naučná stezka Jahodná (DL17). **Nýdek:** Góra, lesní okraje a pastviny 1 km záp. od autobusové zastávky (N5); osada Střelma, údolí prvního přítoku potoka Střelma 0,5 km vsv. od ústí (N13). **Vendryně:** — Prameniště Vendryňky 1,9 km vých. od vápenných pecí (2018, TKÁČIKOVÁ in prep.). Roztroušeně na vlhkých místech.
- Cruciata glabra*.** **D. Lištná:** louka na Jahodné 360 m sv. od vrcholu Jahodná (2012 Višňák in NDOP). Na lokalitě, kterou uvádí Višňák, se druh nevyskytuje a údaj je s velkou pravděpodobností mylný. Údaj „Czantory bei Ustroń“ (WIMMER 1841; KOLBENHEYER (1862) jen „Czantory“) se zřejmě vztahuje k polské straně pohraničního hřebene.
- Cruciata laevipes*.** Bystřice: B1. — 2014!. **D. Lištná:** Kilián 1964 OP sec. ZATLOUKAL (1969), DL14. — 2014!. **H. Lištná:** HL1. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969). **Vendryně:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), V5, V11. — 2012 NK053, 2014. Roztroušeně na loukách a pastvinách.
- Cuscuta epithymum*.** **D. Lištná:** kóta 403 (ZATLOUKAL 1969). **Vendryně:** — Louka na hřebenu kopce Vružná 880 m sev. od vápenných pecí (2012!). V území vzácně parazituje na jiných rostlinách.
- Cymbalaria muralis*** (nat ar). Bystřice: řeka Olše, šterkový náplav z roku 2010, 600 m pod soutokem s Hluchovou (Hlisenikovsky 2011 FMM sec. ND MSP ČBS).
- Cynosurus cristatus*.** Bystřice: — 2014. **D. Lištná:** DL3, DL4. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. **Nýdek:** N9, N11. **Vendryně:** V14. — 2012 NK052. Roztroušeně na loukách a pastvinách.
- Cyperus flavescens*** (C1). Bystřice: 1902 Schube in SCHUBE (1903–1904). Lokalita jistě dávno zanikla (srov. Šumberová & Dřevojan in PLADIAS 2).
- Cypripedium calceolus*** (C2). Stará Lištná (KOLBENHEYER 1862; OTRUBA 1926; PODPĚRA 1949); mezi Kanskou a H. Lištnou (KILIÁN & KILIÁN 1956). **D. Lištná:** poměrně vzácně (MÍČKOVÁ 1958); Jahodná (1951–1955 Liberdová sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK 1996); D. Lištná (Kilián 1955 OSM, Kilián 1955, 1956, 1957 OP, Míčková 1957 CESK, 1967 Olšanská, Míčková 1973 BRNU, 1983 Liberdová sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK 1996). **H. Lištná:** H. Lištná (Kilián 1955 OSM, 1971 Křkavec sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK 1996); vzácně ve smíšeném listnatém lese Vružné (1955, 1960 Kilián in KILIÁN 1969; Kilián 1960 OP sec. ZATLOUKAL 1969). **Vendryně:** KOLBENHEYER (1862). Dále: Formánek sec. PODPĚRA (1921); OTRUBA (1926); PODPĚRA (1949); vzácně ve smíšeném listnatém lese Vružné (1955, 1960 Kilián in KILIÁN 1969). Procházka (in ŠTĚPÁNKOVÁ 2010) považuje všechny citované výskyty za zaniklé.
- Cystopteris fragilis*.** Bystřice: — 2014 NK600. **D. Lištná:** DL27. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969). — 2014!. **Vendryně:** — 2014!. Roztroušeně v lesích na skalních výchozech, sutích a trouchnivějších pařezích.

- Cytisus scoparius* (nat neo). **Bystřice:** — Břeh potoka Kopytná, 1,5 km jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014 NK582). **Nýdek:** v údolí Hluchové (ZATLOUKAL 1969). **Vendryně:** podél Kopytné (V25). — Louka mezi smrkovými lesy na sev. svahu Ostrého vrchu 1,5 km vsv. od vápenných pecí (2013!); louka pod psím hřbitovem 440 m záp. od vrcholu Žďáru (2014 NK552). Roztroušeně podél lesních lemů a na pasekách.
- Dactylis glomerata*. **Bystřice:** B23. — 2014!. **D. Lištná:** DL3, DL4, DL6, DL28. — 2014. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. **Nýdek:** N22. — 2014. **Vendryně:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), V1, V8. — 2012!, 2014!.
Hojně na loukách, pastvinách, v lesních lemech a podél cest.
- Dactylis polygama*. **Bystřice:** B11. **D. Lištná:** DL1, DL6. — Zarostlé schodovitě stupně na odkališti 600 m zsz. od vodní plochy (2018). **Nýdek:** N31. **Vendryně:** V25. — U modře značené turistické cesty 700 m sv. od vrcholu Žďár (2018 NK620). Roztroušeně na okrajích lesních cest.
- Dactylorhiza fuchsii* subsp. *fuchsii* (C4a). **Nýdek:** 1970 Kryška sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996); Malý Sošov (1976 Kryška ibidem); údolí Hluchové (Kilián 1962 OP ibidem); Střelma (Zatloukal 1968 BRNU ibidem); osada Střelma, údolí prvního přítoku potoka Střelma 0,5 km vsv. od ústí (N13); Čantoryje (Kotschy 1825 BRNM sec. PLADIAS 5; 1986 Hájková sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK 1996). **Vendryně:** 1970 Kryška sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996); podél potoka v lese Rovná 1,6 km jz. od žel. stanice (V17); les záp. od potoka Kopytná podél modře značené turistické cesty 2,7 km jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (V21); jz. svahy Ostrého (kóta 709,1 m; V22); Vendryně (ONDRASZEK et al. 2004). — Les podél červeně značené turistické lesní stezky 1,5 km sv. od vápenných pecí (2013); louka pod psím hřbitovem 610 m záp. od vrcholu Žďáru (2014; *D. maculata* agg.).
Vzácně na loukách nebo ve světlých lesích. U populace z louky pod psím hřbitovem bylo zjištěno metodou průtokové cytometrie na Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (V. Taraška, in litt.), že se jedná o tetraploidní jedince morfologicky přechodné mezi *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *fuchsii* a *Dactylorhiza maculata* subsp. *transsilvanica*.
- Dactylorhiza incarnata* (C1). Ustroň: Nydek geg. d. Beskid. (1887 SCHUBE 1903–1904).
Novější údaje neexistují (srov. Kubát in ŠTĚPÁNKOVÁ 2010). Je možné, že se jedná o lokalitu na polské straně Slezských Beskyd nebo o determinační omyl.
- Dactylorhiza maculata* (C1). **Vendryně:** Babí hora (Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL 1969). **Nýdek:** Čantoryje (Žlik sec. KOLBENHEYER 1862); Hluchová (KILIÁN & KILIÁN 1956; ZATLOUKAL 1969).
Údaje jsou skoro jistě mylné a vztahují se nejspíš k druhu *D. fuchsii* (srov. Trávníček & Taraška in PLADIAS 5).
- Dactylorhiza majalis* (C3). **Bystřice:** ZATLOUKAL (1969). **D. Lištná:** Jahodná (1980 Kryška, 1983 Liberlová, Hájková 1989 FMM sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK 1996); louka na Jahodné (2002 Krzyžanková in KRZYŽANKOVÁ 2004). — Jahodná vlhká louka 1,6 km zsz. od vápenných pecí (2014); lesní lem odkaliště 560 m ssv. od vrcholu Jahodné (2014). **H. Lištná:** Vružná (Burša 1975 FMM sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK 1996). **Nýdek:** na mokřích loukách v údolí potoku Hluchová (KILIÁN 1960); Nýdek (1970 Kryška sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK 1996; 2003 Hustáková in NDOP). **Vendryně:** na mokřích loukách v údolí potoků, Kopytná (KILIÁN 1960); Vružná (ZATLOUKAL 1969); Vendryně (1970 Kryška sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK 1996).
Vzácně na vlhkých loukách a rozvolněných lesních okrajích.

- Dactylorhiza sambucina* (C2).** **D. Lištná:** ve dvou exemplářích na suché louce na vrchu Hradisko (KILÍAN 1960). **Vendryně:** Babí hora, na sv. okraji v lesním zářezu, na loukách velmi hojně (Vicherek sec. ZATLOUKAL 1969). Kubát (in ŠTĚPÁNKOVÁ 2010) považuje výskyt za zaniklý.
- Danthonia decumbens*.** **Bystřice:** — Louka u cesty 1,5 km ssv. od žel. stanice Hrádek (2014 NK488). **Nýdek:** osada Střelma, údolí prvního přítoku potoka Střelma 0,5 km vsv. od ústí (N13); V. Čantoryje (kóta 995), pokračování hřebene podél červeně značené turistické cesty 0,5 km jjv. od vrcholové kóty (N20); hřebenové pastviny u státní hranice 1,5 km již. od vrcholu V. Čantoryje (kóta 995; N21). **Vendryně:** — Louka na psím hřbitově na záp. svahu kopce Žďár 460 m záp. od vrcholu (2014). Vzácně na krátkostébelných loukách.
- Daphne mezereum*.** **D. Lištná:** DL3, DL7, DL19. **Nýdek:** 2003 Hustáková in NDOP. — 2014; břehový porost v lese podél Horského potoka 1,4 km jv. od Ostrého vrchu (2018). **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969), V11, V22, V23. — 2012, 2013!. Roztroušeně ve světlých lesích.
- Daucus carota* subsp. *carota*.** **Bystřice:** — 2014. **D. Lištná:** DL4, DL28. — 2014!. **H. Lištná:** HL4, HL5. **Nýdek:** N15. — 2014. **Vendryně:** V24. — 2012 NK064, 2012 NK065. Hojně na loukách, narušených místech a podél cest.
- Dentaria bulbifera*.** **Bystřice:** B3, B5, B6, B8, B18. — 2014!. **D. Lištná:** — 2015. **H. Lištná:** — 2014. **Nýdek:** KOLBENHEYER (1862); Kotschy sec. FIEK (1881); ZATLOUKAL (1969); 1885 Schube in SCHUBE (1903–1904), N26, N27, N28, N29, N31, N33, N40. — 2014 NK294. **Vendryně:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969). — 2012, 2014. Roztroušeně ve světlých lesích.
- Dentaria enneaphyllos* (C3).** **Nýdek:** 1886 Schube in SCHUBE (1903–1904); Filipka, mezi Pleniskem a Dílkem, Sošov (1965 Satora in DLT). — Les podél červeně značené turistické cesty 1,9 km vých. od vrcholu V. Čantoryje (2014 NK296). **Vendryně:** — Strmý svah nad bezejmenným potokem 640 m jjz. od vrcholu Jahodná, 100 m před ústím potoka do Olše (2015). Vzácně ve světlých lesích.
- Dentaria glandulosa* (C3).** **Bystřice:** 1885 Schube in SCHUBE (1903–1904), B9. — 2014 NK297. **D. Lištná:** DL18, DL27. — 2015. **H. Lištná:** ZATLOUKAL (1969). **Nýdek:** WIMMER (1841); KOLBENHEYER (1862); ZATLOUKAL (1969); 1885 Schube in SCHUBE (1903–1904); ZATLOUKAL (1969), N13, N14, N26, N27, N28, N29, N31, N32, N33. — 2014 NK295. **Vendryně:** V22. — 2012!. Hojně ve světlých lesích, především podél potoků.
- Deschampsia cespitosa*.** **Bystřice:** B15. — 2014. **D. Lištná:** DL28. — 2014. **H. Lištná:** HL6. — 2014!. **Nýdek:** N10, N14, N40. — 2013 NK255. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969), V22. — 2012 NK061, 2014 NK549. Hojně v lesích, lesních okrajích a na loukách.
- Dianthus armeria* (C4a).** **Vendryně:** louky a údolní svahy podél potoka již. od odbočky silnice do Trince (V8). — Náplavy u pravého břehu řeky Olše 1,7 km jjv. od žel. stanice Vendryně (2012 NK060). Vzácně na náplavech.
- Dianthus barbatus* subsp. *barbatus* (nat neo).** **D. Lištná:** polokulturní louka v kulminační části (náhorní plošina) kóty 403 (DL4). **Vendryně:** — Náplavy v rybníce na potoce Vápenka 720 m sv. od vápenných pecí (2012!). Zplanělý ze zahrádek.

***Dianthus deltoides*. D. Líštná:** — Okolo vodní plochy na odkališti (2018). **Nýdek:** V. Čantoryje, na pastvině; Hluchová, na louce (ZATLOUKAL 1969); osada Střelma, 1,5 km zsz. od vrcholu M. Sošova (kóta 764; N11); V. Čantoryje (kóta 995), pokračování hřebene podél červeně značené turistické cesty 0,5 km jjv. od vrcholové kóty (N20); les podél červeně značené turistické cesty 0,9 km zsz. od vrcholu V. Čantoryje (kóta 995), sev. od osady Zakámen (N22). — Louka pod M. Sošovem 290 m záp. od vrcholu M. Sošova (2014 NK357); louka 1,2 km jz. od vrcholu V. Čantoryje (2014!). **Vendryně:** — Louka na psím hřbitově na záp. svahu kopce Žďár 420 m záp. od vrcholu (2014).

Vzácně na horských krátkostébelných loukách.

***Dianthus ×helwigii* (*D. armeria* × *D. deltoides*).** **Vendryně:** Babí hora (1886 Schube in SCHUBE 1903–1904).

***Digitalis grandiflora*.** **Nýdek:** Bei Teschen an der Czantory (KOLBENHEYER 1862); mezi Ostrým a Novou Osadou (1965 Satora in DLT).

ZATLOUKAL (1969) považuje výskyt na Čantoryji za zaniklý.

***Digitalis purpurea* (nat neo).** **Bystřice:** — U potoka Kompařov 1,4 km sv. od žel. stanice Hrádek (2014 NK482). **Nýdek:** — Střelma, u cesty 1,1 km sz. od vrcholu M. Sošova (2014). **Vendryně:** 2007 Hutyrová in NDOP. — Louka na psím hřbitově na záp. svahu kopce Žďár 460 m záp. od vrcholu (2014).

Vzácně podél lesních lemů a cest.

***Dipsacus fullonum*.** **Bystřice:** — Na Pasekách, břeh potoka Jatný 1,5 km již. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2018). **D. Líštná:** kóta 350 (ZATLOUKAL 1969); příkopy a trávníky podél silnice směr H. Líštná (DL2); opuštěný vápencový lom na sev. svazích Jahodné (DL11); odkaliště (DL28). **Vendryně:** Prašivá hora, kóta 409, v lomu (Vicherek sec. ZATLOUKAL 1969). — Opuštěný hrob na hřbitově 430 m jz. od kostela (2012).

Vzácně na narušených místech.

***Doronicum austriacum* (C4a).** **Nýdek:** v pobřežních křovinách, údolí potoka Hluchová (KILIÁN 1960). **Vendryně:** v pobřežních křovinách v údolí potoka Kopytná (KILIÁN 1960).

***Dryopteris borrieri* (C3).** **Bystřice:** — U potoka Suchý 1,1 km zjz. od vrcholu Polední (2014!). **D. Líštná:** les pod vrchem Jahodná asi 0,8 km záp. od vrchu Babí hory (Trávníček 1992 herb. B. Trávníčka in PLADIAS 2). **Nýdek:** údolí Hluchové, vrstevnicová cesta jz. svahem (N31); sv. svahy údolí Hluchové asi 0,5 km jjv. od osady Poledňa (N32). **Vendryně:** Pod Malým Ostrým, lesní lem u křižovatky červené a zelené turistické stezky, 700 m n. m. (Hájková 1996 FMM sec. PLADIAS 2). Vzácně v lesích ve vyšších polohách.

***Dryopteris cambrensis* (C1).** **Nýdek:** Kolibiska: smrkový les na svahu nad potokem ca 900 m jjz. od autobusové zastávky Hluchová-Kolibiska (Ekrt herb. L. Ekrt 2017 in Excerpt pro atlas); bučina v údolí potoka, 800 m na S od hory Velký Sošov (886 m; Tlačka 2014 herb. D. Tlačka sec. PLADIAS 2).

***Dryopteris carthusiana*.** **D. Líštná:** Jahodná (Krzyžanková 2002 OP sec. PLADIAS 2). **Nýdek:** státní přírodní rezervace Čantoria (Hájková 1988 FMM sec. PLADIAS 2). **Vendryně:** podél státní hranice 0,5 km záp. od vrcholu Ostrý (kóta 709), 1,5 km sv. od údolí potoka na vých. okraji obce (V11).

***Dryopteris cristata* (C1).** **Nýdek:** V. Čantoryje; Střelma (ZATLOUKAL 1969). **Vendryně:** Babí hora (ZATLOUKAL 1969).

Údaj je vzhledem k známému rozšíření a ekologickým nárokům kapradi hřebenité (srov. Chrtek in HEJNÝ & SLAVÍK 1997) s největší pravděpodobností mylný.

- Dryopteris dilatata***. Bystřice: B13, B14, B17, B18, B19, B20. — 2014!. **D. Lištná:** DL27. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N12, N28, N29, N30, N31, N32, N33, N35, N36, N38, N39, N40, N41, N42. — 2013 NK253, 2013 NK254, 2014 NK356. **Vendryně:** V25. — 2012 NK063 (rev. L. Ekrt), 2014!.
Hojně v lesích ve vyšších polohách.
- Dryopteris expansa*** (C4a). **Nýdek:** Střelma, levý přítok Střelmy nad zelenou značkou (Sedláčková 1999 NJM sec. PLADIAS 2); úpatí V. Čantoryje, svah až k malému potoku asi 1,9 km sv. od centra obce (Ekrt 2007 herb. L. Ekrt sec. PLADIAS 2).
- Dryopteris filix-mas***. Bystřice: B12, B16, B17, B18. — 2014!. **D. Lištná:** DL18, DL25. **Nýdek:** N12, N21, N26, N27, N29, N30, N31, N33, N35, N36, N39, N41. — 2013!, 2014. **Vendryně:** V17, V22.
Hojně v lesích.
- Dryopteris ×ambroseae*** (*D. dilatata* × *D. expansa*). **Nýdek:** pohoří V. Čantoryje, svah až k malému potoku asi 1,9 km sv. od centra obce (Ekrt 2007 herb. L. Ekrt sec. PLADIAS 2).
- Dryopteris ×tavelii*** (*D. borrieri* × *D. filix-mas*). **Bystřice:** Suchý, sv. svah Javorového (kóta 627 m; B18). **Nýdek:** sv. svahy Loučky (kóta 835 m; N36); nedaleko obce, v údolí vých. od kopce V. Sošov, 700 m n. m.; v údolí záp. od hory V. Sošov, 700 m n. m. (Sedláčková 1982 NJM sec. Excerpt pro atlas).
- Echinochloa crus-galli*** (inv ar). **Bystřice:** — Náplavy řeky Olše 700 m jz. žel. stanice Bystřice nad Olší (2014). **Nýdek:** Gora (N44). **Vendryně:** — Černovské, u cesty nedaleko rodinného domu č. p. 323, 1 km jv. od žel. stanice Vendryně (2012 NK071).
Roztroušeně na polích a narušených místech.
- Echinops sphaerocephalus*** (inv neo). **H. Lištná:** příkopy, trávníky a okraje polní kultury (kukuřice) podél silnice v obci při státní hranici (HL5).
- Echium vulgare***. **Bystřice:** — 2014. **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), DL3, DL4. **H. Lištná:** HL4, HL5. **Vendryně:** Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969). — 2013.
Na říčních náplavech, narušených místech a v příkopech.
- Elaeagnus angustifolia*** (cas neo). **Vendryně:** zplanělá u potůčku ve Vendryni (KILIÁN 1960).
- Eleocharis mamillata*** subsp. *mamillata* (C4a). **D. Lištná:** odkaliště (Hlisnikovský & Chytil 2008 FMM sec. Excerpt pro atlas).
Jde pravděpodobně o mylné určení. Všechny sbírané bahničky na odkališti patří druhu *Eleocharis palustris* subsp. *palustris*.
- Eleocharis palustris*** subsp. *palustris*. **Bystřice:** — 2014 NK495. **D. Lištná:** DL28. — 2013 NK257; okraj vodní plochy na odkališti 820 m sv. od vrcholu Jahodná (2018 NK621, det. P. Bureš); izolovaná vlhká část na odkališti 600 m ssv. od vrcholu Jahodná (2018 NK622, det. P. Bureš). **H. Lištná:** HL4, HL6. **Nýdek:** N10, N18.
Roztroušeně na podmačených loukách a na odkališti
- Elymus caninus***. **Bystřice:** pravý břeh Olše, olšina proti ústí Kopytné (B3). **Vendryně:** podél Kopytné (V25). — Břehový porost řeky Olše 1,7 km jjv. od žel. stanice Vendryně (2012 NK073); u potoka Kopytná 1,9 km jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2013!).
Vzácně v pobřežních křovinách.
- Elytrigia repens***. **Bystřice:** B8. **D. Lištná:** DL2. **H. Lištná:** HL4, HL6. **Nýdek:** 1989 Hájková in NDOP. — 2014!. **Vendryně:** V24. — 2012 NK072.
Hojně na pastvinách, loukách a okrajích polí.

- Epilobium angustifolium***. Bystřice: 2014. D. Lištná: DL28. — 2014 NK457 (rev. J. Danihelka). Nýdek: N7, N12, N16, N20. — 2014!. Vendryně: Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969), V5, V21. — 2012 NK077 (rev. J. Danihelka).
Hojně v lesních lemech, na pasekách a podél lesních cest.
- Epilobium ciliatum*** (nat neo). Nýdek: osada Střelma, lesní potůček u zelené turisticky značené cesty k Beskydskému sedlu (N14). — Louka na sev. svahu kopce Filipka 3,7 km vých. od žel. stanice Hrádek (2013!). Vendryně: — Černovské, u cesty nedaleko rodinného domu č. p. 323, 1 km jv. od žel. stanice Vendryně (2012!).
Roztroušeně podél cest.
- Epilobium collinum***. Nýdek: údolí Střelné, pod Beskydským sedlem (Kubát 1975 LIT sec. PLADIAS 7). Vendryně: Prašivá hora, křovinatá stráž (ZATLOUKAL 1969).
- Epilobium dodonaei***. Bystřice: náplavy Olše, 0,5 km jz. nádraží (Trávníček 1993 OL sec. PLADIAS 7). D. Lištná: odkaliště (DL28). — Odkaliště 600 m ssv. od vrcholu Jahodné (2014!). Nýdek: osada Střelma, údolí potoka Střelma podél zeleně značené turistické cesty (N12). Vendryně: podél Kopytné (V24). — Levý břeh potoka Kopytná 1,9 km jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2013!).
Vzácně na říčních náplavech a narušených plochách.
- Epilobium hirsutum***. Bystřice: — 2014. D. Lištná: DL28. Nýdek: — 2014. Vendryně: V24. — 2012 NK074.
Hojně na náplavech, v příkopech a podél lesních cest.
- Epilobium lamyi*** (C4b). Nýdek: — Louka u rybníků u bezejmenného potoka 900 m vých. od dřevěného kostela v Nýdku (2014 NK538).
Vzácně u vodních ploch a toků.
- Epilobium montanum***. Bystřice: B12. — 2013!. D. Lištná: DL14, DL28. Nýdek: V. Čantoryje (Zatloukal 1968 BRNU, rev. J. Danihelka srov. ZATLOUKAL 1969), N3, N36. — 2013!, 2014 NK359 (rev. J. Danihelka). Vendryně: ZATLOUKAL (1969), V5, V17. — 2012 NK075, 2012 NK076 (obojí rev. J. Danihelka), 2014!.
Hojně na loukách, v lesních lemech a podél lesních cest.
- Epilobium obscurum*** (C3). Bystřice: — U potoka v lese 1,6 km jv. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014!). Nýdek: osada Střelma, údolí potoka Střelma podél zeleně značené turistické cesty (N12).
Vzácně na březích potoků.
- Epilobium parviflorum*** (C3). H. Lištná: — U potoka na sz. svahu Vružné 1 km sz. od vrcholu (2014 NK533). Vendryně: podél Kopytné (V24). — Okraj lesní cesty na sev. svahu Vendryňského háje 1,2 km vsv. od vápenných pecí (2012!); u cesty pod Prašivou horou nedaleko rodinného domu č. p. 512, 1,5 km jjv. od kostela (2012!); náplavy potoka Kopytná, 1,5 km jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014).
Roztroušeně na březích potoků.
- Epilobium roseum***. Bystřice: — 2014 NK531. H. Lištná: — 2014 NK532. Nýdek: N12. — 2014!. Vendryně: V3, V4, V6.
Roztroušeně na březích potoků.
- Epipactis atrorubens*** (C3). D. Lištná: ve třech exemplářích na vrchu Hradisko (KILIÁN 1960). — Popílková plocha odkaliště 550 m ssv. od vrcholu Jahodná (2018!, TKÁČIKOVÁ in prep.).
Pouze čtyři jedinci nalezení na odkališti.
- Epipactis helleborine***. Bystřice: — 2014. D. Lištná: DL1, DL8, Burša 1975 FMM, 1983 Liberdová sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996); 2007 Ladányi, in litt.; 2002 Krzyžanková in KRZYŽANKOVÁ (2004). — Záp. část odkaliště 580 m ssv.

- od vrcholu Jahodná (2018!). **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969). — 2014. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969), V2, ONDRASZEK et al. (2004), LADÁNYI (2008). — 2012!.
- Roztroušeně ve světlých lesích, lesních lemech nebo podél cest.
- Epipactis microphylla* (C2).** **D. Lištná:** **Vendryně:** vrcholová partie Babí hory (2007 Ladányi, in litt.). — V houštině pod vrcholem Babí hory (2018).
Vzácně v lesích a na odkališti.
- Epipactis palustris* (C2).** **Bystřice:** 1889 Schube in SCHUBE (1903–1904). **D. Lištná:** odkaliště (DL28). — V okolí vodní plochy odkaliště 860 m sv. od vrcholu Jahodné (2014 NK462).
Vzácně. Na odkališti velká populace, nejhojněji v křovinách podél vodní plochy, v izolované vlhké části, ale i na vysychajícím popílku.
- Epipactis purpurata* (C3).** **D. Lištná:** les záp. od odkaliště; les vých. od nemocnice (2002 Krzyžanková in KRZYŽANKOVÁ 2004). — Les nad červeně značenou turistickou cestou 500 m ssz. od vrcholu Jahodné (2014, výskyt potvrzen i v roce 2018). **H. Lištná:** Vružná (Gill 1967 OP sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK 1996).
Na uvedené mnou navštívené lokalitě pouze tři jedinci.
- Equisetum arvense*.** **Bystřice:** — 2014. **D. Lištná:** DL2, DL28. — 2014. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. **Nýdek:** N18. — 2014. **Vendryně:** V1. — 2012 NK080 (rev. L. Ekrť).
Hojně podél cest, v příkopech na polích a narušených místech.
- Equisetum fluviatile*.** **Bystřice:** rybochovná nádrž, částečně s opevněnými břehy 270 m záp. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2012 Višňák in NDOP). — Tamtéž (2014 NK614). **Nýdek:** podél horského potoka 700–800 m vých. od vrcholu Ostrého vrchu (2012 Višňák in NDOP). **Vendryně:** rybníčky na jz. svahu Vendryňského háje 1,1 km jz. od vrcholu Ostrého vrchu (2012 Višňák in NDOP).
Spíše vzácně.
- Equisetum palustre*.** **Bystřice:** B3, B4, B7, B8, B11. — 2014 NK422. **Nýdek:** N26. **Vendryně:** V13, V22. — 2013!.
- Roztroušeně na vlhkých loukách v příkopech se stojatou vodou.
- Equisetum ramosissimum* (C2).** **D. Lištná:** vodní odkaliště (Hlisnikovský 2006 FMM sec. HADINEC & LUSTYK 2007, DL28). — V pobřežních porostech okolo vodní plochy na odkališti 860 m sv. od vrcholu Jahodné (2018).
Vzácně. V území zaznamenán jen z křovin u vodní plochy na odkališti.
- Equisetum sylvaticum*.** **Nýdek:** 2003 Hustáková in NDOP. **Vendryně:** V11, V16. — 2012!.
- Roztroušeně v lesích a podél lesních cest.
- Equisetum telmateia* (C4a).** **Bystřice:** Ascherson sec. FIEK (1881), KILIÁN & KILIÁN (1956), KILIÁN (1969). **D. Lištná:** DL2, DL15, DL16, DL28. — 2014 NK471. **H. Lištná:** KILIÁN & KILIÁN (1956), KILIÁN (1960). — 2014. **Nýdek:** KILIÁN (1960), ZATLOUKAL (1969), N10. — 2014. **Vendryně:** V9. — 2012 NK079 (rev. L. Ekrť).
Roztroušeně na vlhkých loukách, kolem vodních ploch a podél toků.
- Equisetum variegatum* (C2).** **Bystřice:** potok Hluchová (1889 Schube in SCHUBE 1903–1904); Bystřice (Hrouda in HEJNÝ & SLAVÍK 1997). **D. Lištná:** sv. části odkaliště pod Babí horou (kóta 492; 2003 Roháčová; Hlisnikovský 2006 FMM sec. HADINEC & LUSTYK 2007); odkaliště (DL28). — V pobřežních porostech okolo vodní plochy na odkališti 860 m sv. od vrcholu Jahodné (2014 NK463). **Vendryně:** 1888 Schube in SCHUBE (1903–1904), Hrouda in HEJNÝ & SLAVÍK (1997).

Vzácně. V území zaznamenán jen z křovin u vodní plochy na odkališti, kde přetrvává z původně nezapojeného porostu.

Erechtites hieraciifolia (nat neo). **Bystřice:** — Na Pasekách, okraj lesa a mýtina 1,7 km již. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2018). **Nýdek:** paseka ve smrkovém lese s bukem za chatovou osadou v trati Dílek, 1,35 km ssv. od středu obce, několik rostlin (Řepka 2004 BRNL in Fldok); Střelma, pasekové úseky 2,3 km jjz. od vrcholu V. Čantoryje (2012 Višňák in NDOP).

Vzácně v lesích a pasekách nebo spíše přehlížený.

Eragrostis minor (inv ar). **D. Lištná:** odkaliště (DL28). — Cesta přes odkaliště 250 m sz. od vodní plochy (2018 NK623).

Vzácně, zaznamenána pouze na odkališti.

Erigeron acris. **D. Lištná:** odkaliště (DL28). — Odkaliště 670 m sv. od vrcholu Jahodné (2018!).

Vzácně, zaznamenán pouze na odkališti.

Erigeron annuus (inv neo). **Bystřice:** — 2014!. **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), DL28. — 2014. **Nýdek:** — 2013!, 2014. **Vendryně:** V25. — 2012 NK066, 2012 NK067.

Hojně na říčních náplavech, narušených místech a podél cest.

Erigeron macrophyllus (C4a). **D. Lištná:** — Odkaliště 670 m sv. od vrcholu Jahodné (2014 NK465).

Vzácně, zaznamenán pouze na odkališti.

Eriophorum angustifolium. **Bystřice:** ZATLOUKAL (1969). **Vendryně:** 2003 Hustáková in NDOP.

Erysimum cheiranthoides (nat ar). **Nýdek:** N11. **Vendryně:** V6. — Okraj lesní cesty na jv. svahu kopce Babí hora 150 m jz. od vápenných pecí (2012 NK068, rev. J. Štěpánek); okraj lesní cesty pod kopcem Malý kozinec 3,5 km jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2012 NK069, rev. J. Štěpánek)

Roztroušeně na polích a podél cest.

Erysimum durum. **D. Lištná:** — Odkaliště 670 m sv. od vrcholu Jahodné (2018!).

Vzácně.

Euonymus europaea. **Bystřice:** B10. — 2014. **D. Lištná:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), DL8. — 2014 NK587. **H. Lištná:** — 2014!. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969). — 2013! 2014!.

Roztroušeně ve světlých lesích, podél lesních lemů a na mezích.

Eupatorium cannabinum. **Bystřice:** — 2014. **D. Lištná:** DL10, DL14, DL28. — 2014. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N12. — 2014. **Vendryně:** V5. — 2012 NK070.

Hojně podél lesních cest.

Euphorbia amygdaloides (C4a). **Bystřice:** Ascherson sec. FIEK (1881). — 2014. **D. Lištná:** Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969), DL1, DL6, DL20, DL21, DL23, DL24, DL25. — 2014 NK298. **H. Lištná:** 1900 Schube in SCHUBE (1903–1904), ZATLOUKAL (1969), HL2. — 2014 NK358. **Nýdek:** Kotschy sec. FIEK (1881), OTRUBA (1926), ZATLOUKAL (1969), N28, N29, N31, N32, N33. — 2014. **Vendryně:** Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969), V23. — 2012!.

Roztroušeně v listnatých lesích.

Euphorbia cyparissias. **Bystřice:** B1. — 2014. **D. Lištná:** DL3, DL4, DL9, DL28. — 2014. **H. Lištná:** HL4, HL5. **Nýdek:** N1, N9, N12, N19. **Vendryně:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), V8, V9. — 2012!.

Roztroušeně na loukách, strmých svazích a podél cest.

Euphorbia dulcis. Bystřice: B4, B5, B7, B9, B10. **D. Lištná:** DL7, DL18, DL22, DL23. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N26. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969), V22. — 2012!.

Vzácně v listnatých lesích.

Euphorbia esula. Bystřice: ZATLOUKAL (1969). **D. Lištná:** na polích (ZATLOUKAL 1969); příkopy a trávníky podél silnice směr H. Lištná (DL2). **H. Lištná:** příkopy, trávníky a okraje polní kultury (kukuřice) podél silnice v obci při státní hranici (HL5). **Vendryně:** na polích (ZATLOUKAL 1969).

Euphorbia exigua (C4a, nat ar). **D. Lištná:** KILIÁN & KILIÁN (1956); příkopy a trávníky podél silnice směr H. Lištná (DL2). **H. Lištná:** KILIÁN & KILIÁN (1956); vlhký příkop podél polní cesty při státní hranici směr Kojkovice 0,5 km sv. od obce (HL6).

Euphorbia helioscopia (nat ar). Bystřice: na poli (ZATLOUKAL 1969). — Na dlážděném chodníku podél hlavní cesty Na Pasekách 1,8 km jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2018!). **D. Lištná:** příkopy a trávníky podél silnice směr H. Lištná (DL2). — Odkaliště 600 m ssv. od vrchu Jahodná (2018!). **H. Lištná:** na poli (ZATLOUKAL 1969); vlhký příkop podél polní cesty při státní hranici směr Kojkovice 0,5 km sv. od obce (HL6). **Nýdek:** Góra, osada Ostrý, 1 km jv. od kóty 709 (N1). **Vendryně:** na poli (ZATLOUKAL 1969). Spíše vzácně.

Euphorbia lathyris (cas neo). Vendryně: — Ve šterku na evangelickém hřbitově 1,2 km sv. od žel. stanice Vendryně (2018!).

Vzácně na narušeném stanovišti.

Euphorbia peplus (nat ar). Bystřice: — U cesty na okraji zahrady domu č. p. 545, 1,6 km jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2018 NK624). **D. Lištná:** vsv. část města při silnici do Vendryně přes Sosnu, mezi údolím Olše a pravostranným přítokem (DL15). **Vendryně:** — Záhon s jahodami na již. svahu Vružné 910 m jv. od vrcholu Vružná (2018).

V území vzácně nebo přehlížený.

Euphorbia platyphyllos. Bystřice: SCHUBE (1903–1904). **D. Lištná:** příkopy a trávníky podél silnice směr H. Lištná (DL2). **H. Lištná:** příkopy, trávníky a okraje polní kultury (kukuřice) podél silnice v obci při státní hranici (HL5); vlhký příkop podél polní cesty při státní hranici směr Kojkovice 0,5 km sv. od obce (HL6).

Euphorbia stricta (C3). Bystřice: OTRUBA (1926), B1. — 2014!. **D. Lištná:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969). **H. Lištná:** HL5, HL6. **Nýdek:** — 2014 NK592. **Vendryně:** Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969), V3. — 2012 NK078.

Roztroušeně na náplavech nebo v příkopech.

Euphrasia rostkoviana subsp. rostkoviana. Bystřice: — 2014. **D. Lištná:** DL2, DL3, DL4. **H. Lištná:** HL4, HL6. **Nýdek:** N7. — 2013 NK256, 2014. **Vendryně:** — 2012!.

Vzácně na krátkostébelných loukách a v travnatých lemech cest.

Euphrasia stricta. Nýdek: Střelma, na suchých výslunných stráních (ZATLOUKAL 1969).

Fagus sylvatica. Bystřice: B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B20. **D. Lištná:** DL20, DL21, DL24. **Nýdek:** N12, N22, N28, N29, N30, N31, N33, N34, N35, N36, N37, N38, N39, N40, N41, N42, N43. — 2014 NK362. **Vendryně:** V23. — 2012!.

Hojně v listnatých lesích.

Fallopia convolvulus (nat ar). Bystřice: — 2013!, 2014 NK452. **D. Lištná:** DL2, DL28. **H. Lištná:** HL6. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N10, N11. **Vendryně:** V1.

Roztroušeně na zahradách a rumišťích

- Festuca altissima*. Nýdek: 1989 Hájková in NDOP. Vendryně: Babí hora, bučina na sv. svahu (Vicherek sec. ZATLOUKAL 1969).
- Festuca brevipila*. D. Lištná: odkaliště (DL28). — Odkaliště 670 m sv. od vrcholu Jahodné (2014 NK456).
Vzácně, jen jeden nález z odkaliště.
- Festuca gigantea*. Bystřice: B13. — 2014!. D. Lištná: DL7, DL15. H. Lištná: — 2014!. Nýdek: Zatloukal (1969), N9, N10, N14, N15, N26. — 2013!, 2014!. Vendryně: V7. — 2012 NK081, 2013 NK258.
Hojně podél cest a na vlhčích místech v listnatých lesích.
- Festuca heterophylla*. Vendryně: Zaošší, Do Mlýnka, svěží dubová jedlina (1966, 1976 Satora in DLT).
S velkou pravděpodobností se jedná o determinační omyl.
- Festuca nigrescens* (C4b). D. Lištná: naučná stezka Jahodná (DL17).
- Festuca ovina*. Nýdek: Filipka (1965 Satora in DLT); Nýdek (2002 Holuša in NDOP).
- Festuca pratensis*. Bystřice: B23. D. Lištná: DL2, DL3, DL4. H. Lištná: HL4, HL5, HL6. Nýdek: N15, N23. — 2014 NK364. Vendryně: V25. — 2012 NK082, 2013, 2014 NK481.
Hojně na loukách a pastvinách.
- Festuca rubra*. Bystřice: 2002 Holuša in NDOP. — 2014. D. Lištná: DL17. H. Lištná: HL4, HL5. Nýdek: N2, N12, N20, N21, N22, N40, N43. — 2014 NK360. Vendryně: V24. — 2012 NK083, 2013!.
Hojně na loukách a pastvinách.
- Ficaria verna* subsp. *bulbifera*. Bystřice: 2009 Chytil in NDOP. — 2014 NK361. D. Lištná: DL22, DL23. — 2014!. H. Lištná: — 2014 NK299. Nýdek: 2003 Hustáková in NDOP. — 2014. Vendryně: V25. — 2012!.
Hojně na vlhkých loukách a rozvolněných lesních lemech.
- Filago arvensis* (C3). D. Lištná: odkaliště (DL28).
- Filipendula ulmaria* subsp. *ulmaria*. Bystřice: křoviny, okraj lesa a modře značené turistické cesty poblíž mostku přes potok Kopytná 1,1 km jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (B1); pravý břeh Olše, olšina proti ústí Kopytné (B6). — Louka u rychlostní silnice 750 m jjv. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014). Vendryně: podél Kopytné (V24). — Břehový porost řeky Olše 1,7 km jjv. od žel. stanice Vendryně (2012 NK084); břehový porost potoka nedaleko domu č. p. 308, 590 m jv. od kostela (2012!).
Na vlhkých loukách a březích vodních toků.
- Fragaria moschata*. D. Lištná: ZATLOUKAL (1969), DL3, DL6. — 2014. H. Lištná: HL5. Nýdek: N10. — 2014 NK510. Vendryně: Zatloukal & Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), V23. — 2013 NK259.
Roztroušeně v lesních lemech a podél lesních cest.
- Fragaria vesca*. Bystřice: 2002 Holuša in NDOP. — 2013!, 2014 NK365. D. Lištná: DL3, DL4. — 2014. H. Lištná: HL4, HL5. — 2014. Nýdek: N10, N12, N16, N21. — 2014 NK363. Vendryně: V19. — 2012 NK086.
Hojně na loukách, lesních světlinách a v lesních lemech.
- Fragaria viridis*. Vendryně: zanedbané trávníky s početnými výsadbami okrasných dřevin na záp. svahu Prašivé hory 920 m záp. od vrcholu (2012 Višňák in NDOP).
Pravděpodobně jde o záměnu s hojnou *Fragaria vesca*.
- Frangula alnus*. Bystřice: 2003 Hustáková in NDOP. — Les 1,6 km ssv. od žel. stanice Hrádek (2014 NK485). Nýdek: Góra, osada Ostrý, 1 km jv. od kóty 709 (N1); Góra, nad osadou Ostrý 0,6 km jv. kóty 709 (N2). Vendryně: Babí hora

(ZATLOUKAL 1969). — Les na sz. svahu Ostrého vrchu 1,5 km vsv. od vápenných pecí (2013!).

Roztroušeně v křovinatých lemech.

Fraxinus excelsior. Bystřice: B3, B5, B6, B8, B9, B10, B11. — 2014. **D. Lištná:** DL1, DL18, DL21, DL23. — 2014. **H. Lištná:** — 2014. **Nýdek:** N9, N20, N25, N26, N27, N28, N31, N33. — 2014. **Vendryně:** V22, V23. — 2012 NK085.

Hojně v listnatých lesích.

Fumaria schleicheri (C4a, nat ar). Vendryně: na poli u kostela (Vicherek sec. ZATLOUKAL 1969).

Květena ČR (Smejkal in HEJNÝ & SLAVÍK 1997) výskyt tohoto druhu ze Slezska neuvádí. Pravděpodobně jde o záměnu s hojnějším zemědělným lékařským.

Fumaria officinalis. Vendryně: 1997 Kudělová in Slavíkův archiv.

Fumaria vaillantii (nat ar). Bystřice: Kotschy sec. FIEK (1881). Vendryně: — Ve šterku na evangelickém hřbitově 1,2 km sv. od žel. stanice Vendryně (2018 NK625).

Vzácně na chudých stanovištích.

Gagea lutea. Bystřice: pravý břeh Olše, olšina proti ústí Kopytné (B5). **D. Lištná:** údolí potoka Lištnice, dosti hojně podél toku (Burša 1975 FMM sec. PLADIAS 5).

H. Lištná: — Podél bezejmenného potoka a louka na sev. svahu kopce Vruzná, 550 m sev. od vrcholu (2014!). **Nýdek:** údolí Hluchové v bučině (ZATLOUKAL 1969). **Vendryně:** — Les podél řeky Olše 1,4 km sz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2015). Vzácně.

Galanthus nivalis (C3). Bystřice: — Les proti ústí Kopytné 480 m jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014). **Nýdek:** Čantoryje (Kotschy sec. FIEK 1881, OTRUBA 1926); NPR Čantoria (1989 Hájková in NDOP).

Vzácně.

Galeobdolon argenteum (nat neo). Bystřice: vyschlá tůň jen s nepatrným zbytkem vody v centru obce u potoka Prašívka (2012 Višňák in NDOP). — Na Pasekách u cesty na Zaolší 820 m již. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2015); Na Pasekách, příkop na okraji lesa 1,7 km již. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2018 NK626); **Nýdek:** Kouty, boční strž s vyschlým potokem 1 km sev. od dřevěného kostela v Nýdku (2012 Višňák in NDOP). **Vendryně:** Pod Prašívou, podél bezejmenného levostranného přítoku potoka Vendryňky (2012 Višňák in NDOP).

Zplaňuje podél potoků a cest v blízkosti rodinných domů.

Galeobdolon luteum. Bystřice: 2003 Hustáková in NDOP. — Ekoton louka-les u potoka 1,6 km jv. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014 NK370). **D. Lištná:** pod Sosnou, vlhký suťový les (2004 Hájková in ČNFD). **Nýdek:** 2005 Cimalová in NDOP. **Vendryně:** podél Kopytné (V25). — Okraj lesa na sz. svahu Vendryňského háje 1,3 km sv. od vápenných pecí (2014!).

Roztroušeně ve světlých lesích, lesních světlinách a v lesních lemech.

Galeobdolon montanum. Bystřice: B3, B4, B6, B7, B8, B9, B10, B11. **D. Lištná:** DL1, DL6, DL18, DL19, DL21, DL22, DL25. **H. Lištná:** — 2013 NK261, 2014 NK371. **Nýdek:** N13, N26, N27, N28, N29, N31, N33, N35. — 2014. **Vendryně:** Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969). — 2012 (cf.).

Hojně ve světlých lesích, lesních světlinách, v lesních lemech a podél potoků.

Galeopsis angustifolia (C3). Vendryně: Uechtritz sec. FIEK (1881). — Zaolší, u cesty 1,3 km jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2012 NK089); ruderalizované místo na Černovském 80 m ssz. od žel. stanice Vendryně (2013 NK262).

Vzácně podél cest.

Galeopsis bifida. Nýdek: Góra, osada Ostrý, 1 km jv. od kóty 709 (N1). — Okraj lesa na sv. svahu kopce Filipka 3,7 km vých. od žel. stanice Hrádek (2013!); louka na kopci Polední 1,6 km jjv. od dřevěného kostela v Nýdku (2013!); u cesty pod V. Stožkem 950 m záp. od vrcholu (2014 NK591). Vendryně: podél Kopytné (V24).

Roztroušeně v lesních lemech a na pasekách.

Galeopsis pubescens. Bystřice: — 2014!. Nýdek: N44. — 2014!. Vendryně: ZATLOUKAL (1969). — 2012 NK088.

Roztroušeně v lesních lemech a na pasekách.

Galeopsis speciosa. Bystřice: — 2014. D. Lištná: — 2014. H. Lištná: KILIÁN & KILIÁN (1956). — 2014. Nýdek: ZATLOUKAL (1969). — 2013!, 2014. Vendryně: — 2012 NK087.

Roztroušeně v lesních lemech a na pasekách.

Galeopsis tetrahit. Bystřice: — 2013!, 2014. D. Lištná: DL2. H. Lištná: HL6. Nýdek: N11, N20, N21. Vendryně: KILIÁN & KILIÁN (1956), V1. — 2012 NK090.

Roztroušeně v lesních lemech, na náplavech a pasekách.

Galinsoga parviflora (inv neo). Bystřice: — Na Pasekách, pole 1,6 km již. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2018). Nýdek: osada Střelma, 1,5 km szs. od vrcholu M. Sošova (kóta 764; N11).

Velmi vzácně. Mnohem hojnější je *G. quadriradiata*.

Galinsoga quadriradiata (inv neo). Bystřice: — 2014 NK579. H. Lištná: ZATLOUKAL (1969). Nýdek: N11, N12. — 2014 NK611. Vendryně: V6, V19. — 2012.

Hojně na polích, narušených místech a podél cest.

Galium album. Bystřice: — 2013 NK260. D. Lištná: DL4, DL28. — 2013!. H. Lištná: HL4, HL5. — 2014. Nýdek: — 2014!. Vendryně: 2007 Hutýrová in NDOP. — 2012 NK096, 2013!, 2014!.

Hojně na loukách a podél lesních lemů.

Galium aparine. Bystřice: B3, B4, B7, B8. D. Lištná: ZATLOUKAL (1969). Nýdek: N11, N26. — 2014. Vendryně: ZATLOUKAL (1969), V1, V5. — 2012!.

Hojně na loukách, podél lesních lemů a v příkopech.

Galium mollugo agg. H. Lištná: — 2014!. Nýdek: N9, N12. Vendryně: V24.

Jde pravděpodobně rovněž o *G. album*.

Galium odoratum. Bystřice: B19, B20. D. Lištná: DL1, DL6, DL7, DL18, DL19, DL23, DL24, DL25. — 2014. H. Lištná: HL2. — 2014!. Nýdek: N2, N16, N20, N26, N27, N28, N29, N31, N32, N38, N39. — 2014. Vendryně: V21, V22, V23. — 2012!.

Hojně v listnatých i smrkových lesích.

Galium palustre. Bystřice: — 2014 NK574. D. Lištná: DL17. Nýdek: N13. — 2014!. Vendryně: ZATLOUKAL (1969), V5.

Roztroušeně na podmáčených loukách a březích vodních toků.

Galium rivale (C4a). Vendryně: podél Kopytné (V25).

Údaj vyžaduje ověření, poněvadž by šlo o značně izolovaný výskyt. Štěpánková (in SLAVÍK 2000) žádný údaj z fytogeografického podokresu 84a. Beskydské podhůří neuvádí.

Galium rotundifolium. Bystřice: — 2014. Nýdek: N4. — 2014 NK437. Vendryně: KOLBENHEIMER 1862, V17. — 2012 NK097, 2013!.

Roztroušeně v lesích.

- Galium schultesii*. Bystřice:** SCHUBE (1903–1904), 2003 Hustáková in NDOP. — 2014 NK368, 2014 NK537. **D. Lištná:** DL6. **Nýdek:** 2003 Hustáková in NDOP. **Vendryně:** V11, V17. — 2013!, 2014 NK369.
Vzácně v lesích, na mýtinách a v břehových porostech.
- Galium spurium* (C4a, nat ar). H. Lištná:** vlhký příkop podél polní cesty při státní hranici směr Kojkovice 0,5 km sv. od obce (HL6); Štěpánková in SLAVÍK (2000). **Vendryně:** 0,6 km sev. od kostela (V1).
- Galium sylvaticum*. D. Lištná:** 1975 Satora in DLT. **Nýdek:** mezi Ostrým a Novou Osadou 1965 Satora in DLT. **Vendryně:** Vružná (ZATLOUKAL 1969).
Údaj je nejspíš mylný, založený na mylném určení druhu *G. schultesii*. Štěpánková (in SLAVÍK 2000) druh ve studované oblasti nezaznamenala.
- Galium uliginosum*. H. Lištná:** vlhký příkop podél polní cesty při státní hranici směr Kojkovice 0,5 km sv. od obce (HL6). **Vendryně:** — Louka pod psím hřbitovem 700 m záp. od vrcholu Žďáru (2014!).
Vzácně na loukách.
- Galium verum*. D. Lištná:** travnaté a křovinaté porosty vápencového hřebene Jahodná u cesty do Sosny (DL10). **H. Lištná:** příkopy, travníky a okraje polní kultury (kukuřice) podél silnice v obci při státní hranici (HL5).
- Galium ×pomeranicum* (*G. album* × *G. verum*). H. Lištná:** příkopy, travníky a okraje polní kultury (kukuřice) podél silnice v obci při státní hranici (HL5).
- Genista pilosa*. Vendryně:** Kotschy sec. KOLBENHEYER (1862), dále např. PODPĚRA (1949).
Pravděpodobně jde o jediný, opakovaně přebíraný údaj, který nebyl později ověřen (srov. Skalická in SLAVÍK 1995) a považuje se za pochybný.
- Genista tinctoria*. Bystřice:** — 2014. **D. Lištná:** Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969), DL3, DL9, DL11. — 2014. **H. Lištná:** HL5. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N2, N22. — 2014!. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969), V2, V5, V8, V11. — 2012 NK101, 2012 NK102, 2014!.
Roztroušeně podél lesních lemů a na pasekách.
- Gentiana asclepiadea* (C3). Bystřice:** Ascherson sec. FIEK (1881), B19. — 2014. **D. Lištná:** KILIÁN & KILIÁN (1956). **Nýdek:** KOLBENHEYER (1862), FIEK (1881), ZATLOUKAL (1969), N5, N12, N14, N27, N28, N31. — 2013!, 2014. **Vendryně:** V11, V22. — 2012 NK100.
Roztroušeně v lesích, v lesních lemech a podél lesních cest ve vyšších polohách.
- Gentiana cruciata* (C2). D. Lištná:** KOLBENHEYER (1862), KILIÁN & KILIÁN (1956), KILIÁN (1960), Kilián 1955 OP sec. ZATLOUKAL (1969), KILIÁN (1969), Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969), DL3, DL10. — Nad lomem u odkaliště 520 m sev. od vrcholu Jahodné (2014; u stezky podél lomu zaznamenáni 2 jedinci i v roce 2018). **H. Lištná:** HL1. **Vendryně:** Uechtritz sec. FIEK (1881), Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), KILIÁN (1969), Kilián 1960 OP sec. ZATLOUKAL (1969), V2.
Vzácně, ověřený pouze na jediné lokalitě.
- Gentiana pneumonanthe* (C2). Vendryně:** KOLBENHEYER (1862).
Kirschner & Kirschnerová (in SLAVÍK 2000) považují výskyt za zaniklý.
- Gentianopsis ciliata* (C3). Bystřice:** 1890 Schube in SCHUBE (1903–1904). **D. Lištná:** vrch Jahodná (KILIÁN & KILIÁN 1956); několik exemplářů na pastvině mezi Vružnou a Jahodnou; hojně v zarostlém kamenolomu (KILIÁN 1969); odkaliště (DL28).

- Geranium columbinum*** (nat ar). **D. Lištná:** DL8, DL9. **Nýdek:** N12, N13. **Vendryně:** V8, V12. — Louka na již. svahu kopce Vružná u kříže 890 m sev. od vápenných pecí (2012 NK093).
Vzácně na pastvinách a loukách.
- Geranium dissectum*** (nat ar). **D. Lištná:** příkopy a trávníky podél silnice směr H. Lištná (DL2). **H. Lištná:** polokulturní louky a polní cesta mezi záp. okrajem obce a kótou 403 (HL4); vlhký příkop podél polní cesty při státní hranici směr Kojkovice 0,5 km sv. od obce (HL6). **Nýdek:** Gora (N44).
- Geranium palustre***. **Bystřice:** B1. **D. Lištná:** DL15. — 2014. **H. Lištná:** HL5. — 2014 NK545. **Nýdek:** N25. **Vendryně:** V5, V8, V15. — 2012 NK094, 2012 NK095.
Roztroušeně na vlhkých loukách.
- Geranium phaeum***. **Bystřice:** B4, B5, B6, B7. **D. Lištná:** KILIÁN (1960), Kilián 1955 OP sec. ZATLOUKAL (1969). **H. Lištná:** ZATLOUKAL (1969). **Nýdek:** Fírlé sec. FIEK (1881), Kilián 1955 OP sec. ZATLOUKAL (1969), N26. **Vendryně:** Kilián 1955 OP sec. ZATLOUKAL (1969), Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969), KILIÁN (1969). — Břehový porost řeky Olše 1,7 km jjv. od žel. stanice Vendryně (2012 NK091); u cesty pod Prašivou horou nedaleko rodinného domu č. p. 1146 (2012!).
Vzácně na vlhkých loukách a březích potoků.
- Geranium pratense***. **Bystřice:** na loukách (ZATLOUKAL 1969); **Bystřice** (2002 Holuša in NDOP). **Vendryně:** roztroušeně na loukách (ZATLOUKAL 1969); **Vendryně** (2007 Hutýrová in NDOP).
Výskyt vyžaduje ověření. Nelze vyloučit záměnu s hojným *G. palustre*.
- Geranium pusillum*** (nat ar). **Vendryně:** — Břehový porost řeky Olše 1,7 km jjv. od žel. stanice Vendryně (2012!).
Vzácně v břehovém porostu.
- Geranium pyrenaicum*** (nat neo). „Lištná“ (1889 Schube in SCHUBE 1903–1904). **D. Lištná:** příkopy a trávníky podél silnice směr H. Lištná (DL2); vsv. část města při silnici do Vendryně přes Sosnu, mezi údolím Olše a pravostranným přítokem (DL15). **Vendryně:** křovinaté stráně nad potokem v sv. části obce (V5). — Pastvina na již. svahu kopce Vružná 700 m sv. od vápenných pecí (2012 NK092).
Vzácně na pastvinách.
- Geranium robertianum***. **Bystřice:** B11, B12. — 2014. **D. Lištná:** DL24, DL25. **H. Lištná:** — 2014!. **Nýdek:** N8, N9, N12, N16, N20, N22. — 2014. **Vendryně:** V23. — 2012!.
Hojně v rozvolněných lesních okrajích, podél potoků a na náplavech.
- Geranium sylvaticum***. **Nýdek:** Čantoryje (KOLBENHEYER 1862; OTRUBA 1926).
Výskyt vyžaduje ověření, neboť novější údaje nejsou. Nelze vyloučit záměnu s hojným *G. palustre*.
- Geum rivale***. **Nýdek:** Čantoryje (KOLBENHEYER 1862); **Nýdek** (2003 Hustáková in NDOP).
- Geum urbanum***. **Bystřice:** B3, B8, B11. — 2014. **D. Lištná:** DL1, DL2, DL18. **H. Lištná:** — 2014. **Nýdek:** N9, N15, N26, N27. — 2014. **Vendryně:** V25. — 2012!, 2014 NK367.
Hojně ve světlínách listnatých lesů a podél lesních lemů.
- Gladiolus imbricatus*** (C2). **Bystřice:** — Vlhká louka u hlavní cesty 1,9 km jv. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014). **Nýdek:** Čantoryje (WIMMER 1832; Kotschy sec. FIEK 1881; OTRUBA 1926); Hluchová u Nýdku (1886 Schube in SCHUBE 1903–1904); údolí Hluchové v úseku Nýdek-Kolibiska (KILIÁN & KILIÁN 1956).

Vendryně: 2007 Hutýrová in NDOP. — Louka sz. od psiho hřbitova 650 m záp. od vrcholu Žďáru (2014).

Vzácně na vlhkých loukách.

Glechoma hederacea. **Bystřice:** B3, B4, B5, B6. — 2014 NK366. **D. Lištná:** DL1, DL2, DL3, DL4, DL18. — 2014!. **H. Lištná:** HL4, HL5. — 2014!. **Nýdek:** N19. — 2014. **Vendryně:** V7. — 2012!.

Hojně na loukách, pastvinách a v rozvolněných lesních okrajích.

Glyceria declinata. **Nýdek:** osada Střelma, údolí prvního přítoku potoka Střelma 0,5 km vsv. od ústí (N13). **Vendryně:** podél státní hranice 0,5 km záp. od vrcholu Ostrý (kóta 709), 1,5 km sv. od údolí potoka na vých. okraji obce (V11).

Glyceria fluitans. **Bystřice:** — 2014!. **H. Lištná:** HL4, HL6. **Nýdek:** N10, N45. — 2014!. **Vendryně:** V25. — 2013!, 2014 NK553 (rev. M. Dančák).

Roztroušeně na březích vodních toků a ploch a na okrajích vlhkých luk.

Glyceria maxima. **Vendryně:** u mostu přes potok 0,6 km sv. od žel. stanice (V10). — Lesní porost na břehu potoka Kopytná 1,9 km jz. od žel. stanice Bystřice (2013!).

Vzácně na březích vodních toků a ploch a na okrajích vlhkých luk.

Glyceria nemoralis (C3). **D. Lištná:** příkopy a trávníky podél silnice směr H. Lištná (DL2), osada Sosna, jv. exponovaný les podél červeně značené turistické lesní cesty 1 km sv.–vsv. od osady (DL7); u potůčku 1,7 km sv. od Babí hory (kóta 492), nejvýchodnější domky obce (DL16). **Vendryně:** — Lesní porost na břehu potoka Kopytná 1,9 km jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2013!).

Vzácně na březích vodních toků a ploch a na okrajích vlhkých luk.

Glyceria notata. **D. Lištná:** osada Sosna, jv. exponovaný les podél červeně značené turistické lesní cesty 1 km sv.–vsv. od osady (DL7). **Nýdek:** — U potoka na sz. svahu V. Stožku 610 m zsz. vrcholu (2014 NK590, rev. M. Dančák). **Vendryně:** v příkopě u cesty (ZATLOUKAL 1969). — Travnatý břeh rybníka na potoce Vápenka 720 m sv. od vápenných pecí (2012 NK099, rev. M. Dančák).

Roztroušeně na březích vodních toků a ploch a na okrajích vlhkých luk.

Gnaphalium norvegicum (C3). **Nýdek:** Čantoryje (Uechtriz sec. FIEK 1881; OTRUBA 1926); osada Střelma, 1,5 km zsz. od vrcholu M. Sošova (kóta 764; N11); hřebenové pastviny u státní hranice 1,5 km již. od vrcholu V. Čantoryje (kóta 995; N21).

Gnaphalium sylvaticum. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N3, N11, N14, N16, N21. — 2014 NK432. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969). — 2012 NK098.

Roztroušeně v listnatých lesích nejčastěji podél cest.

Gnaphalium uliginosum. **Bystřice:** — Na Pasekách, pole 1,6 km již. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2018). **D. Lištná:** na poli (Burša 1975 MP sec. Excerptce pro atlas). **Vendryně:** — Podél pěšinky v lese 1,7 km vjv. od vápenných pecí (2018). Poblíž nalezena i během floristického minikurzu ve Slezských Beskydech (TKÁČIKOVÁ in prep.).

Vzácně nebo spíše přehlížená.

Guizotia abyssinica (cas neo). **Bystřice:** řeka Olše, mocný šterkový náplav z roku 2010, 600 m po soutoku s Hluchovou (2011 Hlisnikovský in ND MSP ČBS).

Gymnadenia conopsea (C2). **Bystřice:** na suchých loukách (KILIÁN 1960). **D. Lištná:** vrch Hradisko (KILIÁN 1960); hojně na suché louce na vrchu Jahodná (Kilián 1960 OP sec. ZATLOUKAL 1969); na louce, kóta 403 (ZATLOUKAL 1969). **Nýdek:** Střelma (ZATLOUKAL 1969). **Vendryně:** Vružná a Babí hora, na křovinaté stráni (ZATLOUKAL 1969); podél státní hranice 0,5 km záp. od vrcholu Ostrý (kóta 709), 1,5 km sv. od údolí potoka na vých. okraji obce (V11); lesní louky při státní hranici 1 km sz. od Ostrého vrchu (kóta 709; V14).

***Gymnadenia densiflora* (C1).** **Vendryně:** Jahodná (Švendová 1975 CESK sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK 1996).

Lokalita pravděpodobně již zanikla (Hlisenikovsky in litt.).

***Gymnocarpium dryopteris*.** **Nýdek:** Střelma, Janula, Filipka, V. Stožek, V. Sošov, Hluchová, V. Čantoryje (ZATLOUKAL 1969); osada Střelma, údolí potoka Střelma podél zeleně značené turistické cesty (N12); údolí Hluchové záp. rozsochy V. Sošova (kóta 885,6; N29); sv. svahy údolí Hluchové asi 0,5 km jv. od osady Poledňa (N32); sv. svahy Loučky (kóta 835 m; N36). — Les pod V. Stožkem 1 km sz. od vrcholu (2014 NK447). **Vendryně:** 2007 Hutýrová in NDOP.

Vzácně ve smíšených lesích.

***Hacquetia epipactis* (C4a).** **D. Líštná:** kaňon bezejmenného potoka jv. od vrchu Jahodná, asi 0,1 km od ústí potoka do Olše (DL27). **Nýdek:** Čantoryje (Grabowski sec. FIEK 1881).

Ve studovaném území se mi nepodařilo výskyt ověřit, roste však v nedalekých Neborech v lese 5,2 km záp. od nemocnice Třinec (2015).

***Hedera helix*.** **Bystřice:** — 2014. **D. Líštná:** KILIÁN (1960), DL19, DL27. — 2015. **Nýdek:** N25. **Vendryně:** — 2012!.

Roztroušeně podél lesních cest nebo v lesích.

***Hepatica nobilis*.** **D. Líštná:** 300 m již. nemocnice (DL18); kaňon bezejmenného potoka jv. od vrchu Jahodná, asi 0,1 km od ústí potoka do Olše (DL27); Jahodná (ONDRASZEK et al. 2004). — Les nad červeně značenou turistickou cestou 500 m ssz. od vrcholu Jahodné (2015).

Vzácně v listnatém lese.

***Heracleum mantegazzianum* (inv neo).** **Bystřice:** levý náplav Olše (2013 Křenek in NDOP). **Nýdek:** u hlavní silnice (2013 Křenek in NDOP).

***Heracleum sphondylium*.** **Bystřice:** B3. **D. Líštná:** DL2, DL4, DL20, DL21. — 2014. **H. Líštná:** HL4, HL5, HL6. **Nýdek:** N12, N26. — 2014. **Vendryně:** V23. — 2012!.

Hojně na loukách a travnatých lemech podél cest.

***Hesperis matronalis*.** **Vendryně:** podél Kopytné (V25).

***Hieracium aurantiacum* (C3).** **Vendryně:** — U cesty na navážce kamenných bloků proti sesuvu břehu 230 m sv. od vápenných pecí (2015).

Vysazený.

***Hieracium bauhini*.** **D. Líštná:** travnaté a křovinaté porosty vápencového hřebene Jahodná u cesty do Sosny (DL10); opuštěný vápencový lom na sev. svazích Jahodné (DL11). **Vendryně:** křovinatá stráž na levém břehu řeky Olše (Kilián 1987 OP sec. PLADIAS 5).

***Hieracium brachiatum*.** Mezi Konskou a Líštnou (Wichura sec. FIEK 1881).

***Hieracium cymosum* (C4a).** Auf der gr. Czantory (WIMMER & GRABOWSKI 1829); Czantory bei Ustroń (WIMMER 1832); Czantory (KOLBENHEYER 1862).

Všechny údaje se nejspíš vztahují k jedinému údaji z polské strany hory. Kromě toho je výskyt tohoto spíš teplomilného druhu v těchto místech málo pravděpodobný a ve fytogeografickém okrese 99b. Slezské Beskydy se nejspíš nevyskytuje (Chrtěk in SLAVÍK & ŠTĚPÁNKOVÁ 2004). Údaj nepřijímá ani ZAJĄC & ZAJĄC (2001).

***Hieracium flagellare* (C3).** **Nýdek:** Čantoryje (1904 Schube in SCHUBE 1903–1904).

***Hieracium glomeratum* (C4a).** **Vendryně:** — Louka pod psím hřbitovem 650 m záp. od vrcholu Žďár (2018 NK627).

Vzácně na louce.

***Hieracium lachenalii*. Bystřice:** — 2014!. **D. Lištná:** DL7, DL9. **Nýdek:** 1888 Schube in SCHUBE (1903–1904), N20. — 2014 NK383. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969). — 2012 NK105, 2012 NK107.

Roztroušeně v listnatých lesích.

***Hieracium lactucella* (C2). Nýdek:** osada Střelma, údolí prvního přítoku potoka Střelma 0,5 km vsv. od ústí (N13).

***Hieracium laevigatum*. Bystřice:** remízek ve svazích kolem erozních zářezů 760 m jv. od dřevěného kostela v Bystřici (2012 Višňák in NDOP). **Nýdek:** — Podél cesty pod V. Stožkem 810 m zsz. vrcholu (2014 NK438); les na záp. svahu V. Stožku 470 m záp. vrcholu (2014 NK594). **Vendryně:** les pod Babí horou ve výraznějším svahu 740 m sv. od vrcholu Jahodná (2012 Višňák in NDOP). — Les pod kopcem M. Kozinec 3,5 km jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2012 NK108).

Roztroušeně v listnatých lesích.

***Hieracium murorum*. Bystřice:** B12, B17, B20. — 2014!. **D. Lištná:** DL1, DL24, DL25. **H. Lištná:** — 2014 NK385. **Nýdek:** N12, N28, N30, N34, N40, N42, N43. — 2013 NK263, 2014 NK384, 2014 NK571. **Vendryně:** V23. — 2012 NK106, 2014!.

Hojně v listnatých lesích.

***Hieracium pilosella*. Bystřice:** 2002 Holuša in NDOP. — 2014. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N11, N20, N21. — 2014 NK387. **Vendryně:** — 2014 NK557.

Roztroušeně na krátkostébelných loukách.

***Hieracium racemosum* (C4a). D. Lištná:** travinná vegetace na vých. a sev. svahu kóty 403 sev. od obce (DL3). **Vendryně:** lesní porost podél toku Vendryňky (Hájková 1988 FMM sec. MOLTAŠOVÁ et al. 2014); Ostrý vrch sv. od obce (Sedláčková 1998 NJM ibidem).

***Hieracium sabaudum*. Bystřice:** — Na Pasekách, les 1,8 km již. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014 NK597). **D. Lištná:** odkaliště (DL28). — Křoviny pod lomem u odkaliště 490 m sev. od vrcholu Jahodné (2014!). **Nýdek:** Góra, u konečné autobusové zastávky, lesík u potoka (Gill 1976 OSM sec. PLADIAS 5). **Vendryně:** louky a údolní svahy podél potoka již. od odbočky silnice do Třince (V8). — Travnatý průsek na hřebenu kopce Vružná 1,2 km sv. od vápenných pecí (2012!).

Roztroušeně ve světlých lesích a podél lesních lemů.

***Hieracium vulgatum* (C3). Nýdek:** SPR Čantoria (1988 Hájková in FLDOK).

Údaj se nejspíš vztahuje k běžnému druhu *H. lachenalii*.

***Holcus lanatus*. Bystřice:** — 2014. **D. Lištná:** DL28. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. — 2014. **Nýdek:** N10, N14. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969), V13. — 2012 NK110, 2014.

Roztroušeně na loukách.

***Holcus mollis*. Bystřice:** B22. — 2013!. **H. Lištná:** HL4. **Nýdek:** N12, N21, N22, N40. — 2014 NK431. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969). — 2012 NK109, 2014!.

Roztroušeně na loukách.

***Hordelymus europaeus*. Vendryně:** Prašivá hora, les (2012 Višňák in NDOP). — U modře značené turistické lesní cesty 700 m sv. od vrcholu Žďár (2018 NK628).

Vzácně na okrajích lesních cest.

***Humulus lupulus*. Nýdek:** lesík u chatové osady asi 1,15 km sev. od dřevěného kostela (2012 Višňák in NDOP). **Vendryně:** potoční lem 1,2 km záp. od žel. stanice Vendryně (2012 Višňák in NDOP).

***Hyperzia selago* (C3).** Bystřice: V Pasekách, podvrcholové jz. svahy Loučky (kóta 835 m; B17). **Nýdek:** Čantoryje (Uechtritz sec. FIEK 1881).

***Hylotelephium jullianum*.** Bystřice: zpustlá louka, slabě přepásaná 850 m jv. od vrcholu Polední (2012 Višňák in NDOP). **Nýdek:** — Louka na Filipce 100 m ssv. od vrcholu (2013!).

***Hylotelephium maximum*.** Bystřice: — Louka u bezejmenného potoka 1,6 km vjv. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014!); louka 1,3 km jv. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014). **D. Lištná:** kóta 350, opuštěný lom (ZATLOUKAL 1969). **Nýdek:** Střelma, na křovinaté mezi (ZATLOUKAL 1969); Góra, nad osadou Ostrý 0,6 km jv. od kóty 709 (N2).

Vzácně na loukách a v lesních lemech na skalních podkladech.

***Hypericum hirsutum*.** **D. Lištná:** vých. část obce (DL5); středně zalesněná část vápencového hřebene Jahodná, 0,5 km jv. od ústí potůčku již. od středu obce (DL6). — U lesní stezky nad odkalištěm u červeně značené turistické stezky 480 m ssz. od vrcholu Jahodné (2014 NK468); paseka 1,2 km sv. od žel. stanice Trinec (2014!). **Vendryně:** podél Kopytné (V24). — Okraj lesa na jv. svahu kopce Babí hora 150 m jz. od vápenných pecí (2012 NK111).

Vzácně ve světlínách v lesích nebo podél lesních cest.

***Hypericum humifusum* (C3).** **Nýdek:** Čantoryje (KOLBENHEYER 1862; Oborný sec. SCHUBE 1903–1904); osada Střelma, 1,5 km zsz. od vrcholu M. Sošova (kóta 764; N11); V. Čantoryje (kóta 995), pokračování hřebene podél červeně značené turistické cesty 0,5 km jjv. od vrcholové kóty (N20). — Les pod M. Sošovem 540 m jz. od vrcholu M. Sošova (2014 NK386).

Vzácně v lesích.

***Hypericum maculatum*.** Bystřice: — 2013 NK264, 2014 NK577. **D. Lištná:** — 2014!. **H. Lištná:** — 2014. **Nýdek:** N9. — 2013!, 2014!. **Vendryně:** V11, V14. — 2012 NK112, 2014.

Hojně na loukách, pastvinách v lemech listnatých lesů.

***Hypericum montanum*.** **D. Lištná:** Jahodná, louka na svahu nad odkalištěm (aff., 2012 Višňák in NDOP). **Nýdek:** Klokacz; Geb. am Stozek [= Stožek] (WIMMER 1841; KOLBENHEYER 1862; FIEK 1881; Kilián OP sec. ZATLOUKAL 1969); Mionší, mezi osadami Plenisko a Dílek (1976 Satora in DLT).

Výskyt je málo pravděpodobný, mj. vzhledem k nadmořské výšce uvedené lokality (Hlisnikovský in litt.). Kiliánův sběr vyžaduje revizi. Višňák v poznámce k nálezu dokonce připouští, že mohlo jít též o *H. maculatum*, navíc *H. montanum* obvykle neroste na loukách, ale ve světlých listnatých lesích.

***Hypericum perforatum*.** Bystřice: 2002 Holuša in NDOP. — 2014!. **D. Lištná:** DL2, DL3, DL4, DL28. — 2014 NK469. **H. Lištná:** HL4, HL5. — 2014. **Nýdek:** N3. **Vendryně:** V25. — 2012 NK113.

Hojně na loukách, pastvinách a v lemech listnatých lesů.

***Hypericum tetrapterum*.** Bystřice: — Náplavy potoka Kopytná, 1,5 km jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014 NK578). **Nýdek:** „Im Klokacz-Geb. bis an die Hütten der Dziaslas an der Czantory“ (WIMMER 1841; KOLBENHEYER 1862; FIEK 1881). **Vendryně:** — Břehový porost potoka Kopytná 1,9 km jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2013!).

Vzácně na březích a náplavech vodních toků.

***Hypochaeris glabra* (C1).** Bystřice: Ascherson sec. FIEK (1881).

Výskyt není doložen a údaj je velmi pravděpodobně mylný (srov. Štěpánková in PLADIAS 4).

- Hypochaeris radicata.** Nýdek: N9, N11, N21. Vendryně: V24. — 2012!, 2013!.
Roztroušeně na loukách, podél cest a na narušených místech.
- Iberis umbellata** (cas neo). D. Lištná: zplaněle na rumištích (ZATLOUKAL 1969).
- Impatiens glandulifera** (inv neo). Bystřice: B8, B11. — 2014; Na Pasekách, na potoce Jatný 1,7 km již. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2018). D. Lištná: KILIÁN (1960). Vendryně: KILIÁN (1960), Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969). — 2012!.
Roztroušeně podél cest, na narušených místech a podél vodních toků.
- Impatiens noli-tangere.** Bystřice: B8. — Na Pasekách, na potoce Jatný 1,7 km již. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2018). D. Lištná: DL6, DL7, DL18. — 2014. Nýdek: N8, N12, N16, N20, N21, N26. — 2014. Vendryně: V17. — 2012 NK224.
Hojně podél lesních cest a břehů vodních toků.
- Impatiens parviflora** (inv neo). Bystřice: 2004 Hustáková in NDOP. — 2014. D. Lištná: DL7, DL15. — 2014. H. Lištná: — 2014. Nýdek: N28, N31. — 2014. Vendryně: V25. — 2012!.
Hojně podél lesních cest a břehů vodních toků.
- Inula conyzae.** Nýdek: — V lese na jz. svahu Mionší 810 m jz. od vrcholu (2014!). Vendryně: vých. okraj borového lesa a přilehlé travinné porosty na již. svazích Vružné (kóta 532) u samoty 0,3 km již. od vrcholu (V2).
Vzácně ve světlých lesích.
- Inula helenium** (nat neo). Nýdek: opuštěná loučka, z velké části zarostlá mladými náletovými dřevinami 680 m jjv. od vrcholu Ostrého vrchu (2012 Višňák in NDOP).
- Inula salicina.** D. Lištná: na výslunné křovinaté stráni na vrchu Jahodná (KILIÁN 1960); osada Sosna, již. okraj lesa ve vých. části vápencového pahorku Jahodná, 0,6 km ssv. od osady (DL8); opuštěný vápencový lom na sev. svazích Jahodné (DL11). — Druhově bohatá louka na Jahodné 300 m sv. od vrcholu Jahodná (2018). H. Lištná: KILIÁN & KILIÁN (1956); hřebenové pastviny mezi lesem 0,7 km záp.–zsz. od vrcholu Vružná (kóta 532; HL1). Vendryně: Vavřkova hora u Vendryně; kóta 570 u Vružné (Vicherek sec. ZATLOUKAL 1969); Vružná, křovinatá stráž; Babi hora, na pasece (ZATLOUKAL 1969).
Dnes už pravděpodobně vzácná.
- Iris graminea** (C2). Vendryně: Reissek sec. KOLBENHEYER (1862). Dále OTRUBA (1926); PODPĚRA (1949).
Pravděpodobně jde o jediný, opakovaně přebíraný údaj. Hrouda & Grulich (in ŠTĚPÁNKOVÁ 2010) považují výskyt za zaniklý.
- Iris pseudacorus.** Bystřice: rybochovná nádrž, částečně s opevněnými břehy 270 m záp. od žel. stanice (2012 Višňák in NDOP).
- Isolepis setacea** (C3). Nýdek: na prameništi u cesty pod vrcholem V. Čantoryje (Vicherek sec. ZATLOUKAL 1969); podmáčená svahová louka jv. od osady Padový (N18). Vendryně: podél Kopytné (V24).
- Isopyrum thalictroides** (C4a). D. Lištná: nehojně ve smíšeném listnatém lese na Jahodné (KILIÁN 1969); poblíž silnice asi 150 m vsv. od nemocnice (DL20); asi 100 m vých. od vrchu Jahodná (kóta 406,7 m; DL22). — Les nad odkalištěm 460 m sv. od vrcholu Jahodné (2014 NK300); les u bezejmen. potoka 550 m již. od vrcholu Jahodné (2015). H. Lištná: — Les na záp. svahu kopce Vružná 380 m zsz. od vrcholu (2014 NK301). Nýdek: V. Čantoryje (1902 Schube in SCHUBE 1903–1904); údolí Hluchové, v bučině (Vicherek sec. ZATLOUKAL 1969). Vendryně: Babi hora, v bučině (Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL 1969).
Vzácně v lesním podrostu.
- Juncus atratus** (C1). D. Lištná: na zamokřené louce, kóta 403 (ZATLOUKAL 1969).

Údaj je jistě chybný. Pravděpodobně vznikl mylným určením sítiny *J. articulatus* (Hlisenikovsky in litt.).

***Juncus articulatus*. Bystřice:** — 2014 NK434. **D. Lištná:** DL28. — 2014. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. **Nýdek:** N7, N13, N15. — 2014!. **Vendryně:** V25. — 2012!, 2014 NK493.

Roztroušeně v příkopech se stojatou vodou, v bažinách, vlhkých lesních lemech a na podmačených loukách.

***Juncus bufonius*. D. Lištná:** DL2. **H. Lištná:** HL5. **Nýdek:** N12, N13, N18. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969), V5. — Na lesní cestě pod kopcem Žďár 4,4 km jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2012 NK117); příkop u cesty pod Prašivou 1,7 km vjv. od žel. stanice Vendryně (2014 NK491).

Vzácně v příkopech nebo na vlhkých lesních cestách.

***Juncus bulbosus*. Nýdek:** vlhké svahové louky sev. od odbočky silnice na V. Čantoryji (N10).

***Juncus compressus*. D. Lištná:** — Odkaliště 560 m sv. od vrcholu Jahodné (2014 NK455). **H. Lištná:** HL5. **Nýdek:** N6, N9. **Vendryně:** V5. — Černovské, vlhká louka 1 km jv. od žel. stanice Vendryně (2012 NK120).

Vzácně na vlhkých loukách, v příkopech se stojatou vodou a pobřežních křovinách.

***Juncus conglomeratus*. Bystřice:** 2003 Hustáková in NDOP. — 2014 NK514. **H. Lištná:** HL5, HL6. **Nýdek:** N19, N24. — 2014. **Vendryně:** — 2012!.

Roztroušeně na vlhkých loukách, nevyužívaných lesních cestách a v příkopech.

***Juncus effusus*. Bystřice:** — 2014!. **H. Lištná:** HL6. — 2014. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N13, N15, N45, N46, N47. — 2013 NK266, 2014!. **Vendryně:** V25. — 2012 NK121.

Roztroušeně na vlhkých loukách, v příkopech a na březích vod.

***Juncus filiformis*. Bystřice:** posečená vlhká louka v centru obce, pod hřbitovem u potoka Prašivka (2012 Višňák in NDOP).

***Juncus inflexus*. Bystřice:** — 2014. **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), DL2, DL5, DL14, DL28. — 2013!, 2014. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. — 2014. **Nýdek:** N10, N19. — 2014. **Vendryně:** V5, V9, V11. — 2012 NK118, 2014.

Roztroušeně na vlhkých loukách, v příkopech a na březích vod.

***Juncus tenuis* (nat neo). Bystřice:** — 2014 NK490. **D. Lištná:** DL14. **H. Lištná:** HL6. — 2014!. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N11, N14, N20, N24. — 2013 NK265, 2014 NK446. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969), V13. — 2012 NK119.

Hojně v lesních bažinách, příkopech podél cest a podél vlhkých lesních lemů.

***Juniperus communis* (C3). Bystřice:** 1902 Schube in SCHUBE (1903–1904). — Křoviny na vých. svahu Loučky, 130 m vých. od vrcholu (2013). **Nýdek:** osada Střelma, údolí prvního přítoku potoka Střelma 0,5 km vsv. od ústí (N13); hřebenové pastviny u státní hranice 1,5 km již. od vrcholu V. Čantoryje (kóta 995; N21).

Vzácně na pastvinách.

***Kickxia elatine* (C2, nat ar). H. Lištná:** vlhký příkop podél polní cesty při státní hranici směr Kojkovice 0,5 km sv. od obce (HL6). **Vendryně:** na okraji pole na sev. úpatí Prašivé u Vendryně (Kilián 1958 OLM, OP sec. CIMALOVÁ 2006; KILIÁN 1960).

***Kickxia spuria*. D. Lištná:** vrch Jahodná, pusté místo v lomu (Burša 1975 FMM sec. CIMALOVÁ 2006).

***Knautia arvensis*. Bystřice:** — 2014. **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), DL2, DL3, DL4. **H. Lištná:** HL4, HL5. **Nýdek:** N1, N19. — 2014. **Vendryně:** Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969). — 2012 NK122.

Hojně na loukách, podél lesních lemů a v trávnatých lemech podél cest.

- Knautia ×posoniensis*** (*K. arvensis* subsp. *arvensis* × *K. kitaibelii*). **Bystřice:** — U cesty 1,6 km sv. od žel. stanice Hrádek (2014 NK511). **D. Lištná:** louka na Jahodné 360 m sv. od vrcholu Jahodná (2012 Višňák in NDOP). — Tamtéž (2015). **Nýdek:** nesečené trávníky v okolí bývalého lyžařského můstku (2012 Višňák in NDOP). **Vendryně:** — Louka na jv. svahu kopce Babí hora 160 m záp. od vápenných pecí (2012 NK123); louka pod Prašivou horou nedaleko rodinného domu č. p. 1106, 960 m jjv. od kostela (2012!).
Roztroušeně na loukách, podél lesních lemů, v travnatých lemech podél cest.
- Lactuca serriola*** (nat ar). **Bystřice:** B24. — 2014. **D. Lištná:** DL2. **H. Lištná:** HL5. **Vendryně:** V24. — 2012!.
Roztroušeně na náplavech vodních toků, podél cest nebo na narušených místech.
- Lamium album*** (nat ar). **D. Lištná:** příkopy a trávníky podél silnice směr H. Lištná (DL2).
- Lamium maculatum***. **Bystřice:** B1, B3, B6. — 2014!. **D. Lištná:** DL2. — 2014!. **H. Lištná:** ZATLOUKAL (1969). — 2014 NK304. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N9, N12, N25. — 2014!. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969), V7, V12. — 2012!.
Hojně na okraji luk, podél cest, v lesích, lesních lemech, podél potoků
- Lamium purpureum*** (nat ar). **Bystřice:** B8. — 2014 NK395. **H. Lištná:** ZATLOUKAL (1969). **Nýdek:** N7, N11. **Vendryně:** — 2013.
Hojně podél cest, na okrajích luk, pastvin a polí.
- Lapsana communis*** (nat ar). **Bystřice:** — 2014. **D. Lištná:** DL2. — 2014. **H. Lištná:** SCHUBE (1903–1904). **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N6, N11. — 2014!. **Vendryně:** V1. — 2012 NK126, 2012 NK127.
Hojně v travnatých lemech podél lesních i nelesních cest, v lesních průsecích i na narušených místech.
- Larix decidua***. **Bystřice:** 2002 Holuša in NDOP. **D. Lištná:** DL28. — 2014. **H. Lištná:** 1990 Páleníková in NDOP. **Nýdek:** N13.
Roztroušeně v lesích a na lesních okrajích.
- Lastrea limbosperma***. **Bystřice:** Ascherson sec. FIEK (1881). **D. Lištná:** Sosna, terénní zářez pravostranného přítoku Olše, vlhký suťový les (*Tilio-Acerion*) na břidličném podkladu, asi 340 m n. m. (Hájková 1989 FMM sec. PLADIAS 5). **Nýdek:** Čantoryje (Uechtritz sec. FIEK 1881; OTRUBA 1925); osada Střelma, údolí prvního přítoku potoka Střelma 0,5 km vsv. od ústí (N13); osada Střelma, lesní potůček u zeleně značené turistické cesty k Beskydskému sedlu (N14). — Les pod V. Stožkem 550 m ssz. od vrcholu (2014 NK450). **Vendryně:** — Les pod kopcem Malý Kozinec 3,5 km jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2012 NK062, det. L. Ekrt).
Vzácně v lesích ve vyšších polohách.
- Lathraea squamaria* subsp. *squamaria***. **Bystřice:** 2009 Chytil in NDOP. — 2014 NK381. **D. Lištná:** — 2014!. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969). **Vendryně:** Zatloukal & Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969). — 2012!, 2014.
Roztroušeně v lesích podél potoků.
- Lathyrus pratensis***. **D. Lištná:** DL4, DL28. — 2014. **H. Lištná:** HL4, HL6. **Nýdek:** N9, N24. — 2014. **Vendryně:** V25. — 2012 NK131.
Roztroušeně na vlhkých loukách, podél potoků a lesních lemů.
- Lathyrus sylvestris***. **D. Lištná:** — Odkaliště 700 m sv. od vrcholu Jahodné (2014). **Vendryně:** křoviny na okraji lesa na úpatí Babí hory (ZATLOUKAL 1969). — Pastvina na již. svahu kopce Vružná 700 m sv. od vápenných pecí (2012 NK132).
Vzácně na pastvinách a narušených místech.

Lathyrus tuberosus (nat ar). **H. Lištná:** příkopy, travníky a okraje polní kultury (kukuřice) podél silnice v obci při státní hranici (HL5).

Lathyrus vernus. **D. Lištná:** křovinaté porosty a travnaté lemy v záp. části vápenného vrchu Jahodná (mezi sv. cípem Třince a potůčkem s tokem k jihu ze středu obce (DL9); poblíž silnice asi 150 m vsv. od nemocnice (DL20); 0,5 km jv. od vrchu Jahodná (kóta 406,7 m; DL21). — Les nad odkalištěm 460 m sv. od vrcholu Jahodné (2014 NK308). **H. Lištná:** — Les u státní hranice na sv. svahu kopce Vružná 310 m sv. od vrcholu (2014 NK307). **Vendryně:** Babí hora (Zatloukal & Vicherek sec. ZATLOUKAL 1969). — Břehový porost potoka Vápenka 720 m sv. od vápenných pecí (2012!).

Roztroušeně v listnatých lesích na vlhkých místech a podél potoků

Leersia oryzoides (C3). Na břehu Olše od Těšina po Jablunkov (KOLBENHEYER 1862).

Údaj je velmi obecný a výskyt se nepodařilo ověřit. Je však možné, že jsem tajničku rýžovitou v terénu přehlédla.

Lemna gibba. **Bystřice:** — Na Pasekách, rybník 1,8 km již. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014 NK426, rev. Z. Kaplan).

Lemna minor. **D. Lištná:** — Tůňka u odkaliště 940 m sv. od vrcholu Jahodné (2014).

Nýdek: horní rybníček 700 m vjv. obecního úřadu (N47). — U rybníku 900 m vých. od dřevěného kostela v Nýdku (2014). **Vendryně:** — Příkop podél cesty na sev. svahu Vendrynského háje 1,2 km vsv. od vápenných pecí (2012 NK143, rev. Z. Kaplan); lesní tůňka nedaleko potoka Kopytná 2 km jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2013).

Roztroušeně v rybnících, tůňkách a příkopech se stojatou vodou.

Leontodon autumnalis. **D. Lištná:** DL4, DL28. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. **Nýdek:** N13. — 2013 NK268, 2014!. **Vendryně:** V6.

Roztroušeně na loukách a stráních.

Leontodon hispidus. **Bystřice:** 2004 Hustáková in NDOP. — 2013!, 2014. **D. Lištná:** DL3, DL9. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. — 2014. **Nýdek:** N9, N12, N13, N21. — 2014 NK379. **Vendryně:** 2004 Hustáková in NDOP. — 2012 NK133, 2013!.

Hojně na loukách, stráních a náplavech vodních toků.

Leucanthemum ircutianum. **Bystřice:** — 2014!. **D. Lištná:** DL3, DL4. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. **Nýdek:** N2, N9, N22. — 2014!. **Vendryně:** — 2014 NK555.

Roztroušeně v travnatých lemech podél cest a na kulturních loukách.

Leucanthemum vulgare. **Bystřice:** 2004 Hustáková in NDOP. — 2014 NK453.

D. Lištná: DL28. — 2014 NK382. **Nýdek:** 2003 Hustáková in NDOP. — 2014!.

Vendryně: Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969). — 2012 NK225.

Hojně na loukách, v travnatých lemech podél cest a na náplavech vodních toků.

Ligustrum vulgare. **Bystřice:** 2003 Hustáková in NDOP. — 2014 NK598. **D. Lištná:** DL8. **Nýdek:** 2003 Hustáková in NDOP. **Vendryně:** Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969).

Vzácně v lesních lemech, křovinatých pláštích, častěji vysazováno podél cest.

Lilium martagon (C4a). **D. Lištná:** na křovinaté stráni na vrchu Jahodná (KILIÁN 1960); asi 0,5 km ssv. Jahodné (kóta 406,7 m), poblíž vleku (DL23). — Les nad kalištěm u červeně značené turistické stezky (2013). **Nýdek:** na Čantoryji (KOLBENHEYER 1862). — Břehový porost v lese podél Horského potoka 1,4 km jv. od Ostrého vrchu (2018). **Vendryně:** v lese mezi kótou 406 a Babí horou (ZATLOUKAL 1969). — Listnatý les na již. svahu kopce Vružná 800 m ssv. od vápenných pecí (2012).

Vzácně ve světlých listnatých lesích.

- Linaria vulgaris*** (nat ar). **D. Lištná:** DL28. — 2014. **H. Lištná:** HL5. — 2014. **Nýdek:** N11, N18. — 2014!. **Vendryně:** V24. — 2012 NK142.
Roztroušeně podél cest, v příkopech a na polních okrajích.
- Linum catharticum***. **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), DL3, DL4, DL9, DL11, DL28. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. **Nýdek:** N7, N10, N22. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969), V5, V11. — 2012 NK141.
Roztroušeně na krátkostébelných loukách.
- Listera cordata***. An der Barania u. d. Ostry bei Teschen (WIMMER 1841).
Údaj se nejspíš vztahuje k polské straně vrchu Ostrý.
- Listera ovata*** (C4a). **D. Lištná:** Mičková 1964 CESK, Burša 1969 OP sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996); ZATLOUKAL (1969); 1972 a 1980 Kryška, Burša 1975 FMM, 1983 Liberlová, 1988 Hájková sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996); DL3, DL8, DL19, DL20, DL23, 2002 Krzyžanková in KRZYŽANKOVÁ (2004). — Louka na Jahodné 1,6 km zsz. vápenných pecí (2013); zarostlé schodovité stupně na odkališti 600 m zsz. od vodní plochy (2018!). **H. Lištná:** Gill 1961 OP, Duda 1971 OP, Burša 1975 FMM, Hájková 1975 FMM sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996); HL3. **Nýdek:** N13. **Vendryně:** Zatloukal & Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969); 1970 Kryška sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996); V2; V16; ONDRASZEK et al. (2004); LADÁNYI (2008). — Vlhká louka u lesa 800 m vsv. od vápenných pecí (2013).
Vzácně na vlhkých loukách.
- Lithospermum arvense*** (nat ar). **D. Lištná:** vrch Jahodná, pusté místo v lomu (Burša 1975 FMM sec. CIMALOVÁ 2006).
- Lolium multiflorum*** (nat neo). **Nýdek:** hráz a sz. okraj vodní nádrže v údolí Hluchové asi 1,5 km sz. od vrcholu Velký Stožek (2017 L. Ekrt in Vysočina). — Louka 1 km vjv. od dřevěného kostela v Nýdku (2014!). **Vendryně:** — Travnatý břeh rybníka na potoce Vápenka 720 m sv. od vápenných pecí (2012!); okraj pole pod Prašivou 900 m zjz. od vrcholu Prašivé hory (2014 NK476).
Roztroušeně na loukách.
- Lolium perenne***. **Bystřice:** B24. — 2014. **D. Lištná:** DL2, DL4. — 2014. **H. Lištná:** HL4, HL5. **Nýdek:** N9, N15. — 2014. **Vendryně:** V25. — 2012 NK136.
Hojně na loukách a pastvinách.
- Lonicera nigra***. **Vendryně:** Malý Ostrý (KOLBENHEYER 1862).
- Lonicera xylosteum***. **D. Lištná:** Jahodná, kóta 406 (ZATLOUKAL 1969); středně zalesněná část vápencového hřebene Jahodná, 0,5 km jv. od ústí potůčku již. od středu obce (DL6); osada Sosna, jv. exponovaný les podél červeně značené turistické lesní cesty 1 km sv.–vsv. od osady (DL7); Sosna, asi 300 m již. od nemocnice (DL18). — Okraj lesa u lomu nad odkalištěm 500 ssz. od vrcholu Jahodné (2014 NK458); okraj lesní cesty 500 m jv. od vrcholu Jahodná (2018). **Vendryně:** Malý Ostrý (1904 Schube in SCHUBE 1903–1904); Babi hora (ZATLOUKAL 1969). — Okraj lesa 240 m ssz. od vápenných pecí (2015).
Vzácně na lesních okrajích.
- Lotus corniculatus***. **D. Lištná:** DL2, DL3, DL4, DL28. **H. Lištná:** HL4, HL6. — 2014. **Nýdek:** N7, N12, N22. — 2014!. **Vendryně:** V25. — 2012 NK129.
Hojně na loukách a pastvinách.
- Lotus uliginosus***. **Bystřice:** — Břehy potoka Jatný 1,7 km jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2018). **D. Lištná:** DL17. **Nýdek:** N9, N10, N13, N14. — 2014!. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969), V9. — 2012 NK130, 2014 NK554.
Roztroušeně na vlhkých loukách a v příkopech.

- Lunaria annua*** (nat neo). **Vendryně:** — U cesty v kamenném násypu 210 m sv. od vápenných pecí (2014!).
Zplaněle ze zahrádek.
- Lunaria rediviva*** (C4a). **Bystřice:** pravý břeh Olše, olšina proti ústí Kopytné (B3, B7); poblíž ústí Hluchové (B8). — Les proti ústí Kopytné 470 m jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014 NK305). **D. Lištná:** kaňon bezejmenného potoka jv. od vrchu Jahodná, asi 0,1 km od ústí potoka do Olše (DL27). — Les u bezejmenného potoka 550 m již. od vrcholu Jahodné (2015). **Nýdek:** 2003 Hustáková in NDOP.
Vzácně na vlhkých místech v lesích.
- Lupinus polyphyllus*** (inv neo). **D. Lištná:** — U cesty kolem odkaliště 520 m sev. od vrcholu Jahodná (2014). **Vendryně:** paseka na Babí hoře (ZATLOUKAL 1969). — Lesní mýtina na vých. svahu kopce Babí hora 390 m sv. od vápenných pecí (2012 NK140).
Vzácně na pasekách a narušených místech.
- Luzula campestris***. **Bystřice:** 2002 Holuša in NDOP. — 2014 NK375. **D. Lištná:** 2004 Hustáková in NDOP. — 2014 NK302. **H. Lištná:** — 2014 NK303. **Nýdek:** 2003 Hustáková in NDOP. **Vendryně:** 2004 Hustáková in NDOP. — 2012!.
Hojně na loukách, pastvinách a v travních pásích.
- Luzula luzulina*** (C3). Ascherson sec. FIEK (1881). **Bystřice:** B16, B20. — 2014 NK372, 2014 NK534. **H. Lištná:** 1900 Schube in SCHUBE (1903–1904). **Nýdek:** 1887, 1888 Schube in SCHUBE (1903–1904), ZATLOUKAL (1969), N14, N38, N40, N41, N42, N43. — 2014 NK373.
Roztroušeně v lesích ve vyšších polohách.
- Luzula luzuloides***. **Bystřice:** B16, B19, B20. **D. Lištná:** — 2014!. **Nýdek:** KOLBENHEYER (1862), ZATLOUKAL (1969), N10, N16, N28, N29, N30, N31, N34, N37, N38, N40, N41, N42. — 2014 NK376. **Vendryně:** — 2012 NK124, 2014 NK550.
Roztroušeně v lesích
- Luzula multiflora***. **Nýdek:** N14. — 2014 NK377. **Vendryně:** — 2012!, 2013 NK267, 2014!.
Vzácně v travnatých lemech podél lesích cest.
- Luzula pallescens***. **Nýdek:** jv. svah Mionší (kóta 744,7 m) poblíž okraje louky Balcarka (N34); vrstevnicová cesta jz. úbočím V. Čantorje (kóta 994,5 m; N42).
- Luzula pilosa***. **Bystřice:** 2002 Holuša in NDOP. — 2014 NK374. **D. Lištná:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969). **Nýdek:** N37, N38, N40. — 2014 NK306. **Vendryně:** — 2012 NK125.
Roztroušeně v lesích, na pasekách a podél lesních cest.
- Luzula sylvatica***. **Nýdek:** úpatí V. Stožku; Střelma až Janula; údolí Hluchové (ZATLOUKAL 1969). — Les na sev. svahu V. Stožku 120 m ssz. od vrcholu (2014 NK448).
Vzácně v lesích v nejvyšších polohách.
- Lychnis chalcidonica*** (cas neo). **D. Lištná:** polokulturní louka v kulminační části (náhorní plošina) kóty 403 (DL4).
- Lychnis flos-cuculi***. **Bystřice:** 2003 Hustáková in NDOP. — 2014. **D. Lištná:** DL4. — 2014 NK380. **H. Lištná:** HL4. **Nýdek:** N10, N12, N22. — 2014. **Vendryně:** V5. — 2012 NK139.
Hojně na loukách.
- Lycopodiella inundata*** (C1). **Bystřice:** Fiek sec. SCHUBE (1903–1904), Kubát in HEJNÝ & SLAVÍK (1997).

Jedná se pravděpodobně o mylný údaj, jelikož FIEK (1881) tento druh ze studovaného území neuvádí a žádný další spolehlivý údaj neexistuje (Hlisnikovský in litt.).

***Lycopodium clavatum* (C3).** Nýdek: — U lesní stezky nedaleko potoka Hluchová 390 m jjz. od vrcholu M. Stožku (2014 NK444). Vendryně: Prašivá (ZATLOUKAL 1969).

Vzácně v lesích a podél lesních cest ve vyšších polohách.

***Lycopus europaeus*.** Bystřice: — 2014 NK424. D. Lištná: DL14, DL28. — 2014. H. Lištná: HL6. Nýdek: N10. Vendryně: V25. — 2012 NK128 (rev. K. Šumberová).

Hojně v travnatých lemech podél lesních cest a na říčních náplavech.

***Lysimachia nemorum*.** Bystřice: — 2014. Nýdek: ZATLOUKAL (1969), N5, N12, N28, N32. — 2013!, 2014 NK378. Vendryně: V11, V17. — 2012 NK135.

Hojně na vlhkých místech v lesích, podél lesních cest a potoků.

***Lysimachia nummularia*.** Bystřice: 2002 Holuša in NDOP. — 2014. D. Lištná: DL4, DL27, DL28. — 2014. H. Lištná: HL4, HL5, HL6. Nýdek: ZATLOUKAL (1969), N9. — 2014. Vendryně: ZATLOUKAL (1969), V4, V8, V17. — 2012 NK134.

Hojně na loukách, pastvinách a mezích.

***Lysimachia thyrsiflora* (C3).** Bei Teschen unter Czantory (KOLBENHEYER 1862).

Výskyt je málo pravděpodobný a vhodné biotopy na české straně v současnosti neexistují. Skalický (in HEJNÝ & SLAVÍK 1992) uvádí nejbližší výskyty vrbiny kytkokvěté z území mezi Karvinou a Českým Těšínem. Vzhledem k lokalizaci v originálním prameni se lze domnívat, že se jedná o nález z polské strany Čantoryje.

***Lysimachia vulgaris*.** Bystřice: B11. — 2014. H. Lištná: HL4, HL5, HL6. Nýdek: ZATLOUKAL (1969), N10, N23. Vendryně: ZATLOUKAL (1969), V22. — 2012 NK137.

Roztroušeně na loukách a podél lesích lemů.

***Lythrum salicaria*.** Bystřice: — 2013, 2014. D. Lištná: DL28. — 2014. H. Lištná: HL5, HL6. — 2014. Nýdek: N18. Vendryně: 2004 Hustáková in NDOP. — 2012 NK138 (rev. K. Šumberová).

Roztroušeně v příkopech podél cest a na loukách.

***Maianthemum bifolium*.** Bystřice: B14. — 2014. D. Lištná: DL1, DL18, DL22, DL24, DL25. — 2014!. H. Lištná: HL2. — 2014. Nýdek: N4, N12, N22, N28, N34, N36, N40, N41, N42, N43. — 2014. Vendryně: V23. — 2012!, 2013 NK269.

Hojně v lesích.

***Malaxis monophyllos* (C1).** B. Ustroń im Niedecker Schlage, auf der gr. Czantory (WIMMER 1832). Vendryně: podél státní hranice 0,5 km záp. od vrcholu Ostrý (kóta 709), 1,5 km svs. od údolí potoka na vých. okraji obce (V11).

Procházka (in ŠTĚPÁNKOVÁ 2010) považuje výskyt na Velké Čantoryji, který mylně klade do roku 1887 (což je ve skutečnosti rok vydání prvního dílu Formánkovy květeny, FORMÁNEK 1887), za zaniklý. Je navíc pravděpodobné, že se údaje z 19. století vztahují k polské straně V. Čantoryje.

***Malva alcea* (C4a).** D. Lištná: sz. okraj lesa u vsv. okraje města (DL14). Vendryně: — U cesty nedaleko kulturního domu 193 m ssv. od kostela (2012 NK146); u cesty na již. svahu kopce Vružná 790 m ssz. od vápenných pecí (2012!).

Roztroušeně podél cest a na okrajích luk.

- Malva moschata.** D. Lištná: kóta 403 u H. Lištná, několik bíle kvetoucích exemplářů (KILIÁN & KILIÁN 1956); na pastvině na úpatí Hradiska (KILIÁN 1969). — Příkop u silnice 300 m vých. od nemocnice Třinec (2014).
Vzácně v příkopech.
- Malva sylvestris.** D. Lištná: DL2, DL14, DL15. Vendryně: V6, V7. — 2012 NK145, 2013!. Roztroušeně podél cest a na okrajích luk.
- Malva verticillata** (cas neo). Bystřice: dva exempláře u dřevěných baráků po okupantech (KILIÁN 1969).
Lokalita se nachází v blízkosti autobusové zastávky u Baráků, 1 km sv. od dřevěného kostela v Bystřici. Dnes je většina území, kde tyto dřevěné baráky stály, zastavěna rodinnými domy (P. Mayer in litt.).
- Matricaria discoidea** (nat neo). Bystřice: B24. D. Lištná: DL5. H. Lištná: ZATLOUKAL (1969). — 2014. Nýdek: N16. — 2014 NK506. Vendryně: V6, V9. — 2013!, 2014!.
Hojně podél cest, na polích a narušených místech.
- Matricaria recutita** (nat ar). Bystřice: — Okraj pole 1,5 km již. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2018). H. Lištná: na poli (ZATLOUKAL 1969).
Vzácně na polích.
- Matteuccia struthiopteris** (nat neo). Bystřice: pravý břeh Olše, olšina proti ústí Kopytné (B3, B4, B5, B6, B7); poblíž ústí Hluchové (B8); levý břeh Olše, východně místní části Na Pasekách (B11).
- Medicago falcata.** D. Lištná: v opuštěném lomu (ZATLOUKAL 1969). H. Lištná: příkopy, trávníky a okraje polní kultury (kukuřice) podél silnice v obci při státní hranici (HL5).
- Medicago lupulina.** Bystřice: ZATLOUKAL (1969). — 2014!. D. Lištná: ZATLOUKAL (1969), DL3, DL4, DL28. — 2014!. H. Lištná: HL4, HL5, HL6. — 2014 NK389. Nýdek: N9, N13. — 2014!. Vendryně: V1, V8, V9. — 2012 NK152.
Hojně na loukách, stráních a podél cest.
- Medicago sativa** (nat neo). Bystřice: — Náplavy řeky Olše 700 m jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014!). Vendryně: — U cesty naproti domu č. p. 365, 530 m jz. od kostela (2012 NK153).
Zplaněle podél cest a na náplavech vodních toků.
- Medicago ×variata** (*M. falcata* × *M. sativa*; nat neo). H. Lištná: HL4, HL5.
- Melampyrum nemorosum.** D. Lištná: Kilián OP sec. ZATLOUKAL (1969), DL4, DL11. — 2013. H. Lištná: HL5. Vendryně: ZATLOUKAL (1969), V2, V9. — 2012 NK144, 2013!.
Roztroušeně na loukách a v travnatých lemech podél cest.
- Melica nutans.** Bystřice: 2009 Chytil in NDOP. D. Lištná: DL1, DL6, DL23, DL24. Nýdek: N27, N28, N31. — Břehový porost v lese podél Horského potoka 1,4 km jv. od Ostrého vrchu (2018). Vendryně: V11, V22. — 2013!.
Roztroušeně v lesích.
- Melica uniflora.** D. Lištná: Jahodná (1966, 1975 Satora in DLT); pod Sosnou, vlhký suťový les (1989 Hájková in ČNFD). Nýdek: 2002 Holuša in NDOP.
Nejbližší ke studovanému území je mi známa ze zahrádky v chatové oblasti v Košariskách; ve studovaném území jsem strdivku jednokvětou přehlédla.
- Melilotus albus** (nat ar). Bystřice: — Náplavy řeky Olše 700 m jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014). D. Lištná: v opuštěném lomu (ZATLOUKAL 1969); odkaliště (DL28). — U cesty kolem odkaliště 670 m ssv. od vrcholu Jahodné (2014). Nýdek: — Podél lesní cesty 600 m ssz. od vrcholu V. Stožku (2014).

- Vendryně:** podél Kopytné (V25). — Břehový porost řeky Olše 1,7 km jjv. od žel. stanice Vendryně (2012 NK147).
Hojně podél cest a na náplavech vodních toků.
- Melilotus officinalis** (nat ar). **Bystřice:** křoviny, okraj lesa a modře značené turistické cesty poblíž mostku přes potok Kopytná 1,1 km jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (B1). **Nýdek:** — Podél lesní cesty v údolí Hluchové 630 m jz. od vrcholu M. Stožku (2014). **Vendryně:** — Okraj lesní cesty na jv. svahu kopce Babí hora 150 m jz. od vápenných pecí (2012 NK148).
Roztroušeně podél cest a na jiných narušených místech.
- Mentha aquatica.** **Nýdek:** Střelma, u potoka; V. Čantoryje, u potoka (ZATLOUKAL 1969). **Vendryně:** podél Kopytné (V24).
Výskyt vyžaduje ověření, jelikož může jít o záměnu s druhem *M. arvensis* (Hlisnikovský in litt.). V Květeně České republiky je však výskyt z příslušného fytogeografického okresu uveden (Štěpánek in SLAVÍK 2000).
- Mentha arvensis.** **D. Lištná:** příkopy a trávníky podél silnice směr H. Lištná (DL2).
H. Lištná: příkopy, trávníky a okraje polní kultury (kukuřice) podél silnice v obci při státní hranici (HL5); vlhký příkop podél polní cesty při státní hranici směr Kojkovice 0,5 km sv. od obce (HL6). **Vendryně:** 0,6 km sev. od kostela (V1). — Zaolší, travnatý průsek v lese 2,7 km jz. od žel. stanice Bystřice (2012 NK154).
Vzácně podél vlhkých lesních cest a v lesních průsecích.
- Mentha longifolia.** **Bystřice:** B1. — 2014. **D. Lištná:** DL15, DL28. **H. Lištná:** HL5. — 2014. **Nýdek:** N12, N15. — 2014. **Vendryně:** V25. — 2012 NK155.
Hojně podél lesních cest a na březích vodních ploch a toků.
- Menyanthes trifoliata** (C3). **Vendryně:** na mokřích loukách (KILIÁN & KILIÁN 1956; KILIÁN 1960).
- Mercurialis perennis.** **Bystřice:** B18. — 2014. **D. Lištná:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), DL6, DL7, DL18, DL19, DL20, DL22, DL24, DL25. — 2014 NK310.
H. Lištná: HL2. — 2014 NK309. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N8, N21, N26, N27, N28, N31, N33. — 2014!. **Vendryně:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), V12, V22. — 2012!.
Hojně v lesích a lesních lemech, hlavně podél potoků.
- Microrrhinum litorale** (cas neo). **Bystřice:** hromada šterku u Hluchové asi 500 m záp. od nádraží (2014 Křenek in ND MSP ČBS). **D. Lištná:** odkaliště (Hlisnikovský in litt).
- Microrrhinum minus** (nat ar). **D. Lištná:** příkopy a trávníky podél silnice směr H. Lištná (DL2); vrch Jahodná, úpatí lomu, 406 m (Burša 1975 FMM sec. CIMALOVÁ 2006); odkaliště (DL28). — Štěrkový násyp u parkoviště 180 m sv. od nemocnice Sosna; plocha odkaliště (2018). **Vendryně:** podél Kopytné (V25).
Roztroušeně na chudých stanovištích.
- Milium effusum.** **Bystřice:** B9, B10. **D. Lištná:** DL7. **Nýdek:** N4, N27, N28, N31, N41. **Vendryně:** Zatloukal & Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969). — 2013 NK270.
Roztroušeně ve vlhkých lesních lemech.
- Moehringia trinervia.** **Bystřice:** — 2014!. **D. Lištná:** DL1. **Nýdek:** N12, N13, N15, N21, N31. — 2014 NK442. **Vendryně:** V8. — 2013, 2014 NK558.
Hojně na lesních světlinách, mýtinách a u lesních cest.
- Monotropa hypophegea** (C2). **D. Lištná:** — Místo zarostlé stromy okolo vodní plochy na odkališti 50 m sev. od vodní plochy (2018 NK629).
Ve studovaném území zaznamenán na jediné lokalitě. Podle relativní velikosti genomu zjištěné metodou průtokové cytometrie na Katedře botaniky PrF UP

- v Olomouci (M. Hroneš, in litt.) se jedná o hexaploidní jedince. Podle morfologických znaků (kulaté tobolečky, lysé květní části a chudé květenství nanejvýš s 10 květy), byla tato populace přiřazena druhu *M. hypophegea*.
- Monotropia hypopitys* (C3).** Nýdek: smrčina na záp. svahu V. Čantoryje (ZATLOUKAL 1969); osada Střelma, lesní potůček u zeleně značené turistické cesty k Beskydskému sedlu (N14).
- Muscari comosum* (C3).** Líštná (KOLBENHEYER 1862; Kotschy sec. FIEK 1881).
- Mycelis muralis*.** Bystřice: B12, B13, B14, B16, B17. — 2014!. **D. Líštná:** DL1, DL24, DL25. **H. Líštná:** HL2. — 2014!. **Nýdek:** N10, N12, N28, N31, N37, N38. — 2014. **Vendryně:** V17, V23. — 2012 NK150, 2012 NK151.
Hojně v lesích, podél lesních cest a na pasekách.
- Myosotis arvensis* (nat ar).** **D. Líštná:** DL2. — 2014!. **H. Líštná:** HL6. **Nýdek:** N11. **Vendryně:** V1, V9. — 2012!, 2014 NK523.
Roztroušeně na polích, náplavech nebo podél cest.
- Myosotis nemorosa*.** Bystřice: — 2014!. **D. Líštná:** — 2013!. **Nýdek:** 1989 Hájková in NDOP. — 2014 NK388, 2014 NK524. **Vendryně:** 2003 Wolfová in NDOP. — 2014!.
Hojně na vlhkých loukách, podél lesních lemů.
- Myosotis palustris*.** Bystřice: B1. — 2014 NK525. **Nýdek:** — 2014!. **Vendryně:** V11, V22. — 2012 NK149, 2013!.
Hojně podél lesních cest, na náplavech a březích vodních toků a ploch.
- Myosotis ramosissima*.** Nýdek: v listnatém lese v údolí Hluchové (ZATLOUKAL 1969).
Údaj je nejspíš vzhledem k uvedenému biotopu mylný, jelikož druh roste spíše na suchých trávnících. Štěpánková (in SLAVÍK 2000) žádný výskyt z této oblasti neuvádí.
- Myosotis sylvatica*.** Nýdek: V. Čantoryje v bučině (ZATLOUKAL 1969). **Vendryně:** 1990 Sedláčková in NDOP. — Okraj lesa na již. svahu kopce Vružná 780 m jv. od vrcholu (2014).
Vzácně v rozvolněných lesních okrajích.
- Myosoton aquaticum*.** Bystřice: — 2014!. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969). — 2014 NK421. **Vendryně:** V24. — 2012 NK226.
Hojně na náplavech a podél vodních toků.
- Myricaria germanica* (C1).** Bystřice: Spatzier & Urban OP sec. ZATLOUKAL (1969).
Přirozený výskyt dávno zanikl. V korytě říčky Kopytná u Bystřice byl židovíník v roce 1996 znovu vysazen a v roce 2001 tam přežívalo jen 5 jedinců (2001 Chytil in HADINEC et al. 2002).
- Myriophyllum spicatum*.** **D. Líštná:** vodní odkaliště (DL28). — Vodní plocha na odkališti 860 m sv. od vrcholu Jahodné (2014 NK568).
Vzácně, z území znám pouze z vodní plochy odkaliště.
- Nardus stricta*.** Bystřice: 2002 Holuša in NDOP. **Nýdek:** N1, N13, N21. — Okraj louky 200 m sz. od vrcholu M. Sošova (2014). **Vendryně:** 2007 Hutýrová in NDOP.
Roztroušeně na krátkostébelných loukách a pastvinách.
- Nasturtium officinale* (C2).** Vendryně: sad 750 m sz. od katolického kostela (2017 Michalik in ND MSP ČBS).
Zcela jistě jde o determinační omyl. Pravděpodobně záměna za *Cardamine amara* (Hlisnikovský in litt.).
- Neottia nidus-avis* (C4a).** **D. Líštná:** Kilián 1956 OP sec. ZATLOUKAL (1969); Burša 1969 OP, 1972 a 1980 Kryška, Švendová 1973 CESK, Burša 1975 FMM sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996); DL7; DL25; 2007 Ladányi, in litt.; 2002 Krzyžanková

in KRZYŽANKOVÁ (2004). — Les nad kalištěm 630 m sv. od vrcholu Jahodné (2013). **H. Lištná:** Duda 1971 OP, Burša 1975 FMM sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996). **Vendryně:** KOLBENHEYER (1862); Vicherek 1956 BRNU sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996); V23; LADÁNYI (2008). — Listnatý les na již. svahu kopce Vružná 800 m ssv. od vápenných pecí (2015).

Roztroušeně ve stinných lesích.

Nymphaea sp. Nýdek: N46, N47. — V rybnících 900 m vých. od dřevěného kostela v Nýdku (2014).

Jedná se o vysazenou populaci nejasné taxonomické příslušnosti.

Odontites vernus subsp. serotinus. D. Lištná: DL28. — 2014 NK443. **H. Lištná:** HL5, HL6 (obojí jako *O. rubra* agg.). **Vendryně:** V5, V9 (obojí jako *O. rubra* agg.). — 2012 NK227.

Roztroušeně na polních okrajích, ve vlhkých lesních průsecích a v pobřežních křovinách.

Oenothera glazioviana (nat neo). **Bystřice:** — Náplavy řeky Olše 700 m jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014 NK575). **Vendryně:** — Pole u rodinného domu č. p. 184, 660 m sv. od vápenných pecí (2012!).

Hojně na náplavech a narušených místech.

Oenothera victorini (cas neo). **D. Lištná:** — Západní část odkaliště 640 m jjz. od vrchu Jahodná (2018 NK630). **Bystřice:** — Náplavy řeky Olše 700 m jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014!).

Roztroušeně na náplavech.

Onobrychis viciifolia (nat neo). **D. Lištná:** polokulturní louka v kulminační části (náhorní plošina) kóty 403 (DL4); travnaté a křovinaté porosty vápencového hřebene Jahodná u cesty do Sosny (DL10). — Louka nad odkalištěm 390 m ssv. od vrcholu Jahodné (2014 NK467). **H. Lištná:** příkopy, trávníky a okraje polní kultury (kukuřice) podél silnice v obci při státní hranici (HL5). **Vendryně:** Vružná, křovinatá stráž (ZATLOUKAL 1969).

Vzácně na mezofilních loukách.

Ononis arvensis (C3). **D. Lištná:** Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969), DL3, DL4, DL10, DL28. **H. Lištná:** HL1. **Nýdek:** N24. **Vendryně:** Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969), V2, V14. — 2012 NK157.

Vzácně na suchých loukách a stráních.

Ononis spinosa. D. Lištná: ZATLOUKAL (1969). **H. Lištná:** HL5. **Vendryně:** Uechtritz sec. SCHUBE (1903–1904), Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969).

Orchis mascula subsp. signifera (C2). **Bystřice:** 2003 Hustáková in NDOP. **D. Lištná:** Zatloukal & Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969); Míčková 1973 CESH, Burša 1975 FMM, 1980 Kryška, 1989 Hájková sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996), DL23, 2002 Krzyžanková in KRZYŽANKOVÁ (2004). — Jahodná vlhká louka 1,6 km zsz. od vápenných pecí (2014). **H. Lištná:** KILIÁN & KILIÁN (1956); Burša 1975 FMM sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996). **Nýdek:** KILIÁN & KILIÁN (1956); Šula 1968 OLM, OP, Zatloukal 1968 BRNU sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996). **Vendryně:** Kilián 1957 OP, Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969); Zatloukal 1968 BRNU, Gill 1968 OP sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996); LADÁNYI (2008). — Listnatý les na již. svahu kopce Vružná 800 m ssv. od vápenných pecí (2012).

Jako *Orchis mascula* subsp. *signifera* byly v minulosti nazývány všechny populace ze severovýchodní Moravy a českého Slezska, podle novějšího názoru byl poddruh přejmenován na *O. mascula* subsp. *speciosa* (Kubát in ŠTĚPÁNKOVÁ 2010). Roztroušeně na loukách.

- Orchis militaris* (C2). „Am Tul und bei Ober-Lischna“ (KOLBENHEYER 1862; Kotschy sec. FIEK 1881; OTRUBA 1926; PODPĚRA 1949; Kubát in ŠTĚPÁNKOVÁ 2010).
PODPĚRA (1949) se domnívá, že se lokalita nachází na polské straně.
- Orchis morio* (C1). Nýdek: 1989 Páleníková in NDOP.
Pravděpodobně se jedná o determinální omyl.
- Orchis pallens* (C2). **Bystřice:** Hájková 1995 FMM sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996).
D. Lištná: Burša 1975 CESH, FMM, Raszka 1981 OP, 1983 Liberdová, 1988 Hájková ibidem; DL21; 2002 Krzyžanková in KRZYŽANKOVÁ (2004). — Les nad červeně značenou turistickou cestou 500 m sz. od vrcholu Jahodné (2014).
Vendryně: Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969); Hájková 1988 FMM sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996); ONDRASZEK et al. (2004); LADÁNYI (2008). — Les na záp. svahu Vružné 1 km sz. od vápenných pecí (2014); les na již. svahu Vružné 770 m sv. od vápenných pecí (2014).
Vzácně v listnatých lesích a na pasekách. V lese u D. Lištné se nachází jedna z největších populací na severní Moravě a ve Slezsku. Kubát (in ŠTĚPÁNKOVÁ 2010) považuje výskyt za zaniklý, což však neodpovídá skutečnosti.
- Orchis tridentata* (C1). Nýdek: u Nýdku na cestě k Beskydu (Žlik sec. KOLBENHEYER 1862; OTRUBA 1926; PODPĚRA 1949).
Údaj je velmi pravděpodobně mylný. Kubát (in ŠTĚPÁNKOVÁ 2010) uvádí, že šlo buď o mylně určené rostliny druhu *Transtauneria globosa*, anebo o mylné určení jiných druhů rodu *Orchis*.
- Orchis ×lorenziana* (*O. mascula* × *O. pallens*). **Vendryně:** — Les na záp. svahu Vružné 1 km sz. od vápenných pecí (2014).
Na této lokalitě v místech společného výskytu *O. mascula* a *O. pallens* sporadicky vznikají kříženci se širokými listy a fialovými květy.
- Origanum vulgare* subsp. *vulgare*. **D. Lištná:** Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969), DL3, DL9, DL28. — 2014. **H. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), HL1, HL5. — 2014. **Nýdek:** N19. **Vendryně:** Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969). — 2012 NK156.
Roztroušeně na nepravděpodobně sečených loukách, v lesních lemech a v rozvolněných lesních okrajích.
- Orobancha flava* (C3). **Vendryně:** podél Kopytné (V24). — Náplavy potoka Kopytná 1,9 km jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2013!).
Vzácně na náplavech a březích vodních toků v porostech devětsilu.
- Orobancha minor* (nat ar). **Vendryně:** nehojně na jeteli lučním (KILIÁN 1969); vlhčí louka na pravém břehu řeky Olše 0,15 km jz. od žel. zastávky, podél zeleně značené turistické cesty do lesa Rovná (V15).
Velmi pravděpodobně jednorázový, dávno zaniklý výskyt.
- Oxalis acetosella*. **Bystřice:** B13, B14, B16, B17, B18, B19, B20. — 2014. **D. Lištná:** DL27. — 2014 NK311. **H. Lištná:** — 2014. **Nýdek:** N12, N21, N26, N27, N28, N29, N30, N31, N32, N33, N34, N35, N37, N38, N39, N41, N43. — 2014. **Vendryně:** Zatloukal & Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), V22, V23. — 2012!, 2014. Hojně ve stinných lesích.
- Oxalis fontana* (nat neo). **Bystřice:** — 2014. **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), DL4, DL15. **H. Lištná:** HL6. **Nýdek:** N10, N11. **Vendryně:** — 2012!.
Roztroušeně podél vodních toků, na narušených místech a jako plevel na polích.
- Papaver rhoeas* (nat ar). **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), DL2. **Vendryně:** V1, V8. — 2012, 2014 NK477.
Roztroušeně na polích.

- Parnassia palustris* (C2). **Nýdek:** na rašelinných a mokřích loukách (KILIÁN 1960).
- Paris quadrifolia*. **D. Lištná:** DL6, DL7, DL19, DL20. — 2014. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N13, N29, N31, N32. **Vendryně:** Zatloukal & Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), V22, V23. — 2012 NK219.
Hojně v lesích.
- Parthenocissus inserta* (inv neo). **Vendryně:** podél Kopytné (V25).
- Pastinaca sativa*. **Bystřice:** — 2014. **D. Lištná:** — 2014. **Nýdek:** 2003 Hustáková in NDOP. **Vendryně:** — 2012 NK160.
Roztroušeně podél cest, na železničních náspech a v příkopech.
- Pedicularis palustris* (C1). **H. Lištná:** bažinaté louky (DUDA 1959). **Vendryně:** Vendryně: (KOLBENHEYER 1862).
Pravděpodobně v území vyhynulý druh.
- Peplis portula*. **Nýdek:** osada Střelma, údolí prvního přítoku potoka Střelma 0,5 km vsv. od ústí (N13).
- Persicaria amphibia*. **Bystřice:** zarostlá plocha uprostřed louky, asi odvodněný močál, sv. okraj obce, asi 1 km sv. od kostela (B22). **D. Lištná:** údolí potoka Lištnice, kolem příkopu (Burša 1975 FMM sec. PLADIAS 4). **Vendryně:** — Břehový porost potoka nedaleko domu č. p. 308, 590 m jv. od kostela (2012 NK220, rev. J. Danihelka).
Vzácně na březích potoků a v mokřinách.
- Persicaria hydropiper*. **D. Lištná:** DL2. **Nýdek:** — 2013!. **Vendryně:** V24. — 2012 NK165 (rev. J. Danihelka).
Hojně podél vlhkých lesních cest, v příkopech a podél vodních toků.
- Persicaria lapathifolia*. **Bystřice:** — 2014 NK517 (subsp. *pallida*; rev. J. Danihelka). **D. Lištná:** DL28. **H. Lištná:** ZATLOUKAL (1969). — 2014 NK516 (subsp. *lapathifolia*; rev. J. Danihelka). **Nýdek:** N9. **Vendryně:** V24.
Hojně podél vlhkých lesních cest, v příkopech a podél vodních toků.
- Persicaria maculosa*. **Bystřice:** — 2013 NK273, 2014 NK522 (obojí rev. J. Danihelka). **D. Lištná:** DL2. **Nýdek:** N10. — 2014 NK401 (rev. J. Danihelka). **Vendryně:** — 2012 NK167, 2014!.
Hojně podél vlhkých lesních cest, v příkopech a podél vodních toků.
- Persicaria minor*. **Bystřice:** — 2014 NK521. **Nýdek:** údolí potoka Hluchová, blízko osady Kolibiska, asi 6 km (Sutorý 2001 BRNM sec. PLADIAS 5). **Vendryně:** V24. — 2012 NK166 (rev. J. Danihelka).
Roztroušeně podél vlhkých lesních cest, v příkopech a podél vodních toků.
- Persicaria mitis*. **Bystřice:** — 2014 NK518 (rev. J. Danihelka). **D. Lištná:** DL28. — Okraj lesa u vodojemu 930 m sz. od vrcholu Jahodné (2014 NK520). **H. Lištná:** — 2014 NK519 (rev. J. Danihelka). **Nýdek:** N44. **Vendryně:** V24. — 2012 NK164.
Hojně podél vlhkých lesních cest, v příkopech a podél vodních toků.
- Petasites albus*. **Bystřice:** B3, B8, B9, B10, B12. **D. Lištná:** DL6, DL7, DL22. — 2014 NK315. **H. Lištná:** — 2014. **Nýdek:** KOLBENHEYER (1862), ZATLOUKAL (1969), N5, N12, N13, N14, N26, N27, N28, N30, N37, N38. — 2014. **Vendryně:** V4, V22. — 2012 NK169, 2014.
Hojně podél lesních cest a potoků.
- Petasites hybridus*. **Bystřice:** B3, B4, B5, B6, B7, B8, B11. — 2014 NK399. **D. Lištná:** DL5. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N9, N25, N26. **Vendryně:** V25. — 2013!, 2014 NK400.
Roztroušeně v mokřinách v lesních průsecích a podél potoků a řek.

- Petasites kablikianus* (C4a).** **Bystřice:** Olše, pod soutokem s Kopytnou (2012 Lustyk in NDOP). — Les podél potoka Kopytná a břehy potoka 1,7 km jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014).
Roztroušeně v pobřežních houštinách.
- Peucedanum palustre*.** **Bystřice:** v olšině na levém břehu řeky Olše (KILIÁN 1960).
- Phalaris arundinacea*.** **Bystřice:** — Náplavy řeky Olše 700 m jz. žel. stanice Bystřice nad Olší (2014!). **Nýdek:** — U cesty 1,2 km sev. od dřevěného kostela v Nýdku (2014!); louka nad bezejmenným potokem 1 km vých. od dřevěného kostela v Nýdku (2014 NK540). **Vendryně:** v obci 0,5 km vých. od kostela (V7). — Les pod psím hřbitovem 620 m záp. od vrcholu Žďáru (2014!).
Hojně na náplavech a březích vodních toků a na vlhkých loukách.
- Phegopteris connectilis*.** **Bystřice:** B19. **Nýdek:** N13, N14, N29, N33, N35, N39. **Vendryně:** — 2013!.
Roztroušeně v lesích.
- Phleum alpinum* (C3).** **Nýdek:** Czantory bei Teschen (Kotschy sec. PODPĚRA 1927; WIMMER 1841; KOLBENHEYER 1862); V. Čantoryje, pastvina na hřebeni (Zatloukal 1968 BRNU rev. J. Chrtek jun., srov. ZATLOUKAL 1969).
Polská literatura nebere tento výskyt v potaz (srov. ZAJĄC & ZAJĄC 2001); KOLBENHEYER (1862) uvádí ještě na Barani hoře v Polsku.
- Phleum bertolonii*.** **Bystřice:** — 2014!. **D. Lištná:** — 2014! (cf.). **Nýdek:** N21. **Vendryně:** — 2014 NK548 (rev. J. Chrtek jun.).
Roztroušeně na krátkostébelných loukách a narušených místech.
- Phleum pratense*.** **Bystřice:** 2002 Holuša in NDOP. **D. Lištná:** DL4. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. — 2014!. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N11. — 2014. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969). — 2012 NK163 (rev. J. Chrtek jun.), 2012 NK017 (rev. J. Chrtek jun.), 2014!.
Hojně na loukách a pastvinách.
- Phragmites australis*.** **Bystřice:** 2003 Hustáková in NDOP. **D. Lištná:** kolem vodní plochy odkaliště (DL28). — U vodní plochy na kališti 1,5 km sz. od vápenných pecí (2013!). **Nýdek:** dolní rybníček vjv. obecního úřadu (N45). — U rybníku 900 m vých. od dřevěného kostela v Nýdku (2014). **Vendryně:** — Příkop podél červeně značené turistické cesty 1,1 km sz. od vápenných pecí (2013!).
Roztroušeně kolem vodních ploch a v příkopech se stojatou vodou.
- Phyllitis scolopendrium* (C1).** **D. Lištná:** kaňon bezejmenného potoka jv. od vrchu Jahodná, asi 0,1 km od ústí potoka do Olše (DL27); pod Sosnou, přítok řeky Olše, vlhký suťový les (2004 Hájková in ČNFD; HÁJKOVÁ 2005). — Svah nad bezejmenným potokem 640 m jz. od vrcholu Jahodná, 100 m před ústím potoka do Olše (2015). **Vendryně:** — Strmý svah nad bezejmenným potokem 640 m jz. od vrcholu Jahodná, 100 m před ústím potoka do Olše (2015).
Všechny nálezy se vztahují k jediné lokalitě, kdy největší populace roste na levém břehu potoka v katastru obce Vendryně, několik jedinců se však vyskytuje i na pravém břehu potoka, tedy v D. Lištné.
- Phyteuma orbiculare* subsp. *orbiculare*.** **Nýdek:** Kovanda in SLAVÍK (2000).
Pravděpodobně jde o mylný údaj. Žádný další údaj se nepodařilo najít. V České republice roste nejbližze odsud v Bílých Karpatech a v Oderských vrších, ve studované oblasti nebyl nikdy znám (Hlisenkovský in litt.).
- Phyteuma spicatum*.** **Bystřice:** V Pasekách, 0,3 km od konečné zastávky busu (B13). — U lesní cesty nad potokem Kompařov 1,5 km sv. od žel. stanice Hrádek (2014). **Nýdek:** Střelma až Zakámen; Střelma až Janula; údolí Hluchové; V. Čantoryje

(ZATLOUKAL 1969); vlhké svahové louky sev. od odbočky silnice na V. Čantoryji (N10); hřebenové pastviny u státní hranice 1,5 km již. od vrcholu V. Čantoryje (kóta 995; N21). — Les pod M. Sošovem 600 m jz. od vrcholu M. Sošova (2014 NK397); břehové porosty horského potoka 1,3 km jv. od vrcholu Ostrého vrchu (2018).
Vzácně v lesích.

Picea abies. Bystřice: B15. **D. Lištná:** DL20, DL22, DL23, DL28. **Nýdek:** N22, N30, N39, N41, N42, N43. **Vendryně:** V25. — 2012.
Hojně v lesích, místy monokulturní výsadby.

Picris hieracioides. **D. Lištná:** travinná vegetace na vých. a sev. svahu kóty 403 sev. od obce (DL3); křovinaté porosty a travnaté lemy v záp. části vápenného vrchu Jahodná (mezi sv. cípem Trince a potůčkem s tokem k jihu ze středu obce (DL9); okraj lesa vápencového hřebene Jahodná (DL12). **H. Lištná:** příkopy, trávníky a okraje polní kultury (kukuřice) podél silnice v obci při státní hranici (HL5). **Vendryně:** — Ruderalizované místo na louce 80 m sz. od žel. stanice Vendryně (2013!).

Roztroušeně podél cest, na rudérálních místech a v příkopech.

Pimpinella major. **Vendryně:** okraj listnatého lesa na úpatí Babí hory (ZATLOUKAL 1969); v obci 0,5 km vých. od kostela (V7). — Travnatý průsek na hřebenu kopce Vružná 1,2 km sv. od vápenných pecí (2012); louka na psím hřbitově 440 m záp. od vrcholu Žďáru (2014 NK551).

Roztroušeně na loukách a na travnatých průsecích v lese.

Pimpinella saxifraga. Bystřice: — 2013 NK271, 2014 NK489. **D. Lištná:** DL3, DL4. **H. Lištná:** HL4, HL5. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N2, N7, N12. — 2014!. **Vendryně:** V8. — 2014!.

Hojně podél cest a na loukách.

Pinus nigra (nat neo). **Vendryně:** Babí hora, vysázená v lese (ZATLOUKAL 1969).

Pinus sylvestris. **D. Lištná:** DL1. **H. Lištná:** 1990 Páleníková in NDOP. **Nýdek:** — 2014. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969). — 2012!.

Roztroušeně v lesích, nejspíš jen z výsadby.

Plantago arenaria. **Nýdek:** Gora, návoz písčité zeminy poblíž usedlosti na pravém břehu horského potoka (Sedláčková 1999 NJM sec. HADINEC et al. 2004).
Jednorázový druhotný výskyt.

Plantago lanceolata. Bystřice: 2004 Hustáková in NDOP. — 2014. **D. Lištná:** DL3, DL4, DL28. — 2014. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. — 2014. **Nýdek:** N9, N11, N20. — 2014. **Vendryně:** V25. — 2012!.

Hojně na loukách, pastvinách a podél cest.

Plantago major subsp. major. Bystřice: B24 (agg.). — 2014. **D. Lištná:** DL2, DL4, DL28. — 2014. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. **Nýdek:** N9, N20, N23. — 2014. **Vendryně:** V8. — 2012!.

Hojně na loukách, pastvinách a podél cest.

Plantago media subsp. media. **D. Lištná:** louka na Jahodné 360 m sv. od vrcholu Jahodná (2012 Višňák in NDOP). — U lomu 500 m sev. od vrcholu Jahodné (2014). **H. Lištná:** mozaika luk a pastvin 670 m jz. od hraničního přechodu (2012 Višňák in NDOP). **Nýdek:** nesečené trávníky v okolí bývalého lyžařského můstku (2012 Višňák in NDOP). — Louka na jv. svahu Vrchhory 80 jv. od vrcholu (2018). **Vendryně:** pastvina 410 m již. od vápenných pecí (2012 Višňák in NDOP). — Pastvina na již. svahu kopce Vružná 650 m sv. od vápenných pecí (2012 NK162; rev. J. Danihelka).

Vzácně na loukách a pastvinách.

- Platanthera bifolia* (C3).** **Bystřice:** 2002 Holuša in NDOP. **D. Lištná:** Krajínová 1973 CESK, Míčková 1973 CESK, Burša 1975 CESK, 1983 Liberdová, Duda 1987 OP sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996); 2002 Krzyžanková in KRZYŽANKOVÁ (2004); 2007 Ladányi, in litt. — Lesní lem odkaliště 560 m ssv. od vrcholu Jahodné (2014); les nad červeně značenou turistickou cestou 500 m szs. od vrcholu Jahodné (2014). **H. Lištná:** Burša 1975 FMM sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996). **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969); N13; N22; Hájková 1986 FMM, 1994 Šmiták sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996). — Louka pod Gruníkem 500 m zsz. od vrcholu M. Sošova (2014); louka pod M. Sošovem 280 m záp. od vrcholu (2014). **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969); 1970 Kryška sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996); V22; ONDRASZEK et al. (2004). — Vlhká louka u smrkového lesa 800 m vsv. od vápenných pecí (2013).
Vzácně na loukách a v lesních lemech.
- Platanthera chlorantha* (C3).** **D. Lištná:** Jahodná (1980 Kryška sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK 1996). **Nýdek:** u Čantoryje (1885 Schube in SCHUBE 1903–1904). **Vendryně:** Malý Ostrý (1886 Schube in SCHUBE 1903–1904).
- Poa angustifolia*.** **Bystřice:** u potoka Kompařov (2001 Cimalová in ČNFD). — Louka u bezejmenného potoka 1,6 km jv. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014 NK394).
Vzácně na loukách. Rozlišování od hojnější lipnice luční je často obtížné.
- Poa annua*.** **Bystřice:** B21. — 2014!. **D. Lištná:** DL2. **H. Lištná:** HL4, HL5. **Nýdek:** N11, N21. — 2014!. **Vendryně:** V6. — 2012!.
Hojně podél cest, na cestách, narušených místech a náplavech vodních toků.
- Poa compressa*.** **Bystřice:** B25. **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), DL3, DL28. — 2014 NK610. **H. Lištná:** HL5. **Vendryně:** V25.
Vzácně na narušených místech a podél cest.
- Poa humilis*.** **D. Lištná:** vých. část obce (DL5).
- Poa nemoralis*.** **Bystřice:** B11, B12, B13, B16, B17. **D. Lištná:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), DL1, DL2, DL19, DL20, DL22, DL23, DL24, DL25. **H. Lištná:** HL2. **Nýdek:** N4, N13, N28, N31, N34, N37, N38, N40, N41, N43. **Vendryně:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969). — 2012 NK172, 2012 NK173, 2014 NK559.
Hojně v lesích, v travnatých lemech podél lesních cest a podél potoků.
- Poa palustris*.** **Bystřice:** — 2014 NK536. **D. Lištná:** DL5, DL28. — 2014!. **Nýdek:** — 2014 NK392. **Vendryně:** V25.
Roztroušeně podél potoků a na náplavech vodních toků.
- Poa pratensis*.** **Bystřice:** 2003 Hustáková in NDOP. — 2014!. **D. Lištná:** DL2, DL3, DL4, DL5. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N23 (agg.). — 2014 NK542. **Vendryně:** V25. — 2012!.
Hojně na loukách a pastvinách.
- Poa supina*.** **Nýdek:** osada Střelma, 1,5 km zsz. od vrcholu M. Sošova (kóta 764; N11); osada Střelma, lesní potůček u zeleně značené turistické cesty k Beskydskému sedlu (N14).
- Poa trivialis*.** **D. Lištná:** DL2, DL4. **H. Lištná:** HL4, HL6. **Nýdek:** N9, N12. — 2014 NK393. **Vendryně:** V1, V9. — 2012 NK174.
Hojně na vlhkých loukách.
- Polygala amarella* subsp. *amarella* (C2).** **D. Lištná:** 350 m (MÍČKOVÁ 1958); vápencový pahorek zvaný Jahodná (kóta 406,7; Míčková 1956 CESK, rev. J. Kirschner sec. HADINEC & LUSTYK 2007).
Oba údaje se vztahují k témuž nálezu (na schedě „Lištná u Třince, Jahodová hora“), který byl uveřejněn pod jménem *P. amara* (MÍČKOVÁ 1958). Herbář Muzea

Těšínska (CESK) nebyl v době zpracování rodu *Polygala* pro Květenu České republiky (Kirschner in SLAVÍK 1997) studován, a proto není *P. amarella* z Beskydského podhůří uvedena. Dnes na Jahodné neroste a pravděpodobně zde ani nemá vhodné podmínky (Hlisenkovský in HADINEC & LUSTYK 2007).

***Polygala comosa*. D. Lištná:** travinná vegetace na vých. a sev. svahu kóty 403 sev. od obce (DL3); křovinaté porosty a travnaté lemy v záp. části vápenného vrchu Jahodná (mezi sv. cípem Trince a potůčkem s tokem k jihu ze středu obce (DL9); travnaté a křovinaté porosty vápencového hřebene Jahodná u cesty do Sosny (DL10); u D. Lištné (Holub in SLAVÍK 1997). **H. Lištná:** Holub in SLAVÍK (1997). **Vendryně:** vých. okraj borového lesa a přilehlé travinné porosty na již. svazích Vružné (kóta 532) u samoty 0,3 km již. od vrcholu (V2).

***Polygala multicaulis* (C3). Bystřice:** — Pastvina 1,7 km již. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2018 NK631). **Nýdek:** osada Střelma, 1,5 km zsz. od vrcholu M. Sošova (kóta 764; N11); pastviny u samoty Zakámen (1982 Sedláčková in Slavíkův archiv). Vzácně na pastvinách.

***Polygala vulgaris*. Nýdek:** osada Střelma, údolí prvního přítoku potoka Střelma 0,5 km vsv. od ústí (N13); hřebenové pastviny u státní hranice 1,5 km již. od vrcholu V. Čantoryje (kóta 995; N21); les podél červeně značené turistické cesty 0,9 km zsz. od vrcholu V. Čantoryje (kóta 995), sev. od osady Zakámen (N22). — Trávník u cesty pod M. Sošovem 1,3 km sz. od vrcholu M. Sošova (2014 NK398); louka 780 m jz. od vrcholu V. Čantoryje (2014!). **Vendryně:** — Louka na psím hřbitově 440 m záp. od vrcholu Žďáru (2014 NK602).

Vzácně na krátkostébelných loukách a v trávnících podél cest.

***Polygonatum multiflorum*. Bystřice:** 2009 Chytil in NDOP. — 2014. **D. Lištná:** Vicherek ZATLOUKAL (1969), DL1, DL6, DL7, DL18, DL19, DL20, DL21, DL25. — 2014. **H. Lištná:** HL3. — 2014!. **Nýdek:** N28, N31, N32. — 2014 NK508. **Vendryně:** V22, V23. — 2012 NK228.

Hojně v listnatých lesích a podél lesních potoků.

***Polygonatum odoratum*. D. Lištná:** Jahodná (1990 Páleníková in NDOP).

Údaj je pravděpodobně mylný. Výskyt tohoto druhu není ze studovaného území doložen (srov. Šída in ŠTĚPÁNKOVÁ 2010).

***Polygonatum verticillatum*. Bystřice:** 2002 Holuša in NDOP. **Nýdek:** KOLBENHEYER (1862), ZATLOUKAL (1969), N10, N28. — 2014 NK503; břehový porost v lese podél horského potoka 1,4 km jv. od Ostrého vrchu (2018). **Vendryně:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969). — 2012!.

Roztroušeně ve stinných lesích a podél lesních potoků.

***Polygonum aviculare* agg. Bystřice:** B24. — 2014 NK581. **Nýdek:** N44. **Vendryně:** V9. — 2013!.

Hojně podél cest, na cestách a narušených místech.

***Polygonum rurivagum*. Vendryně:** 0,6 km sev. od kostela (V1).

***Polypodium vulgare*. Nýdek:** 1989 Hájková in NDOP. — Zakámen, les pod skálou u památníku J. Třanovského 1,8 km jz. od vrcholu V. Čantoryje (2014 NK429).

Vendryně: — Les na sz. svahu Ostrého vrchu 1,3 km sv. od vápenných pecí (2013!).

Vzácně ve světlých lesích na skalkách a sutích.

***Polystichum aculeatum* (C4a). Nýdek:** Čantoryje (ZATLOUKAL 1969); údolí Hlučové, vrstevnicová cesta jz. svahem (N31); rezervace Čantoria (N39, N41). — Zakámen, les pod skálou u památníku J. Třanovského 1,8 km jz. od vrcholu V. Čantoryje (2014 NK430). **Vendryně:** Babí hora, bučina na sv. svahu (Vicherek sec.

ZATLOUKAL 1969). — Břehový porost potoka Vápenka 100 m vých. od vápenných pecí (2012 NK159, rev. L. Ekrt).

Roztroušen v lesích ve vyšších polohách. Ekrt (in PLADIAS 5) uvádí ze studovaného území větší počet herbářových dokladů.

***Polystichum braunii* (C2).** Nýdek: Um Ustroně zahlreich an der kl. und gr. Czantory (1825 Wimmer sec. FIEK 1881; ZATLOUKAL 1969); v údolí mezi Střelmou a Janulou; střední část toku Hlučové (ZATLOUKAL 1969); Zakámen (2005 Popelářová in Excerpt pro atlas). Vendryně: vých. svahy vrchu Žďár (2007 Hutýrová in NDOP).

Na V. Čantoryji je výskyt bohatě doložen (srov. Ekrt in PLADIAS 5). Naopak identita rostlin z druhé lokality vyžaduje ověření.

***Polystichum lonchitis* (C2).** Nýdek: 1988 Sedláčková in NDOP.

Ekrt (srov. PLADIAS 5) považuje údaj za mylný. Druh se nevyskytuje ani nikde jinde v bližším okolí.

***Polystichum setiferum*.** Nýdek: V. Čantoryje u Ustroně (Milde sec. FIEK 1881 jako *Aspidium lobatum* b. *swartzianum*).

Ekrt (in. PLADIAS 5) považuje údaj za správný. Výskyt, pokud byl na české straně, pravděpodobně zanikl.

***Polystichum ×luerssenii* (*P. aculeatum* × *P. braunii*).** Nýdek: V. Čantoryje (Fiek sec. SCHUBE 1903–1904); sv. svahy Mionší (kóta 744,7 m; Kudělová 1996 BRNU sec. PLADIAS 5, N33 jako *P. aculeatum*). Kolibiska, levostranná erozní rýha již. od hájenky Stožek (Sedláčková 1999 NJM sec. PLADIAS 5); NPR Čantoria, acidofilní bučina, suť (Popelářová 2005 herb. M. Popelářová sec. PLADIAS 5).

***Populus alba*.** Bystřice: 2004 Hustáková in NDOP. D. Lištná: — Odkaliště 670 m sv. od vrcholu Jahodné (2014 NK459); u cesty na Sosnu v lese 400 m jv. od nemocnice Trinec (2014). Vendryně: 2004 Hustáková in NDOP.

Vzácně na narušených místech a podél cest.

***Populus balsamifera* (nat neo).** D. Lištná: odkaliště (2014 Ladányi in litt). — Západní část odkaliště u cesty 570 m sev. od vrchu Jahodné (2018 NK632).

Vzácně. Zaznamenán jen na odkališti.

***Populus nigra* agg.** D. Lištná: odkaliště (DL28). — Křoviny u vodní plochy na odkališti 860 m sv. od vrcholu Jahodné (2014 NK461).

Náletový jedinec, pravděpodobně kříženec pěstovaných topolů s účastí okrasné *P. nigra* 'Italica'.

***Populus tremula*.** Bystřice: 2004 Hustáková in NDOP. — 2014. D. Lištná: DL28. — 2014. Nýdek: N21. — 2014. Vendryně: V25. — 2012.

Roztroušeně podél cest a lesních okrajů.

***Potamogeton berchtoldii*.** H. Lištná: Kaplan in ŠTĚPÁNKOVÁ (2010).

***Potamogeton natans*.** H. Lištná: Kaplan in ŠTĚPÁNKOVÁ (2010).

***Potamogeton pectinatus*.** H. Lištná: Kaplan in ŠTĚPÁNKOVÁ (2010).

***Potamogeton pusillus*.** D. Lištná: vodní odkaliště (DL28).

Údaj vyžaduje ověření. Může jít o mylně určené rostliny druhu *P. berchtoldii*.

***Potentilla anserina*.** Bystřice: B22. — 2014. D. Lištná: DL2, DL28. — 2014. H. Lištná: HL5, HL6. — 2014. Nýdek: N9, N19. Vendryně: V9. — 2012!.

Hojně na loukách, pastvinách a v travnatých lemech podél cest.

***Potentilla erecta*.** Bystřice: — 2014. H. Lištná: HL6. Nýdek: ZATLOUKAL (1969), N7, N12, N22. — 2013!, 2014. Vendryně: — 2012!, 2014.

Hojně na loukách, pastvinách a v travnatých lemech podél lesních cest.

- Potentilla norvegica.** D. Lištná: levý břeh Lištnice (Sedláčková 1978 NJM sec. Slavíkův archiv).
- Potentilla reptans.** Bystřice: B1. — 2014!. D. Lištná: DL3, DL4, DL28. — 2014. H. Lištná: HL5. Nýdek: N9, N11, N19. — 2014. Vendryně: — 2012 NK229.
Hojně na loukách, pastvinách a v travnatých lemech podél cest.
- Potentilla tabernaemontani.** Nýdek: na hlinitém náspu cesty v údolí Střelmy (ZATLOUKAL 1969).
Vzhledem k ojedinělosti údaje vyžaduje výskyt ověření.
- Prenanthes purpurea.** Bystřice: B19, B20. — 2014. Nýdek: KOLBENHEYER (1862), ZATLOUKAL (1969), N14, N15, N21, N28, N29, N30, N31, N32, N34, N43. — 2014. Vendryně: V22. — 2012 NK158.
Hojně podél lesních cest, v lesních světlínách a lemech.
- Primula elatior.** Bystřice: B9. D. Lištná: DL3, DL6, DL18, DL19, DL20, DL21, DL23. — 2014. H. Lištná: HL2, HL6. — 2014 NK312. Nýdek: N5, N10, N12. — 2014. Vendryně: V23. — 2012!, 2014 NK605.
Hojně na loukách, ve světlých lesních okrajích. Populace tohoto druhu se v území rychle zmenšují.
- Primula veris** (C4a). D. Lištná: (1990 Páleníková in NDOP; 1966, 1975 Satora in DLT). Nýdek: posečená louka či pastvina na vých. svahu Vrchhory (aff., 2012 Višňák in NDOP).
Na lokalitě, kterou uvádí Višňák, ani jinde v okolí jsem druh *Primula veris* nenašla. V poznámce k nálezu Višňák dokonce připouští, že mohlo jít o *P. elatior*, který se v oblasti i na uvedeném místě hojně nachází. Naopak *P. veris* ve studovaném území přirozeně neroste (Hlisenkovský in litt.).
- Primula vulgaris subsp. vulgaris** (nat neo). Nýdek: — Příkopy a zahrady rodinných domů 500 m jz. od dřevěného kostela v Nýdku (2018!).
Zplanělá ze zahrádek.
- Prunella grandiflora** (C3). Vendryně: 2004 Hustáková in NDOP.
Jedná se o mylné určení druhu *Prunella vulgaris* (Hustáková in litt.).
- Prunella vulgaris.** Bystřice: — 2014. D. Lištná: DL3, DL4. H. Lištná: HL4, HL5, HL6. — 2014 NK546. Nýdek: N9, N12. — 2014. Vendryně: V8. — 2012 NK171.
Hojně podél cest, na okrajích luk a náplavech vodních toků.
- Prunus avium.** Bystřice: — 2014 NK396. D. Lištná: DL1. H. Lištná: 1990 Páleníková in NDOP. Nýdek: N16. Vendryně: V25. — 2012 NK168.
Roztroušeně v lesních okrajích.
- Prunus padus.** Bystřice: B3, B8, B9, B10, 2009 Chytil in NDOP. — 2014!. D. Lištná: DL21. — 2014!. H. Lištná: — 2014!. Nýdek: N8, N26. — 2014 NK535. Vendryně: ZATLOUKAL (1969). — 2012 NK170, 2013 NK272.
Roztroušeně v lesních okrajích a podél vodních toků
- Prunus serotina** (inv neo). H. Lištná: — Okraj Horního lesa 680 m záp. od hraničního přechodu H. Lištná (2014!). Vendryně: — Zaolší, smrkový les 2,5 km jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2012!).
Roztroušeně v lesních okrajích, původně z výsadeb.
- Prunus spinosa.** Bystřice: 2003 Hustáková in NDOP. D. Lištná: Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969), DL1. H. Lištná: — Křovina na sz. svahu Vružné 200 m ssz. od vrcholu (2013). Nýdek: 2003 Hustáková in NDOP. Vendryně: Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969). — 2012.
Roztroušeně v lesních okrajích a na mezích.

- Pteridium aquilinum*.** Bystřice: 2002 Holuša in NDOP. — 2014!. **Nýdek:** N5, N10, N22. — 2014. **Vendryně:** 2003 Wolfová in NDOP. — 2012 NK161 (rev. L. Ekrt).
Roztroušeně v lesních lemech a podél lesních cest.
- Puccinellia distans*** (C1, aut). **Bystřice:** jv. okraj obce, u žel. přejezdu poblíž hnojiště asi 1 km jjv. od kostela (B21).
- Pulmonaria obscura*.** **Bystřice:** 2009 Chytil in NDOP. — 2014!. **D. Lištná:** DL1, DL6. — 2014 NK313, 2014 NK314. **H. Lištná:** — 2014!. **Nýdek:** N27. **Vendryně:** Zatloukal & Vicherek ZATLOUKAL (1969), V25. — 2012!.
Roztroušeně v lesích a podél vodních toků. Výskyt ve studovaném území je bohatě doložen (srov. JAROŠOVÁ 2006).
- Pulmonaria officinalis*.** **D. Lištná:** 1995 Holuša in DTL, DL19, DL20, DL21. **Nýdek:** v bučině v údolí Hluchové (ZATLOUKAL 1969).
Výskyt druhu *P. officinalis* není ve studovaném území doložen (srov. JAROŠOVÁ 2006). Pravděpodobně se jedná o záměnu s plicníkem *P. obscura* nebo o zplanělé kulturní klony, někdy pěstované pod jménem *P. saccharata* (Hlisnikovský in litt.).
- Pulsatilla vulgaris*** (cas neo). **Vendryně:** na kopci Žďár (Kotschy sec. KOLBENHEYER 1862).
Údaj je nejspíš mylný (dobový determinační nebo jiný omyl), případně šlo o přechodně zplanělé rostliny.
- Pyrethrum parthenium*** (nat ar). **Bystřice:** — U lesní cesty 1,5 km sv. od žel. stanice Hrádek (2014 NK564). **D. Lištná:** vsv. část města při silnici do Vendryně přes Sosnu, mezi údolím Olše a pravostranným přítokem (DL15). **Nýdek:** silniční násep na jz. od úpatí V. Čantoryje (ZATLOUKAL 1969); osada Střelma, 1,5 km sz. od vrcholu M. Sošova (kóta 764; N11); osada Zakámen, 2,4 km svv. od sv. okraje Nýdku (N16). **Vendryně:** — Louka sz. od psiho hřbitova 650 m záp. od vrcholu Žďáru (2014 NK473).
Vzácně podél cest, na okrajích luk a narušených místech.
- Pyrola minor*** (C3). **D. Lištná:** — Zarostlé schodovité stupně na odkališti 600 m sz. od vodní plochy (2018!). **Bystřice:** V Pasekách, asi 0,5 km sv. Loučky (kóta 835 m; B14). **Nýdek:** — Les pod M. Sošovem 600 m jz. od vrcholu M. Sošova (2014 NK390).
Vzácně v lesích.
- Pyrola rotundifolia*** (C2). **D. Lištná:** — Odkaliště 600 m ssv. od vrcholu Jahodné (2014!, ověřeno 2018). **Nýdek:** v jehličnatém lese na úpatí V. Sošova (ZATLOUKAL 1969).
Vzácně, recentně zaznamenána pouze na odkališti. Výskyt hruštičky okrouhlohlité byl na odkališti potvrzen i během floristického minikurzu (TKÁČIKOVÁ in prep.)
- Quercus petraea*.** **D. Lištná:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), DL1. **H. Lištná:** HL2. — 2014.
Vzácně v lesích.
- Quercus robur*.** **Bystřice:** — 2014. **D. Lištná:** DL8, DL19, DL20. **H. Lištná:** — 2014!. **Nýdek:** N2. — 2014 NK497. **Vendryně:** V25. — 2012!.
Roztroušeně v lesích, na lesních okrajích nebo podél cest.
- Quercus rubra*** (inv neo). **Bystřice:** les na záp. svahu Javorového 950 m jz. od vrcholu Polední (2012 Višňák in NDOP). — Na Pasekách, okraj lesa 2 km již. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014!); les podél potoka 1,4 km sz. od vrcholu Polední (2014). **Vendryně:** les na jižním svahu Vavřkovy hory (2012 Višňák in NDOP).
Vzácně v lesích a lesních okrajích.

- Radiola linoides* (C1).** Bystřice: Kotschy sec. FIEK (1881); Dvořák 1935 ZMT sec. PLADIAS 2.
Hrouda (in SLAVÍK 1997) údaj ignoruje. Jestliže je údaj správný, jde o dávno zaniklý výskyt.
- Ranunculus acris*.** Bystřice: 2004 Hustáková in NDOP. — 2014!. **D. Lištná:** DL3, DL4. — 2014 NK404. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. **Nýdek:** N9, N11, N12, N15. — 2014. **Vendryně:** V25. — 2012!.
Hojně na loukách a pastvinách.
- Ranunculus arvensis* (C2, nat ar).** **H. Lištná:** na okraji polní cesty (Kilián 1955 OSM sec. CIMALOVÁ 2006; KILIÁN 1960). **Vendryně:** 0,6 km sev. od kostela (V1); 0,4 km sv. nádraží, pole, 355 m; Zaošší, mezi MŠ a Domem PZKO, pole, 380 m (Kudělová 1995 FMM, CESK sec. CIMALOVÁ 2006).
- Ranunculus flammula*.** Bystřice: — 2014 NK496. **H. Lištná:** HL6. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N1, N13, N45. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969). — 2012 NK177.
Roztroušeně na vlhkých loukách a v mělkých stojatých vodách v příkopech nebo lesích.
- Ranunculus lanuginosus*.** Bystřice: B3, B4, B5, B6, B8, B9, B10, — 2014 NK406. **D. Lištná:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), DL6, DL7, DL16, DL18, DL19, DL20, DL21, DL22, DL24, DL25. **H. Lištná:** HL3. **Nýdek:** N10, N25, N26, N27. — 2014. **Vendryně:** Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969), V5, V12, V14, V23. — 2012!.
Roztroušeně na vlhkých loukách, podél cest a na světlých a vlhkých místech v lesích.
- Ranunculus lingua* (C1).** Bystřice: — Jezírko u rodinného domu č. p. 223, 1,5 km jv. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014 NK483). **Vendryně:** 2004 Hustáková in NDOP.
Jelikož se jedná o zahradní jezírko v Bystřici, je pravděpodobné, že sem byl pryskyřík velký zavlečen se zahradnickým substrátem nebo sazenicemi jiných rostlin. Podle sdělení majitele nebyl do jezírka záměrně vysazen. Údaj z Vendryně je determinační omyl (Hustáková in litt.).
- Ranunculus nemorosus*.** Bystřice: louky a pastviny podél potoka Žabinec (2012 Višňák in NDOP). **D. Lištná:** louka na Jahodné 360 m sv. od vrcholu Jahodná (2012 Višňák in NDOP). **Nýdek:** pastviny již. od Ostrého vrchu (2012 Višňák in NDOP).
Prostorově značně izolované nálezy. Je dosti pravděpodobné, že jde o determinační omyl; údaje se mohou vztahovat k druhu *R. polyanthemos*.
- Ranunculus platanifolius* (C4a).** **Nýdek:** Čantoryje (KOLBENHEYER 1862; Kotschy sec. FIEK 1881; ZATLOUKAL 1969); v pobřežních křovinách potoku Hluchová (KILIÁN 1960); NPR Čantoria (1989 Hájková in NDOP). **Vendryně:** v pobřežních křovinách potoku Kopytná (KILIÁN 1960).
- Ranunculus polyanthemos*.** **D. Lištná:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), DL3, DL4, DL9. **H. Lištná:** HL4, HL5. **Vendryně:** — Louka na psím hřbitově 440 m záp. od vrcholu Žďáru (2014 NK556).
Roztroušeně na loukách.
- Ranunculus repens*.** Bystřice: 2002 Holuša in NDOP. — 2014!. **D. Lištná:** DL4, DL7. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. — 2014. **Nýdek:** N10, N12, N21. — 2014 NK405. **Vendryně:** V1. — 2012!.
Hojně na loukách a v příkopech.

- Ranunculus sceleratus***. **Bystřice:** — Rybník na zahradě rodinného domu č. p. 691, 1,6 km jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2018!). **D. Lištná:** odkaliště (DL28).
Vzácně v mělkých stojatých vodách nebo na březích rybníků
- Raphanus raphanistrum*** (nat ar). **Bystřice:** — 2014!. **D. Lištná:** DL2. **H. Lištná:** HL5. **Nýdek:** N44. **Vendryně:** — 2012!.
Roztroušeně na polích, říčních náplavech a ojediněle na loukách.
- Reseda lutea*** (nat ar). **D. Lištná:** kóta 350 v opuštěném kamenolomu (ZATLOUKAL 1969); odkaliště (DL28). **Vendryně:** — U žel. trati 200 m jv. od žel. stanice Vendryně (2012!).
Roztroušeně na železničních náspech.
- Reynoutria japonica*** (inv neo). **Bystřice:** B11. — 2014 NK615. **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969). **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969). **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969). — 2012.
Hojně podél řeky Olše, roztroušeně podél dalších vodních toků, na stráních a podél cest.
- Reynoutria sachalinensis*** (inv neo). **Bystřice:** 2004 Hustáková in NDOP. **Nýdek:** N9, N25. **Vendryně:** V8.
- Rhinanthus alectorolophus*** (C3). **Vendryně:** louka na Vružné (ZATLOUKAL 1969).
- Rhinanthus major***. **Bystřice:** — Louka na jz. svahu kopce Loučka 3,75 km jjv. od dřevěného kostela v Nýdku (2013!). **D. Lištná:** DL3, DL4. **H. Lištná:** HL1, HL4, HL5, HL6.
Vzácně na loukách.
- Rhinanthus minor***. **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), DL3, DL4, DL10. — 2014 NK403. **H. Lištná:** HL4, HL6. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N10, N11, N16. — 2014 NK402. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969).
Roztroušeně na loukách.
- Rhus hirta*** (nat neo). **Bystřice:** ve svahu nad bezejmenným hraničním potokem Bystřice a Vendryně (Višňák in NDOP). **D. Lištná:** — Okraj lesa 1,3 km sv. od žel. stanice Třinec (2014 NK586).
Vzácně na okrajích lesů.
- Ribes alpinum*** (C4a). **Nýdek:** bučina na V. Čantoryji (ZATLOUKAL 1969).
- Ribes uva-crispa***. **Bystřice:** — Les u bezejmenného potoka 1,6 km jv. od žel. stanice (2014!). **Nýdek:** V. Čantoryje (Uechtritz sec. FIEK 1881). **Vendryně:** Vružná, Babí hora (ZATLOUKAL 1969).
Vzácně na okrajích lesů.
- Robinia pseudacacia*** (inv neo). **Bystřice:** — 2014. **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969). **Nýdek:** N5. **Vendryně:** V5. — 2012!.
Roztroušeně na okrajích lesů.
- Rorippa austriaca***. **Nýdek:** podél silnice v obci 0,5 km ssv. od kostela (N9).
- Rorippa palustris***. **D. Lištná:** vsv. část města při silnici do Vendryně přes Sosnu, mezi údolím Olše a pravostranným přítokem (DL15); odkaliště (DL28). **Nýdek:** vlhké svahové louky sev. od odbočky silnice na V. Čantoryji (N10).
- Rorippa sylvestris***. **Bystřice:** — Náplavy řeky Olše 700 m jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014 NK573). **Nýdek:** osada Střelma, údolí potoka Střelma podél zeleně značené turistické cesty (N12). **Vendryně:** podél Kopytné (V25). — Zaolší, u lesní cesty 2,6 km jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2013 NK274).
Roztroušeně na náplavech vodních toků a podél cest.
- Rorippa ×armoracioides*** (*R. austriaca* × *R. sylvestris*). **Vendryně:** — U cesty nedaleko evangelického hřbitova 500 m jz. od kostela (2012 NK178).

- Rosa canina.** Bystřice: 2002 Holuša in NDOP. **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), DL9. — 2014!. **H. Lištná:** ZATLOUKAL (1969). **Nýdek:** — 2014!. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969).
Roztroušeně podél cest, lesních okrajů a na stráních.
- Rosa dumalis subsp. subcanina.** Nýdek: hřebenové pastviny u státní hranice 1,5 km již. od vrcholu V. Čantoryje (kóta 995; N21).
- Rosa pendulina.** Nýdek: Čantoryje (KOLBENHEYER 1862; Kotschy sec. FIEK 1881); Góra, lesní okraje a pastviny 1 km záp. od autobusové zastávky (N5). **Vendryně:** Vendryně (SCHUBE 1903–1904).
- Rubus angustipaniculatus.** Bystřice: osada V pasekách, okraj silnice a lesní cesty 2,5 km zsz. od vrcholu Loučky (835 m; Vašut 2000 OL sec. PLADIAS 7). **D. Lištná:** okraj lesa 1 km jv. obce u lyžařského vleku 2,3 km vjv. od nádraží v Trinci (Trávníček 1989 OL sec. PLADIAS 7); turist. cesta k rozcestí Pod Jahodnou, vých. od města (Holub 1992 PRA sec. PLADIAS 7); vrch Jahodná (407 m), okraj lesa při parkovišti u nemocnice (Vašut 2000 OL sec. PLADIAS 7).
- Rubus bifrons.** Nýdek: osada Kouty, okraj silničky 2,5 km zjz. od vrcholu V. Čantoryje (995 m; Vašut 2000 OL sec. PLADIAS 7); osada Hluchová, okraj lesa a pastviny, 1,8–2,5 km s. od vrcholu Loučky (835 m; 2000 Vašut in. PLADIAS 7).
- Rubus caesius.** Bystřice: B8, B11; osada V pasekách, okraj silnice a lesní cesty 2,5 km zsz. od vrcholu Loučky (835 m; 2000 Vašut in. PLADIAS 7). — 2014. **D. Lištná:** DL1, DL15. — 2014. **H. Lištná:** ZATLOUKAL (1969). **Nýdek:** N28, N34. **Vendryně:** V25; Babí hora (492 m), okraj silničky na úpatí a již. svahu kopce 0,7 km jjv. od vrcholu (2000 Vašut in. PLADIAS 7). — 2012!.
Roztroušeně v lesích.
- Rubus dollnensis.** **D. Lištná:** okraj lesa 1 km jv. obce, u lyžařského vleku 2,3 km vjv. od nádraží v Trinci (Trávníček 1989 OL sec. PLADIAS 7); turist. cesta k rozcestí Pod Jahodnou, vých. od města (Holub 1992 PRA sec. PLADIAS 7; srov. Holub in SLAVÍK 1995); vrch Jahodná (407 m), okraj lesa při parkovišti u nemocnice (Vašut 2000 OL sec. PLADIAS 7).
- Rubus gliviciensis** (C4a). **D. Lištná:** turist. cesta k rozcestí Pod Jahodnou, vých. od města (Holub 1992 PRA sec. PLADIAS 7); rezervace Jahodná vých. od města (1995 Trávníček sec. PLADIAS 7). **Nýdek:** vrch V. Čantoryje – Beskydské sedlo, na státní hranici (Holub 1982 PRA sec. PLADIAS 7); osada Hluchová, okraj lesa a pastviny, 1,8–2,5 km sev. od vrcholu Loučky (835 m; 2000 Vašut in. PLADIAS 7).
- Rubus gracilis.** Bystřice: okraj silnice a lesní cesty mezi osadami Košariska a Na Pasekách 4 km vsv. od vrcholu Ostrého (1044; Vašut 2000 OL sec. PLADIAS 7). Údaj se vztahuje pravděpodobně k Hrádku v těsné blízkosti obce Bystřice.
- Rubus idaeus.** Bystřice: B17. — 2014!. **D. Lištná:** DL27. **Nýdek:** N10, N11, N12, N21, N35, N36, N39, N41, N42. — 2014. **Vendryně:** V25; okraj silničky na úpatí a již. svahu kopce 0,7 km jjv. od vrcholu (2000 Vašut in. PLADIAS 7). — 2012!.
Roztroušeně v lesích.
- Rubus kuleszae.** **D. Lištná:** u les. cesty pod rezervací Jahodná 0,8 km záp. od vrchu Babí hora (492 m; Trávníček 1992 OL sec. PLADIAS 7).
- Rubus macromontanus.** Vendryně: okraj silničky na úpatí a již. svahu kopce 0,7 km jjv. od vrcholu (Vašut 2000 OL sec. PLADIAS 7; jako *R. montanus*).
- Rubus montanus.** **D. Lištná:** k rozcestí Pod Jahodnou od hájovny Sosna (u nemocnice), za lomem vých. od Trince (Holub 1992 PRA sec. PLADIAS 7); rezervace Jahodná vých. od města (Trávníček 1995 OL sec. PLADIAS 7; vše jako *R. flos-amygdalae*).

Rubus nessensis. **D. Lištná:** v lese 1 km již. od obce u červeně značené turistické cesty (Trávníček 1989 OL sec. PLADIAS 7). **Nýdek:** osada Kouty, okraj silničky 2,5 km zjz. od vrcholu Velké Čantoryje (995 m; Vašut 2000 OL sec. PLADIAS 7).

Rubus orthostachys. **Bystřice:** křoviny na pravém břehu Olše 0,7 km zsz. od nádraží (Trávníček 1993 OL sec. PLADIAS 7). **D. Lištná:** vrch Jahodná (407 m), okraj lesa při parkovišti u nemocnice (Vašut 2000 OL sec. PLADIAS 7). **Nýdek:** osada Kouty, okraj silničky 2,5 km zjz. od vrcholu V. Čantoryje (995 m; Vašut 2000 OL sec. PLADIAS 7). **Vendryně:** okraj silničky v závěru údolí 1,5 km zsz. od vrcholu Ostrého; Babí hora (492 m), okraj silničky na úpatí a již. svahu kopce 0,7 km jjv. od vrcholu (709 m; Vašut 2000 OL sec. PLADIAS 7).

Rubus pericrispatus. **Vendryně:** okraj silničky v závěru údolí 1,5 km zsz. od vrcholu Ostrého (709 m; Vašut 2000 OL sec. PLADIAS 7).

Rubus plicatus. **Bystřice:** u les. cesty na jz. úbočí vrchu Polední (676 m) 2,7 km vsv. od nádraží (Trávníček 1986 OL sec. PLADIAS 7); osada V Pasekách, okraj silnice a lesní cesty 2,5 km zsz. od vrcholu Loučky (835 m; 2000 Vašut in. PLADIAS 7). **Nýdek:** osada Kouty, okraj silničky 2,5 km zjz. od vrcholu V. Čantoryje (995 m; Vašut 2000 OL sec. PLADIAS 7); osada Hluchová, okraj lesa a pastviny, 1,8–2,5 km s. od vrcholu Loučky (835 m; 2000 Vašut in. PLADIAS 7).

Rubus ser. Glandulosi. **Bystřice:** u les. cesty na jz. úbočí vrchu Polední (676 m) 2,7 km vsv. od nádraží (Trávníček 1986 OL sec. PLADIAS 7); osada V Pasekách, okraj silnice a lesní cesty 2,5 km zsz. od vrcholu Loučky (2000 Vašut in. PLADIAS 7); 2002 Holuša in NDOP. **D. Lištná:** vrch Jahodná (407 m), okraj lesa při parkovišti u nemocnice (2000 Vašut in. PLADIAS 7). **Nýdek:** vrch V. Čantoryje – Beskydské sedlo, na státní hranici (Holub 1982 PRA sec. PLADIAS 7); Kolibiska, bývalá pastvina v údolí Hluchová 2 km sz. od vrcholu V. Stožku (978 m); osada Kouty, okraj silničky 2,5 km zjz. od vrcholu V. Čantoryje (995 m; 2000 Vašut in. PLADIAS 7); 2002 Holuša in NDOP. **Vendryně:** okraj silničky na úpatí a již. svahu kopce 0,7 km jjv. od vrcholu (2000 Vašut in. PLADIAS 7).

Rubus sulcatus. **Bystřice:** okraj silnice a lesní cesty mezi osadami Košariska a Na Pasekách 4 km vsv. od vrcholu Ostrého (1044; Vašut 2000 OL sec. PLADIAS 7).

Údaj se pravděpodobně vztahuje k Hrádku v těsné blízkosti Bystřice.

Rubus wimmerianus. **Bystřice:** osada V Pasekách, okraj silnice a lesní cesty 2,5 km zsz. od vrcholu Loučky (835 m; 2000 Vašut in. PLADIAS 7). **D. Lištná:** okraj lesa 1 km jv. obce u lyžařského vleku 2,3 km vjv. od nádraží v Třinci; v lese 1 km již. od obce u červeně značené turistické cesty; křoviny v okolí lomu u D. Lištné 2 km vsv. – vých. nádraží (Trávníček 1989 OL sec. PLADIAS 7); **Nýdek:** sv. od obce, směr V. Čantoryje (Holub 1982 PRA sec. PLADIAS 7); osada Kouty, okraj silničky 2,5 km zjz. od vrcholu V. Čantoryje (995 m); okraj lesa a pastviny, 1,8–2,5 km s. od vrcholu Loučky (835 m; 2000 Vašut in. PLADIAS 7).

Rudbeckia laciniata (inv neo). **Bystřice:** — Mezi cestou a řekou Olší 930 m jv. od vrcholu Prašivé hory (2014 NK423). **D. Lištná:** DL15. **H. Lištná:** HL5. **Nýdek:** N24. **Vendryně:** V7. — Podél cesty na Černovském 510 m jjv. od žel. stanice Vendryně (2014).

Vzácně podél řek nebo v příkopech podél cest.

Rumex acetosa. **Bystřice:** — 2014 NK408. **D. Lištná:** DL4. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. **Nýdek:** N9. — 2014!. **Vendryně:** V1. — 2012 NK176, 2014. Roztroušeně na loukách a v travnatých lemech podél cest.

- Rumex acetosella.** Bystřice: 2002 Holuša in NDOP. **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969). **H. Lištná:** HL4. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N1, N13, N21. — 2014 NK407, 2014 NK441. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969).
Vzácně podél lesních cest.
- Rumex alpinus** (inv neo). **Nýdek:** Čantoryje (Žlik sec. KOLBENHEYER 1862; OTRUBA 1926; Kilián OP sec. ZATLOUKAL 1969); osada Střelma u Nýdku (Kubát in HEJNÝ & SLAVÍK 1990); osada Střelma, údolí prvního přítoku potoka Střelma 0,5 km vsv. od ústí (N13).
- Rumex arifolius.** **Nýdek:** vlhké svahové louky sev. od odbočky silnice na V. Čantoryji (N10).
- Rumex conglomeratus.** **D. Lištná:** vsv. část města při silnici do Vendryně přes Sosnu, mezi údolím Olše a pravostranným přítokem (DL15). **H. Lištná:** v pobřežních křovinách (ZATLOUKAL 1969). **Nýdek:** vápenný pahorek 0,7 km sv. od obce (N19). **Vendryně:** louky a údolní svahy podél potoka již. od odbočky silnice do Trince (V8); u potoka 1,5 km vsv. od Babí hory (kóta 492; V12).
- Rumex crispus.** Bystřice: ZATLOUKAL (1969). **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), DL4. **H. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), HL4, HL5, HL6. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969). **Vendryně:** V1. — 2012!.
Roztroušeně na loukách.
- Rumex obtusifolius.** Bystřice: B24. — 2014. **D. Lištná:** DL4, DL15. **H. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), HL4, HL6. **Nýdek:** N12. — 2013!, 2014. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969), V8. — 2012 NK175 (rev. T. Miháliková).
Hojně na loukách, podél cest a na náplavech.
- Rumex sanguineus.** **D. Lištná:** osada Sosna, jv. exponovaný les podél červeně značené turistické lesní cesty 1 km sv.–vsv. od osady (DL7); sz. okraj lesa u vsv. okraje města (DL14). — Okraj lesní cesty 500 m jv. od vrcholu Jahodná (2018, TKÁČIKOVÁ in prep.). **Vendryně:** podél Kopytné (V24).
Vzácně na okrajích lesních cest.
- Sagina procumbens.** **H. Lištná:** vlhký příkop podél polní cesty při státní hranici směr Kojkovice 0,5 km sv. od obce (HL6). **Nýdek:** na lesní cestě v údolí potoka Střelma (KILIÁN 1960); V. Čantoryje (ZATLOUKAL 1969); osada Střelma, údolí potoka Střelma podél zeleně značené turistické cesty (N12).
- Sagina subulata** (A2). **Nýdek:** Nýdek u Bystřice (Žlik sec. KOLBENHEYER 1862; OTRUBA 1926).
Sutorý (in HEJNÝ & SLAVÍK 1990) údaj necituje. Pokud je tento starý údaj správný, jde jistě o dávno zaniklý výskyt.
- Salix alba.** Bystřice: B3, B4, B5, B6, B7. — 2014!. **D. Lištná:** DL28. — 2014!. **Nýdek:** — 2014!. **Vendryně:** V25. — 2013 NK278.
Hojně na náplavech a březích vodních toků.
- Salix aurita.** **D. Lištná:** — Okolo vodní plochy na odkališti 50 m sev. od vodní plochy (2018!). **Nýdek:** 2003 Hustáková in NDOP. — 2014 NK449.
Roztroušeně na okrajích lesů a vlhkých loukách.
- Salix caprea.** Bystřice: 2004 Hustáková in NDOP. — 2013 NK279, 2014!. **D. Lištná:** DL28. — 2014!. **Nýdek:** N2. — 2014 NK412. **Vendryně:** V25. — 2012!.
Hojně na okrajích lesů a březích vodních toků.
- Salix cinerea.** Bystřice: — 2013!. **D. Lištná:** — 2014 NK515. **Nýdek:** N13.
Roztroušeně v pobřežních křovinách a na podmáčených loukách.
- Salix daphnoides** (C2; aut). Bystřice: pravý břeh Olše, šterkový náplav, záp. od železničního nádraží Bystřice nad Olší; v obci za žel. tratí, 450 m od železničního

nádraží po trati směrem na Hrádek ve Slezsku (Stanovská 2010 OL sec. BARTOVÁ & VAŠUT 2011); říční náplav Kopytné, asi 1 km od ústí Kopytné do Olše (Šigutová 2008 FMM ibidem). **Vendryně:** levý břeh Olše (šterkový náplav) 400 m jz. od žel. stanice Vendryně; levý břeh Olše před mostem u zelené turistické značky „Karpentná“ při ústí potoku Liderov do Olše; šterkový náplav říčky Kopytná, asi 200 m od mostu přes říčku Kopytnou spojující osady „Na Pasekách“ a „Zaolší“ (Stanovská 2010 OL ibidem).

Salix elaeagnos (C2; aut). **Bystřice:** Formánek sec. SCHUBE (1903–1904), OTRUBA (1926). — Břeh potoka Kopytná, 1,5 km jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014 NK529); náplavy řeky Olše 700 m jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014 NK530). **D. Lištná:** odkaliště (DL28). **Vendryně:** podél Kopytné (V25). — Břeh potoka Kopytná, 1,5 km jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014). Roztroušeně na náplavech a březích vodních toků.

Salix fragilis. **Bystřice:** B11. — 2014!. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N9. — 2014 NK539. **Vendryně:** V5. — 2012 (cf.), 2014!.

Hojně na náplavech a březích vodních toků a ploch.

Salix pentandra (C4a). **D. Lištná:** — Vlhká až bažinná izolovaná část na odkališti 610 m ssv. od vrcholu Jahodná (2018!).

Na odkališti nalezena D. Hlisnikovským v průběhu společné exkurze v červenci 2018.

Salix purpurea. **Bystřice:** 2004 Hustáková in NDOP. — 2014 NK527. **D. Lištná:** DL28. — 2014 NK526. **Nýdek:** N10, N13, N19. — 2014!. **Vendryně:** V5. — 2013!.

Hojně na náplavech, březích vodních toků a nádrží.

Salix rosmarinifolia (C3). **D. Lištná:** odkaliště, dosud nezarostlé okolí vodní plochy (2008 Chytil & Hlisnikovský in ND MSP ČBS).

Salix silesiaca (C4a). Pod Velkým Ostrým (1886 Schube in SCHUBE 1903–1904).

Salix viminalis. **D. Lištná:** odkaliště (DL28). **Vendryně:** podél Kopytné (V25). — Břeh potoka Kopytná 1,9 km jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2013!); remíz na louce u řeky Olše 610 m již. od nemocnice Třinec (2014 NK528).

Roztroušeně v pobřežních křovinách a podmáčených loukách.

Salix ×subcaprea (*S. caprea* × *S. silesiaca*). **Nýdek:** Čantoryje (Fiek sec. SCHUBE 1903–1904).

Salvia glutinosa. **Bystřice:** B11. — 2014. **D. Lištná:** KILIÁN & KILIÁN (1956), Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), DL1, DL3, DL7, DL14. — 2014. **H. Lištná:** HL2. **Nýdek:** Kotschy sec. KOLBENHEYER (1862), N29, N31. — 2014. **Vendryně:** Ascherson sec. FIEK (1881), KILIÁN & KILIÁN (1956), Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969), V8, V23. — 2012 NK183 (rev. J. Štěpánková).

Hojně v lesích a podél lesních cest.

Salvia pratensis. **D. Lištná:** KILIÁN (1960), Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), DL2, DL3, DL4, DL9, DL10. — Louka pod Jahodnou 703 m sv. od nemocnice Třinec (2013 NK276). **H. Lištná:** KILIÁN & KILIÁN (1956). **Vendryně:** KOLBENHEYER (1862), Uechtritz sec. FIEK (1881), KILIÁN (1960), Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969) a další autoři.

Vzácně na sušších loukách.

Salvia verticillata. **Bystřice:** B1. **D. Lištná:** KILIÁN & KILIÁN (1956), Zatloukal & Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), DL2, DL3, DL4, DL9, DL28. — 2014. **H. Lištná:** KILIÁN & KILIÁN (1956), ZATLOUKAL (1969), HL4, HL5. **Nýdek:** N19.

- Vendryně:** KILIÁN & KILIÁN (1956), Zatloukal & Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), V2, V8, V13. — 2012 NK184 (rev. J. Štěpánková).
Roztroušeně na loukách a narušených místech.
- Sambucus ebulus** (nat ar). **Bystřice:** ZATLOUKAL (1969). **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), DL28. — 2013. **Nýdek:** Sadebeck sec. FIEK (1881), ZATLOUKAL (1969). — 2013. **Vendryně:** V11. — 2014; vrcholová část Babí hory (2018).
Roztroušeně na okrajích lesa a v lesních průsecích.
- Sambucus nigra.** **Bystřice:** B3, B4, B5, B6, B7, B8, B11, B12, B15, B16. — 2014. **D. Lištná:** DL1, DL18, DL19, DL20, DL22, DL23, DL24, DL25. **Nýdek:** N9, N20, N26. — 2014. **Vendryně:** V8. — 2012!.
Hojně podél vodních toků, na mezích a okrajích lesů.
- Sambucus racemosa.** **Bystřice:** 2012 Holuša in NDOP. **Nýdek:** N3, N16. — 2014. **Vendryně:** KOLBENHEYER (1862), V17. — 2013!.
Roztroušeně na okrajích lesa a v lesních průsecích.
- Sanguisorba minor subsp. minor.** **Bystřice:** — 2014!. **D. Lištná:** DL3, DL4, DL11. — 2013 NK275. **H. Lištná:** HL5. **Nýdek:** N19. — Louka na vrcholu Vrchhory (2018). **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969), V2, V5, V11.
Vzácně na loukách a v lesních lemech.
- Sanguisorba officinalis.** **Bystřice:** 2004 Hustáková in NDOP. **Vendryně:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969).
- Sanicula europaea.** **Bystřice:** — 2014. **D. Lištná:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), DL1, DL7, DL9, DL19, DL24, DL25. — 2014 NK316. **H. Lištná:** HL2. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N27. **Vendryně:** Zatloukal 1968 BRNU, srov. Zatloukal & Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), V11, V22, V23. — 2012!.
Roztroušeně v listnatých lesích.
- Scirpus sylvaticus.** **Bystřice:** B22. — 2014!. **H. Lištná:** HL6. — 2014. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N46, N47. — 2014. **Vendryně:** V24. — 2012 NK198 (rev. Z. Kaplan), 2014!.
Hojně na vlhkých loukách, na březích vodních ploch a v příkopech.
- Scleranthus annuus.** **Bystřice:** — Navážka zeminy 190 m záp. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014 NK608); okraj pastviny 1,7 km již. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2018!). **H. Lištná:** vlhký příkop podél polní cesty při státní hranici směr Kojkovice 0,5 km sv. od obce (HL6). **Nýdek:** osada Střelma, údolí potoka Střelma podél zeleně značené turistické cesty (N12); hřebenové pastviny u státní hranice 1,5 km již. od vrcholu V. Čantoryje (kóta 995; N21). **Vendryně:** podél Kopytné (V24).
Vzácně na navážkách zeminy a na polích.
- Scrophularia nodosa.** **Bystřice:** — 2014. **D. Lištná:** DL1, DL28. — 2014. **Nýdek:** N9, N12, N16. — 2014, břehový porost v lese podél Horského potoka 1,4 km jv. od Ostrého vrchu (2018). **Vendryně:** V25. — 2012 NK185, 2014 NK560.
Hojně podél lesních cest a lesních okrajů.
- Scrophularia scopoli** (C3). **Bystřice:** pobřežní křoviny potoku Hluchová u Bystřice (KILIÁN 1960; Kilián 1957 OP sec. ZATLOUKAL 1969).
Roste i na polské straně hřebene. K tomuto výskytu se vztahuje údaj „um Ustroň in O. Lischna, am Tul“ (WIMMER 1841; viz též KOLBENHEYER 1862; FIEK 1881).
- Scrophularia vernalis** (C2; aut). **Nýdek:** V. Čantoryje (1965, 1976 Satora in DLT).
Údaj je velmi pravděpodobně mylný.
- Scutellaria galericulata.** **Bystřice:** — Břehy potoka Jatný 1,7 km jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2015). **Vendryně:** podél Kopytné (V25).
Vzácně na březích vodních toků.

- Securigera varia.** **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), DL3, DL4, DL28. — 2014. **H. Lištná:** HL4, HL5. **Vendryně:** Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969). — 2012 NK186.
Roztroušeně podél lesních okrajů, cest a na okrajích luk.
- Sedum acre.** **Nýdek:** — Okraj cesty nad potokem u náměstí 470 m sv. od dřevěného kostela v Nýdku (2014 NK541). **Vendryně:** — U cesty na již. svahu kopce Vružná 650 m sv. od vápenných pecí (2013).
Vzácně na sečených travnicích podél cest.
- Sedum hispanicum** (nat neo). **Bystřice:** v kraji betonového mostku přes Suchý potok, 1,65 km od dřevěného kostela Povýšení svatého Kříže, souvislé porosty (2011 Hlisnikovský in KOCIÁN et al. 2014). — Tamtéž (2014!).
Vzácně, z území znám zatím jen z jediné lokality.
- Sedum spurium** (nat neo). **Nýdek:** osada Střelma, 1,5 km zsz. od vrcholu M. Sošova (kóta 764; N11).
- Selinum carvifolia.** **D. Lištná:** okraj lesa vápencového hřebene Jahodná (DL12). — Podrost křovin na odkališti 700 m sv. od vrchu Jahodná (2018). **Nýdek:** Góra, osada Ostrý, 1 km jv. od kóty 709 (N1); vlhké svahové louky sev. od odbočky silnice na V. Čantoryji (N10). **Vendryně:** kóta 406 u Babí hory, na okraji listnatého lesa (ZATLOUKAL 1969); podél státní hranice 0,5 km záp. od vrcholu Ostrý (kóta 709), 1,5 km sv. od údolí potoka na vých. okraji obce (V11). — U lesní cesty pod kopcem Žďár 5 km jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2012!).
Roztroušeně na loukách a podél lesních cest.
- Senecio erraticus** (C3). **Nýdek:** V. Sošov na prameništi na horské louce (ZATLOUKAL 1969).
Údaj skoro jistě mylný. Grulich (in SLAVÍK & ŠTĚPÁNKOVÁ 2004) uvádí nejbližší výskyt až ve fytogeografickém okrese 83 Ostravská pánev.
- Senecio jacobaea.** **D. Lištná:** travinná vegetace na vých. a sev. svahu kóty 403 sev. od obce (DL3); polokulturní louka v kulminační části (náhorní plošina) kóty 403 (DL4); travnaté a křovinaté porosty vápencového hřebene Jahodná u cesty do Sosny (DL10); opuštěný vápencový lom na sev. svazích Jahodné (DL11); křovinaté svahy 0,3 km vých. od vých. okraje obce (DL13). — Křoviny pod lomem u odkaliště 490 m sev. od vrcholu Jahodné (2014!). **Vendryně:** — Okraj smíšeného lesa na již. svahu kopce Vružná 760 m sev. od vápenných pecí (2012 NK192).
Vzácně na lesních světlinách a lesních okrajích.
- Senecio ovatus.** **Bystřice:** B12, B13, B15, B16, B17, B18, B19, B20. **D. Lištná:** DL1, DL6. **H. Lištná:** HL2. **Nýdek:** N5, N12, N13, N21, N28, N29, N31, N32, N35, N36, N37, N38, N39, N41, N42, N43. — 2013!, 2014!. **Vendryně:** V23. — 2012 NK191, 2014.
Hojně v lesích.
- Senecio sylvaticus.** **Nýdek:** les podél červeně značené turistické cesty již. od V. Čantoryje (2012 Višňák in NDOP). — Les u žlutě značené turistické lesní cesty 540 m záp. od vrcholu V. Stožku (2014!). **Vendryně:** — Smrkový les na sev. svahu Vendryňského háje 1,2 km vsv. od vápenných pecí (2012!).
Vzácně v lesích.
- Senecio viscosus.** **Nýdek:** osada Střelma, 1,5 km zsz. od vrcholu M. Sošova (kóta 764; N11).
- Senecio vernalis** (nat neo). mezi Lištnou a Vendryní (1886 Schube in SCHUBE 1903–1904); svahy pahorků mezi Konskou a Lištnou (Žlik sec. KOLBENHEYER 1862).

Šlo pravděpodobně o přechodný jednorázový výskyt, který není zachycen v Květeně České republiky (srov. Grulich in SLAVÍK & ŠTĚPÁNKOVÁ 2004).

Senecio vulgaris (nat ar). **D. Lištná:** — Štěrkový násyp u parkoviště 180 m sv. od nemocnice Sosna (2018). **Bystřice:** — Štěrkový okraj cesty 1,6 km jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2018!). **Nýdek:** Góra, osada Ostrý, 1 km jv. od kóty 709 (N1); vlhké svahové louky sev. od odbočky silnice na V. Čantoryji (N10).

Vzácně na okrajích cest.

Setaria pumila (nat ar). **Bystřice:** Ascherson sec. FIEK (1881), OTRUBA (1926). **Vendryně:** okraj kukuřičného pole (Kilián 1961 OP sec. ZATLOUKAL 1969). — Břeh rybníka na potoce Vápenka 720 m sv. od vápenných pecí (2012 NK197, rev. J. Chrtek jun.).

Vzácně na náplavech, polích a podél cest.

Setaria viridis (nat ar). **Bystřice:** — Náplavy potoka Kopytná, 1,5 km jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014 NK576, rev. J. Chrtek jun. jako subsp. *viridis*); na dlážděném chodníku podél hlavní cesty Na Pasekách 1,8 km jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2018!). **D. Lištná:** okraj silnice v údolí potoka Lištnice (Burša 1975 FMM sec. PLADIAS 7).

Vzácně na náplavech.

Sherardia arvensis (nat ar). **Bystřice:** levý břeh Olše, pole, 340 m (Sedláčková 1988 NJM sec. CIMALOVÁ 2006). **D. Lištná:** příkopy a trávníky podél silnice směr H. Lištná (DL2); vrch Jahodná, u kalové nádrže 406 m (Burša 1975 FMM sec. CIMALOVÁ 2006); již. úpatí vrchu Jahodná, pole při okraji lesa (Čáp 1981 OLM sec. CIMALOVÁ 2006). **H. Lištná:** příkopy, trávníky a okraje polní kultury (kukuřice) podél silnice v obci při státní hranici (HL5); vlhký příkop podél polní cesty při státní hranici směr Kojkovice 0,5 km sv. od obce (HL6). **Nýdek:** Góra, osada Ostrý, 1 km jv. od kóty 709 (N1); Góra, pole nad levým břehem Horského potoka sev. od místa Kouty (Sedláčková 1999 NJM sec. CIMALOVÁ 2006). **Vendryně:** 0,6 km sev. od kostela (V1); příkopy, travnaté okraje polí podél polní cesty (zelená turistická značka) mezi údolím Olše a okrajem lesa Rovná (V19); pole střed obce (Hájková 1988 FMM sec. CIMALOVÁ 2006); pole u Olše, 340 m (Sedláčková 1988 NJM ibidem). — Pole pod Prašivou 900 m zjz. od vrcholu Prašivé hory (2014 NK481).

Roztroušeně na polích.

Silene dioica. **Bystřice:** B3, B5, B6, B7, B8, B11, 2009 Chytil in NDOP. — 2014!. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N26, N27. **Vendryně:** V12. — 2012!, 2013 NK277. Roztroušeně podél lesních cest a na okrajích luk.

Silene gallica (C1, cas ar). **Bystřice:** Ascherson sec. FIEK (1881); okraj pole poblíž žel. stanice Bystřice nad Olší (B2). **H. Lištná:** vlhký příkop podél polní cesty při státní hranici směr Kojkovice 0,5 km sv. od obce (HL6); Třinec, úhor u silnice Horní Lištná–Kojkovice, ca 2 km sv. obce Kojkovice (Vicherek 1975 BRNU). **Vendryně:** v bramborovém a v kukuřičném poli ve Vendryni (KILIÁN 1969; Kilián 1961 OP sec. ZATLOUKAL 1969); okraje polní cesty (zelená turistická značka), přechodná tůňka“ poblíž sv. okraje lesa Rovná 1,3 km jz. od žel. stanice (V20).

Silene latifolia subsp. alba (nat ar). **D. Lištná:** DL15. **Nýdek:** N10, N11. **Vendryně:** — 2012 NK194, 2013!.

Roztroušeně na loukách a podél cest.

Silene noctiflora (C4a, nat ar). **Vendryně:** — Pole u rodinného domu č. p. 184, 660 m sv. od vápenných pecí (2012 NK223).

Vzácně na polích.

- Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*.** Bystřice: — 2014 NK487. **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), DL2, DL28. — 2014. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N1, N22. — 2014. **Vendryně:** V5. — 2012 NK195, 2014.
Roztroušeně podél cest a na okrajích luk.
- Sinapis arvensis* (nat ar).** Bystřice: — Travnatý průsek, mezi chodníkem a parkovištěm 2,6 km jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2018). **D. Lištná:** DL2. **H. Lištná:** HL6. **Nýdek:** 2001 Cimalová in ČNFD. **Vendryně:** V1, V19. — U cesty na Zaošší 1,8 km jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2018).
Roztroušeně na okraji luk, rumišťích a v příkopech.
- Sisymbrium officinale* (nat ar).** Bystřice: — 2014 NK425. **Nýdek:** N25. — 2014!. **Vendryně:** V5, V6. — 2012 NK196.
Roztroušeně podél cest, na narušených místech a polích.
- Sisymbrium strictissimum* (nat neo).** **Vendryně:** — U lesní cesty na sz. svahu Vendryňského háje 1,1 km sv. od vápenných pecí (2013!).
Vzácně podél lesních cest.
- Solanum dulcamara*.** **Vendryně:** osada Do Mlýnka (1966, 1976 Satora in DLT). — U lesní cesty na vých. svahu kopce Babí hora 390 m sv. od vápenných pecí (2012 NK222); mýtiny na Babí hoře, 100 m sv. od vrcholu (2018).
Vzácně podél lesních cest.
- Solanum nigrum* (nat ar).** **Nýdek:** osada Kolibiska, údolí Hluchové sz. od hájenky (1999 Sedláčková in Slavíkův floristický archiv).
- Solidago canadensis* (inv neo).** Bystřice: 2009 Chytil in NDOP. — 2014 NK454. **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), DL28. — 2014. **Nýdek:** — 2014. **Vendryně:** V25. — 2012 NK193.
Hojně podél lesních cest, na narušených místech a náplavech vodních toků.
- Solidago gigantea* (inv neo).** **Vendryně:** v obci 0,5 km vých. od kostela (V7).
- Solidago virgaurea*.** Bystřice: B14, B16, B18, B20. **Nýdek:** N12, N14, N15, N32, N36. — 2013!, 2014 NK570. **Vendryně:** V11. — 2012 NK190.
Roztroušeně podél lesních cest.
- Sonchus arvensis* subsp. *arvensis* (nat ar).** **D. Lištná:** příkopy a trávníky podél silnice směr H. Lištná (DL2). **Vendryně:** — Na malém poli s bramborami 1,1 km vsv. od Babí hory (2018).
Roztroušeně na polích a v příkopech.
- Sonchus asper* (nat ar).** Bystřice: — 2014. **D. Lištná:** DL2, DL28. **H. Lištná:** HL6. **Nýdek:** N44. **Vendryně:** V8. — 2012 NK179.
Roztroušeně podél cest, na polích, narušených místech a říčních náplavech.
- Sonchus oleraceus* (nat ar).** Bystřice: — Náplavy potoka Kopytná 1,5 km jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014!). **Vendryně:** podél Kopytné (V24). — U cesty 200 m jv. od obecního úřadu (2012 NK180); pravý břeh řeky Olše 1,7 km jjv. od žel. stanice Vendryně (2012!).
Roztroušeně podél cest, na polích, narušených místech a říčních náplavech.
- Sorbus aucuparia*.** Bystřice: B12, B14, B15, B16, B17, B19, B20. — 2014. **D. Lištná:** DL1, DL18. **H. Lištná:** 1990 Páleníková in NDOP. — 2014. **Nýdek:** N21, N28, N29, N30, N34, N36, N40, N42, N43. — 2014. **Vendryně:** V23. — 2012!.
Hojně v lesích a podél cest.
- Sparganium erectum*.** Bystřice: rybochovná nádrž, částečně s opevněnými břehy 270 m záp. od žel. stanice (2012 Višňák in NDOP). — Tamtéž (2014!). **D. Lištná:** Vodní plocha na odkališti 860 m sv. od vrcholu Jahodné (2018!).
Vzácně kolem vodních ploch.

- Spergula arvensis*** (nat ar). **Bystřice:** — Navážka zeminy 190 m záp. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014 NK609, rev. Z. Kaplan jako subsp. *arvensis*). **Nýdek:** na poli na kopci Poledňa (ZATLOUKAL 1969).
Vzácně na navážkách zeminy a v polích.
- Spergularia rubra***. **D. Lištná:** polní cesta na úpatí vrchu Jahodná (Burša 1975 FMM sec. PLADIAS 2). **Nýdek:** osada Střelma, 1,5 km szs. od vrcholu M. Sošova (kóta 764; N11); osada Střelma, lesní potůček u zeleně značené turistické cesty k Beskydskému sedlu (N14).
- Spiranthes spiralis*** (C1). **Bystřice:** KOLBENHEYER (1862). **Nýdek:** Čantoryje (KOLBENHEYER 1862). **Vendryně:** KOLBENHEYER (1862).
Procházka (in ŠTĚPÁNKOVÁ 2010) považuje tyto výskyty za zaniklé.
- Stachys alpina*** (C3). **D. Lištná:** KILIÁN (1969), KILIÁN & KILIÁN (1956), DL6, DL8. **H. Lištná:** ZATLOUKAL (1969). **Nýdek:** KILIÁN & KILIÁN (1956), ZATLOUKAL (1969). **Vendryně:** Ascherson sec. FIEK (1881), KILIÁN & KILIÁN (1956), ZATLOUKAL (1969), V3, V4, V5, V11. — Křovinatý lesní lem na již. svahu kopce Vružná 800 m sev. od vápenných pecí (2012 NK189).
Vzácně podél lesních cest a lesních lemů.
- Stachys annua*** (C2). Na polích a výslunných mezích v okolí Třince (OTRUBA 1926).
OTRUBA (1926) pravděpodobně jen převzal starší údaj (Uechtritz sec. FIEK 1881 [Třinec a Konská zřídka]), přičemž z jeho znění není jisté, jestli jde o nález přímo ze studovaného území.
- Stachys palustris***. **Bystřice:** B22. — 2014. **D. Lištná:** DL2. **H. Lištná:** HL5. — 2014 NK544. **Nýdek:** N1, N11, N16, N26. — 2014!. **Vendryně:** V1, V8. — 2012 NK187.
Hojně podél lesních cest a lesních potoků.
- Stachys sylvatica***. **Bystřice:** B3, B8, B11. — 2014!. **D. Lištná:** DL1. — 2014!. **H. Lištná:** HL1. **Nýdek:** N8, N12. — 2014 NK410. **Vendryně:** V22. — 2012 NK188, 2013!.
Hojně podél lesních cest, lesních lemů a na pasekách.
- Stellaria alsine***. **Bystřice:** — 2014 NK413. **Nýdek:** KOLBENHEYER (1862), ZATLOUKAL (1969), N5, N11, N12. — 2014 NK445. **Vendryně:** V24. — 2012 NK181.
Hojně v lesních mokřinách a na březích vodních toků.
- Stellaria graminea***. **Bystřice:** — 2013!, 2014. **D. Lištná:** DL4. **Nýdek:** N12, N21. — 2014 NK502. **Vendryně:** V1. — 2012 NK182, 2014.
Hojně na loukách a v travnatých lemech podél cest.
- Stellaria media***. **Bystřice:** — 2014 NK414. **D. Lištná:** DL2. — 2014 NK317. **Nýdek:** N11. — 2013!. **Vendryně:** V1. — 2012!.
Hojně na březích vodních toků, okrajích lesů a narušených místech.
- Stellaria nemorum***. **Bystřice:** B3, B5, B6, B8. — 2014!. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N12, N26, N30. — 2014 NK411. **Vendryně:** V12. — 2012!.
Hojně na březích vodních toků a okrajích lesů.
- Stellaria palustris*** (C2). **Vendryně:** Prašivá hora, mokrá louka u potoka (ZATLOUKAL 1969).
Pravděpodobně jde o mylný údaj vzniklý záměnou s druhem *S. graminea*.
Věrohodné doklady o výskytu v Beskydech zřejmě chybějí.
- Streptopus amplexifolius*** (C2). **Nýdek:** Čantoryje (Kotschy 1825 BRNM sec. PLADIAS 4; KOLBENHEYER 1862); les u tří rybníků 870 m vých. od dřevěného kostela v Nýdku (2012 Višňák in NDOP).

- Succisa pratensis***. Bystřice: zpuštělé louky V Pasekách 1,6 km jz. od vrcholu Loučka (2012 Višňák in NDOP).
- Symphoricarpos albus*** (inv neo). **D. Lištná**: — U cesty 300 m již. od vrchu Hradisko (2018). **H. Lištná**: břeh Lištnice (2012 Višňák in NDOP). **Nýdek**: podél Hluchové mezi osadami Dílek a Poledná (2012 Višňák in NDOP).
Roztroušeně na okrajích lesů a břehových porostů.
- Symphytum officinale***. Bystřice: B3, B7. — 2014!. **D. Lištná**: okraj smíšeného lesa na vrchu Jahodná (Burša 1973 FMM sec. PLADIAS 3). **H. Lištná**: HL4, HL5, HL6. — 2014. **Nýdek**: N9. — 2014. **Vendryně**: V8. — 2012!, 2013!.
Hojně na březích vodních toků, vlhkých loukách a v příkopech.
- Symphytum tuberosum* (subsp. *tuberosum*)**. Bystřice: B3, B4, B5, B6, B7, B8. — 2014 NK409. **D. Lištná**: KILIÁN (1960), DL6, DL18. **Nýdek**: Uechtritz sec. FIEK (1881), ZATLOUKAL (1969), N8. **Vendryně**: KILIÁN (1960), Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969). — 2012!.
Roztroušeně v lesích, v lesních okrajích a podél lesích potoků.
- Syringa vulgaris*** (nat neo). **H. Lištná**: zplaněle v pobřežních křovinách (ZATLOUKAL 1969). **Vendryně**: — Zplanělé keře u chátrající hospodářské budovy 200 m sev. od katolického kostela ve Vendryni (2018).
Zplaněle na ruderalních a narušených místech.
- Tanacetum vulgare*** (nat ar). Bystřice: B1. — 2013!, 2014. **D. Lištná**: DL28. — 2014. **Nýdek**: — 2014. **Vendryně**: V5. — 2012 NK199, 2012 NK200.
Hojně podél cest a na narušených místech.
- Taraxacum* sect. *Ruderalia***. Bystřice: 2009 Chytil in NDOP. — 2014. **D. Lištná**: DL2, DL28. — 2014. **H. Lištná**: HL4, HL5, HL6. **Nýdek**: N9. **Vendryně**: V1. — 2012!.
Hojně na loukách, v příkopech, podél cest a okrajích pole.
- Taxus baccata*** (C3). Bystřice: 2009 Zatloukal in NDOP. **Nýdek**: 2009 Zatloukal in NDOP. — Les v NPR Čantoria 1,1 km záp. od vrcholu V. Čantoryje (2014). **Vendryně**: Babí hora u Vendryně (1886 Schube in SCHUBE 1903–1904); hraniční hřeben v okolí Vružné (ONDRASZEK et al. 2004).
Vzácně v lesích.
- Telekia speciosa*** (inv neo). **D. Lištná**: — Zarostlé schodovité stupně na odkališti 600 m zsz. od vodní plochy (2018). **Vendryně**: křovinaté stráně nad potokem v sv. části obce (V5); Vendryně (Kaplan in SLAVÍK & ŠTĚPÁNKOVÁ 2004).
Vzácně v rozvolněných lesních okrajích.
- Thalictrum aquilegifolium***. Bystřice: v olšině na pravém břehu řeky Olše (KILIÁN 1960); pravý břeh Olše, olšina proti ústí Kopytné (Kudělová 1996 BRNU sec. Excerpt pro atlas; B3). **Nýdek**: Čantoryje (KOLBENHEYER 1862); údolí Hluchové (KILIÁN & KILIÁN 1956).
- Thlaspi arvense*** (nat ar). Bystřice: — 2014. **H. Lištná**: HL5. **Nýdek**: N11. **Vendryně**: V25. — 2012!.
Roztroušeně podél cest, na polích a náplavech.
- Thymus pulegioides***. Bystřice: — 2014. **D. Lištná**: DL3, DL4, DL10, DL28. — 2014. **H. Lištná**: HL5. **Nýdek**: N10, N11, N12. — 2014!. **Vendryně**: 2007 Hutýrová in NDOP. — 2012!, 2014 NK474.
Roztroušeně na krátkostébelných loukách a narušených místech.
- Tilia cordata***. Bystřice: 2009 Chytil in NDOP. — 2014. **D. Lištná**: Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), DL1. — 2014. **H. Lištná**: 1990 Páleníková in NDOP. — 2014.

- Nýdek:** N12. — 2014. **Vendryně:** Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969). — 2012!.
- Hojně v lesních okrajích nebo soliterně podél cest.
- Tilia platyphyllos.** **Bystřice:** B9, B10. **D. Lištná:** DL1, DL18, DL19, DL20, DL21. — 2014!. **Vendryně:** V22. — 2012!.
- Roztroušeně v lesních okrajích.
- Tilia cf. ×vulgaris** (*T. cordata* × *T. platyphyllos*). **Vendryně:** — Listnatý les na již. svahu kopce Vružná 750 m ssv. od vápenných pecí (2012 NK237).
- Torilis japonica.** **Bystřice:** B1. — 2014!. **D. Lištná:** — 2014 NK567. **Nýdek:** Zatloukal 1968 BRNU srov. ZATLOUKAL (1969). — 2014!. **Vendryně:** V5, V8. — 2012 NK205.
- Hojně v lesních lemech, podél lesních cest a na náplavech vodních toků.
- Tragopogon orientalis.** **D. Lištná:** DL3, DL10 — 2014. **H. Lištná:** HL4. **Vendryně:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969). — 2012 NK203, 2012 NK204.
- Roztroušeně na loukách.
- Tragopogon pratensis.** **Bystřice:** KILIÁN (1960). **H. Lištná:** KILIÁN (1960). **Nýdek:** — Louka 780 m jz. od vrcholu V. Čantoryje (2014!; agg.). **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969), V5.
- Je možné, že se veškeré nálezy vztahují k předchozímu druhu.
- Traunsteinera globosa** (C2). „Ober Lischna bei Ustroń“ (KOLBENHEYER 1862; Kotschy sec. FIEK 1881). **Nýdek:** Čantoryje (KOLBENHEYER 1862; Kilián OP sec. ZATLOUKAL 1969).
- Procházka (in ŠTĚPÁNKOVÁ 2010) považuje výskyt tohoto druhu za zaniklý. Datace nálezu rokem 1887 je mylná: jde pouze o rok vydání květeny (FORMÁNEK 1887), z níž autor údaj nejspíš převzal. Navíc zde není jisté, jestli se nejedná o polské území.
- Trifolium alpestre.** **Vendryně:** kóta 570 u Vružné, na louce (Vicherek sec. ZATLOUKAL 1969).
- Květena České republiky nemá žádný údaj z fytogeografického okresu 84. Podbeskydská pahorkatina (srov. Kubát in SLAVÍK 1995); patrně se jedná o záměnu s *T. medium*.
- Trifolium aureum.** **Nýdek:** Góra, nad osadou Ostrý 0,6 km jv. od kóty 709 (N2). **Vendryně:** — Bylinný porost v lese podél červeně značené turistické lesní stezky 1,5 km sv. od vápenných pecí (2013!).
- Roztroušeně v lesních lemech a na lesních stezkách.
- Trifolium campestre.** **Vendryně:** — Louka na již. svahu kopce Vružná 700 m sv. od vápenných pecí (2012 NK207).
- Vzácně na loukách.
- Trifolium dubium.** **Bystřice:** ZATLOUKAL (1969). **H. Lištná:** ZATLOUKAL (1969). **Nýdek:** N1, N11. — 2014. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969), V8. — 2012 NK206.
- Hojně na loukách, pastvinách a podél cest.
- Trifolium hybridum** (nat neo). **Bystřice:** — 2014 NK436. **D. Lištná:** DL2, DL28. — 2014!. **H. Lištná:** HL4, HL5, HL6. **Nýdek:** N7.
- Roztroušeně na náplavech vodních toků, pastvinách a narušených místech.
- Trifolium medium.** **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), DL3, DL10. — 2014 NK472. **H. Lištná:** HL4, HL5. **Nýdek:** N7, N9, N22, N24. **Vendryně:** V14. — 2012!; 2014!.
- Roztroušeně na loukách.

- Trifolium montanum*.** D. Lištná: DL9. H. Lištná: HL5. Vendryně: Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969), V2.
- Trifolium ochroleucum* (C3).** Bystřice: hřbitov (Kotschy sec. FIEK 1881).
- Trifolium pratense* subsp. *pratense*.** Bystřice: 2004 Hustáková in NDOP. — 2014. D. Lištná: DL2, DL3, DL28. H. Lištná: HL4, HL5. — 2014 NK583. Nýdek: N11. Vendryně: V1, V5. — 2012!.
- Hojně na loukách, náplavech vodních toků a podél cest.
- Trifolium repens*.** Bystřice: B24. D. Lištná: DL4, DL28. — 2014. H. Lištná: HL4, HL6. Nýdek: ZATLOUKAL (1969), N9, N11, N16, N21. — 2014!. Vendryně, V1. — 2012!.
- Hojně na loukách, pastvinách, narušených místech a podél cest.
- Tripleurospermum inodorum* (nat ar).** D. Lištná: DL28. — 2014. H. Lištná: ZATLOUKAL (1969). Nýdek: N11. Vendryně: V25. — 2012 NK201, 2012 NK202, 2014!.
- Roztroušeně podél cest, na polích a narušených místech.
- Trisetum flavescens*.** Bystřice: — 2014!. D. Lištná: ZATLOUKAL (1969), DL3, DL4. — 2014. H. Lištná: HL4, HL5, HL6. Nýdek: N11, N24. — 2013 NK280, 2014. Vendryně: Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969). — 2012 NK208.
- Hojně na loukách a pastvinách.
- Trollius altissimus* (C3).** Nýdek: V. Čantoryje (KOLBENHEYER 1862; Kotschy sec. FIEK 1881).
- Tento velmi starý nález vyžaduje ověření.
- Tussilago farfara*.** D. Lištná: DL2, DL3, DL28. — 2014. H. Lištná: HL6. Nýdek: N10, N12, N13, N15, N25. — 2014 NK604. Vendryně: V25. — 2012!.
- Hojně na stráních, náspech, narušených místech a podél cest.
- Typha angustifolia*.** Vendryně: u samoty nad potokem 2 km vsv. od Babí hory (kóta 492; V13).
- Typha latifolia*.** Bystřice: ZATLOUKAL (1969). — 2014. D. Lištná: DL28. — 2014. H. Lištná: HL6. Nýdek: N46, N47, N48. — 2014 NK505.
- Hojně kolem vodních ploch a v příkopech se stojatou vodou.
- Typha laxmannii* (nat neo).** D. Lištná: DL28. — Tůňka u odkaliště 940 m sv. od vrcholu Jahodné (2014).
- Vzácně kolem vodních ploch.
- Ulmus glabra*.** Bystřice: Ascherson sec. FIEK (1881). D. Lištná: DL27. — 2014!. H. Lištná: — 2014 NK601. Vendryně: V25. — 2012 NK218 (rev. M. Šrámek).
- Hojně v listnatých lesích a v lesních lemech podél vodních toků.
- Ulmus minor* (C4a).** D. Lištná: osada Sosna, již. okraj lesa ve vých. části vápencového pahorku Jahodná, 0,6 km ssv. od osady (DL8).
- Urtica dioica*.** Bystřice: B3, B4, B5, B6, B8, B11, B18 — 2014. D. Lištná: DL22. Nýdek: N11, N27, N33, N39. — 2014. Vendryně: V11. — 2012.
- Hojně na narušených místech, pastvinách, náplavech vodních toků a v příkopech.
- Urtica urens* (C3, nat ar).** Vendryně: ruderalní stanoviště kolem žel. stanice (V6).
- Vaccinium myrtillus*.** Bystřice: B12, B13, B14, B15, B16, B17, B19, B20. — 2014. Nýdek: N2, N12, N21, N30, N34, N37, N38, N39, N40, N41, N42, N43. — 2014. Vendryně: V11. — 2012!, 2014.
- Hojně ve stinných lesích nebo na loukách ve vyšších polohách.
- Vaccinium vitis-idaea*.** Vendryně: borový les na Prašivé (ZATLOUKAL 1969).

Valeriana dioica (C4a). Nýdek: Hora, členité mokré světliny 1,6 km vých. od vrcholu Ostrého vrchu; les u Horského potoka 1,3 km jv. od vrcholu Ostrého vrchu (2012 Višňák in NDOP).

Nejbližše doložený údaj *Valeriana dioica* je z Trojanovic (Hlisnikovský in litt). Je pravděpodobné, že se jedná o záměnu s *V. simplicifolia*.

***Valeriana excelsa*. Nýdek:** břehové porosty Horského potoka sz. od osady Kouty (2012 Višňák in NDOP jako subsp. *sambucifolia*).

Výskyt se mi nepodařilo ověřit. Holub & Kirschner (in SLAVÍK 1997) uvádí z fytogeografického okresu 84. Podbeskydská pahorkatina *Valeriana excelsa* subsp. *transiens*.

***Valeriana officinalis*. Bystřice:** — 2014 NK451. **D. Lištná:** DL10, DL11, DL28. — 2014!. **H. Lištná:** — 2014 NK585. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969). — 2012 NK212.

Roztroušeně na náplavech, v pobřežních křovinách a podél cest.

***Valeriana simplicifolia* (C3). Bystřice:** Kotschy sec. FIEK (1881); levý břeh řeky Olše (1949–1985 Kilián sec. HÁJKOVÁ a PRYMUSOVÁ 2011); blízko obce Bystřice, na louce podél levého pobřeží řeky Olše (Sedláčková 1988 NJM sec. HÁJKOVÁ a PRYMUSOVÁ 2011). — U potoka 1,6 km jv. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014 NK415). **Vendryně:** tok Vendryňky (1998 Kudělová sec. HÁJKOVÁ & PRYMUSOVÁ 2011).

Vzácně podél potoků.

***Valeriana tripteris* (C3). Nýdek:** Czantory bei Ustroń (Wimmer 1841; KOLBENHEYER 1862; Grabowski sec. FIEK 1881; OTRUBA 1926); NPR Čantoria (1989 Hájková in NDOP); NPR Čantoria, široký žleb vyplněný balvany, v březích skalní odkryvy (2012 Višňák in NDOP); NPR Čantoria (2014 Čížková in NDOP).

Nálezy vyžadují ověření.

***Valerianella dentata* (nat ar, C4a). D. Lištná:** DL2. **H. Lištná:** Trinec, úhor u silnice Horní Lištná – Kojkovice, ca 2 km sv. od obce Kojkovice (Vicherek 1975 BRNU). **Nýdek:** N11. **Vendryně:** V1, V19. — Pole pod Prašivou 900 m zjz. od vrcholu Prašivé hory (2014 NK480).

Vzácně na polích.

***Valerianella rimosa* (C1, nat ar). Bystřice:** levý břeh řeky Olše (Sedláčková 1988 NJM sec. PLADIAS 3). **H. Lištná:** vlhký příkop podél polní cesty při státní hranici směr Kojkovice 0,5 km sv. od obce (HL6); H. Lištná (Kirschner in SLAVÍK 1997).

Je pozoruhodné, že Vicherek nález (HL6) nedoložil, ačkoli tak učinil v případě mnohem běžnějšího druhu *Valerianella dentata*, který sbíral na tomtéž místě (srov. u předchozího druhu).

***Veratrum album* subsp. *lobelianum* (C4a). D. Lištná:** KILIÁN (1969), DL3. **Nýdek:** KOLBENHEYER (1862), Kotschy sec. FIEK (1881), ZATLOUKAL (1969), KILIÁN (1969), N27. — 2014 NK509. **Vendryně:** — 2014.

Vzácně na horských loukách a v lesních lemech.

***Verbascum chaixii* subsp. *austriacum* (C4a). Bystřice:** — Náplavy řeky Olše 700 m jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014 NK435).

Vzácně na říčních náplavech.

***Verbascum densiflorum* (C4a). D. Lištná:** kamenolom (ZATLOUKAL 1969). **Vendryně:** Babí hora (Vicherek sec. ZATLOUKAL 1969). — Louka sz. od psího hřbitova 650 m záp. od vrcholu Žďáru (2014).

Vzácně podél cest a na okrajích luk.

- Verbascum nigrum*. Bystřice:** — 2014. **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969), DL11. **H. Lištná:** HL5. **Vendryně:** V24. — 2013!.
Roztroušeně na říčních náplavech, narušených místech a podél cest.
- Verbascum phlomoides*. Bystřice:** — U cesty 2,2 km jv. žel. stanice Bystřice nad Olší (2014); náplavy řeky Olše 700 m jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014!). **D. Lištná:** odkaliště (DL28). — Odkaliště 670 m sv. od vrcholu Jahodné (2014 NK470).
Roztroušeně na říčních náplavech, narušených místech a podél cest.
- Verbascum phoeniceum* (C3).** **H. Lištná:** KILIÁN & KILIÁN (1956).
Jedná se nejspíš o přechodné zavlečení, jelikož zde tento druh přirozeně neroste ani se nepěstuje (Hlisnikovský in litt.).
- Verbascum thapsus*. Bystřice:** — Náplavy řeky Olše 700 m jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014). **D. Lištná:** opuštěný vápencový lom na sev. svazích Jahodné (DL11). **Nýdek:** — Louka na úpatí kopce Mionší 1 km sev. od vrcholu (2014!). **Vendryně:** podél Kopytné (V24).
Roztroušeně na říčních náplavech, narušených místech a podél cest.
- Verbascum ×brockmuelleri* (*V. nigrum* × *V. phlomoides*). Bystřice:** — Náplavy potoka Kopytná 1,2 km jjz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014!).
Roztroušeně na říčních náplavech.
- Verbena officinalis* (C3, nat ar).** **D. Lištná:** kamenolom, kóta 350 (ZATLOUKAL 1969); sz. okraj lesa u vsv. okraje města (DL14); odkaliště (DL28). **Nýdek:** NPR Čantoryje (1986 Hájková in ČNFD).
- Veronica anagallis-aquatica*. D. Lištná:** odkaliště (DL28). — V pobřežních porostech okolo vodní plochy na odkališti 860 m sv. od vrcholu Jahodné (2018).
Vzácně na zaplavovaném břehu odkaliště.
- Veronica arvensis* (nat ar).** **Bystřice:** — Na Pasekách, louka 1,7 km již. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014 NK417, rev. J. Danihelka). **D. Lištná:** vrch Jahodná (406 m), lesní cesta (Burša 1975 FMM sec. PLADIAS 5). **Nýdek:** osada Střelma, 1,5 km zsz. od vrcholu M. Sošova (kóta 764; N11). **Vendryně:** podél Kopytné (V24). — Louka na již. svahu kopce Vružná 700 m sv. od vápenných pecí (2012!).
Roztroušeně na loukách a travnatých lemech podél cest.
- Veronica beccabunga*. Bystřice:** — 2014. **D. Lištná:** mokrá lesní cesta na vrchu Jahodná (406 m; Burša 1975 FMM sec. Excerptce pro atlas). **H. Lištná:** HL6. — 2014!. **Nýdek:** N10, N12, N15. — 2014!. **Vendryně:** V25. — 2012 NK211 (rev. J. Danihelka).
Hojně na březích vodních toků, v mělkých vodních plochách a příkopech se stojatou vodou.
- Veronica chamaedrys*. D. Lištná:** DL4. **H. Lištná:** HL4, HL6. **Nýdek:** N2, N9, N12. — 2013!, 2014. **Vendryně:** V25. — 2012 NK210.
Hojně na loukách a pastvinách.
- Veronica filiformis* (nat neo).** **Bystřice:** — Louka u potoka Suchý 2 km sv. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2014 NK418).
Vzácně na loukách.
- Veronica montana* (C4a).** **Bystřice:** žlutá turistická značka ca 1,2 km od Křivé směrem ke Skalce (kóta 649,6), hojně (Kudělová 1997 FMM sec. PLADIAS 2). **D. Lištná:** vrch Jahodná (406 m; Hájková 2002 FMM sec. PLADIAS 2). **Nýdek:** Čantoryje; Střelma, v lese u cesty (ZATLOUKAL 1969); osada Střelma, lesní potůček u zeleně značené turistické cesty k Beskydskému sedlu (N14); V. Čantoryje (kóta 995), pokračování hřebene podél červeně značené turistické cesty 0,5 km jjv. od vrcholové

kóty (N20). — Lesní lem u bezejmenného potoka 1 km vých. od dřevěného kostela v Nýdku (2014 NK501; rev. J. Danihelka). **Vendryně:** Prašivá (1887 Schube in SCHUBE 1903–1904); kóta 406 u Babí hory, v listnatém lese (Zatloukal 1968 BRNU, rev. J. Danihelka srov. ZATLOUKAL 1969). — Příkop u lesní cesty na sz. svahu Vendryňského háje 1,2 km sv. od vápenných pecí (2013 NK282; rev. J. Danihelka).

Naleziště „Czantory bei Ustroń“ (WIMMER 1841) a „Auf der Czantory bei der Quelle“ (KOLBENHEYER 1862) se nacházejí na polské straně Slezských Beskyd. Vzácně podél lesních cest a lesních lemů.

Veronica officinalis. **Bystřice:** — 2014. **D. Lištná:** DL10. **Nýdek:** N3, N12, N20, N21, N31. — 2014 NK420 (rev. J. Danihelka). **Vendryně:** — 2012 NK209 (rev. J. Danihelka), 2014.

Roztroušeně ve světlých lesích, na rozvolněných lesních okrajích a krátkostébelných loukách.

Veronica persica (nat neo). **D. Lištná:** DL2. **H. Lištná:** HL5, HL6. **Nýdek:** N11. **Vendryně:** V1, V19. — 2014 NK419.

Vzácně na loukách, v příkopech a na polích.

Veronica serpyllifolia. **Bystřice:** — Na zahradě rodinného domu č. p. 691, 1,6 km jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2018!). **D. Lištná:** nehojně na vlhčí louce na vrchu Jahodná (406 m; Burša 1975 FMM sec. PLADIAS 2). **H. Lištná:** ojedinele na lesní cestě na vrchu Vružná (514 m; Burša 1975 FMM sec. PLADIAS 2). **Nýdek:** V. Čantoryje (ZATLOUKAL 1969); osada Střelma, 1,5 km zsz. od vrcholu M. Sošova (kóta 764; N11). **Vendryně:** Babí hora v lese u potůčku (Zatloukal 1968 BRNU). — Louka na již. svahu kopce Vružná 700 m sv. od vápenných pecí (2012!).

Vzácně na loukách a pastvinách.

Veronica sublobata. **Vendryně:** — Listnatý les na již. svahu kopce Vružná 750 m ssv. od vápenných pecí (2012!).

Vzácně v rozvolněných lesních okrajích.

Veronica teucrium (C4a). **Vendryně:** Vavřkova hora, na louce (Vicherek sec. ZATLOUKAL 1969).

V herbáři Masarykovy univerzity, kde prof. Vicherek pracoval, se žádný sběr z této lokality nenachází. Podle sdělení D. Hlisnikovského je však údaj správný. Nejbližší doložené výskyty se nacházejí u Staříče a Fryčovic (KOLLÁROVIČOVÁ 2011). Bylo by vhodné pokusit se o ověření výskytu na Vavřkově hoře.

Viburnum lantana (C4a). **Vendryně:** Zaolší, Do Mlýnka (1966, 1976 Satora in DLT).

Pravděpodobně se jedná o záměnu s *V. opulus*, snad při zápisu do databáze.

Viburnum opulus. **Bystřice:** 2003 Hustáková in NDOP. **D. Lištná:** DL1, DL9. — 2014. **Vendryně:** V11. — 2012!, 2013!.

Roztroušeně v lesních okrajích, na mezích a v křovinách.

Vicia angustifolia (nat ar). **Bystřice:** — Louka 1,4 km sv. od žel. stanice Hrádek (2014 NK486). **Nýdek:** Góra, osada Ostrý, 1 km jv. od kóty 709 (N1); osada Střelma, 1,5 km zsz. od vrcholu M. Sošova (kóta 764; N11). — Mez na louce 1,1 km vých. od dřevěného kostela v Nýdku (2014). **Vendryně:** — Pastvina na již. svahu kopce Vružná 700 m sv. od vápenných pecí (2013!).

Roztroušeně na loukách.

Vicia cracca. **Bystřice:** B22. — 2013!. **D. Lištná:** ZATLOUKAL (1969). — 2014. **H. Lištná:** HL4. **Nýdek:** N9, N13, N22. — 2014. **Vendryně:** Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969). — 2012 NK215, 2012 NK216.

Hojně na loukách.

Vicia dumetorum (C4a). **D. Lištná:** fragment *Querco-Carpineta* na sz. a záp. svahu kóty 403 (DL1).

Výskyt na Trinecké Sosně potvrdil Hlisnikovský (2014 in litt.).

Vicia hirsuta. **Nýdek:** osada Střelma, 1,5 km zsz. od vrcholu M. Sošova (kóta 764; N11). **Vendryně:** 0,6 km sev. od kostela (V1); ruderalní stanoviště kolem žel. stanice (V6); louky a údolní svahy podél potoka již. od odbočky silnice do Trince (V8). — Ovocný sad na již. svahu kopce Vružná 750 m sv. od vápenných pecí (2012 NK217).

Vzácně na loukách.

Vicia pannonica subsp. pannonica (C2, nat ar). **D. Lištná:** dosti hojně v obilí v údolí potoka Staviska (KILIÁN 1969).

Výskyt tohoto vzácného archeofytu je třeba považovat za zaniklý.

Vicia sativa (nat ar). **Nýdek:** osada Střelma, 1,5 km zsz. od vrcholu M. Sošova (kóta 764; N11; agg.); osada Zakámen, okraj pole 2,4 km ssv. od sv. okraje Nýdku (N17; agg.); **Vendryně:** 0,6 km sev. od kostela (V1).

Většina nebo všechny údaje o výskytu vikve seté se pravděpodobně vztahují k druhu *V. angustifolia*.

Vicia sepium. **Bystřice:** B23. **D. Lištná:** DL3, DL28. — 2014. **H. Lištná:** HL6. — 2014. **Nýdek:** N9, N11, N13, N15, N22, N24. — 2013!, 2014. **Vendryně:** V9. — 2012 NK221.

Hojně na loukách.

Vicia tetrasperma. **D. Lištná:** DL28. — 2014!. **H. Lištná:** HL6. **Nýdek:** N44. **Vendryně:** V1. — 2013 NK281, 2014 NK561.

Roztroušeně na polích a narušených místech.

Vicia villosa subsp. villosa (nat ar). **Nýdek:** vrstevnicová cesta jz. úbočím V. Čantorie (kóta 994,5 m; N42); asi 0,5 km sz. od Beskydského sedla (N43). **Vendryně:** 0,6 km sev. od kostela (V1).

Vinca minor. **D. Lištná:** — 2014 NK319. **H. Lištná:** HL3. **Nýdek:** Uechtritz sec. FIEK (1881), ZATLOUKAL (1969). — 2014. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969), V11, V22, V23. — 2012!, 2014.

Roztroušeně v lesích a lesních lemech.

Viola arvensis. **Bystřice:** — 2014 NK416. **D. Lištná:** DL2. **H. Lištná:** HL5. **Nýdek:** N44. **Vendryně:** V1. — 2014!.

Vzácně na polích a podél cest.

Viola canina. **Nýdek:** 2003 Hustáková in NDOP.

Viola collina. **Vendryně:** Vružná, svahový háj (2012 Višňák in NDOP).

Izolovaný údaj, navíc z podzimního terénního průzkumu. Pravděpodobně determinační omyl. V blízkosti uvedeného místa se vyskytuje *Viola hirta*.

Viola hirta. **D. Lištná:** kóta 403 (ZATLOUKAL 1969); travinná vegetace na vých. a sev. svahu kóty 403 sev. od obce (DL3); opuštěný vápencový lom na sev. svazích Jahodné (DL11). — Louka nad odkalištěm 390 m sv. od vrcholu Jahodné (2014 NK321, bělokvětá rostlina). **Vendryně:** Babí hora (Vicherek sec. ZATLOUKAL 1969); vých. okraj borového lesa a přilehlé travinné porosty na již. svazích Vružné (kóta 532) u samoty 0,3 km již. od vrcholu (V2); lesní cesta mezi Babí horou (kóta 492) a Vružnou (kóta 532; V4). — Listnatý les na již. svahu kopce Vružná 750 m ssv. od vápenných pecí (2012!).

Roztroušeně na loukách.

Viola odorata (nat ar). **Bystřice:** pravidelně sečená louka v zástavbě 1,6 km již. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2018). **D. Lištná:** kóta 403 (ZATLOUKAL 1969); asi 300 m

již. od nemocnice (DL18). — Louka nad odkalištěm 390 m sv. od vrcholu Jahodné (2014 NK320). **Vendryně:** — Svah náspu na již. svahu kopce Vružná 710 m sv. od vápenných pecí (2012).

Vzácně na loukách a podél lesních lemů.

Viola reichenbachiana. **Bystřice:** B12, B13, B14, B18, B20. — 2014!. **D. Líštná:** Vicherek sec. ZATLOUKAL (1969), DL1, DL18, DL19, DL21, DL22, DL25. — 2014 NK318. **H. Líštná:** — 2014!. **Nýdek:** ZATLOUKAL (1969), N4, N11, N22, N28, N31, N37. — 2014. **Vendryně:** Vicherek & Zatloukal sec. ZATLOUKAL (1969), V4, V22, V23. — 2012 NK213.

Hojně v lesích.

Viola tricolor. **Nýdek:** V. Čantoryje (kóta 995), pokračování hřebene podél červeně značené turistické cesty 0,5 km jjv. od vrcholové kóty (N20; agg.); les podél červeně značené turistické cesty 0,9 km zzj. od vrcholu V. Čantoryje (kóta 995), sev. od osady Zakámen (N22; agg.). **Vendryně:** — Smíšený les pod kopcem Malý kozinec 3,5 km jz. od žel. stanice Bystřice nad Olší (2012 NK214).

Vzácně ve světlých lesích.

Virga strigosa (nat neo). **Vendryně:** křovinaté stráně nad potokem v sv. části obce (V5).

Viscum album subsp. album. **Bystřice:** — 2014. **H. Líštná:** — 2014. **Vendryně:** ZATLOUKAL (1969; zřejmě subsp. *austriacum*; C4a), V6. — 2012.

Hojně na listnatých stromech.

Ve zkoumaném území bylo možné rozlišit několik základních biotopů, které se vyznačovaly specifickou flórou.

Základní biotopy:

Kamenné moře

Nachází se na jižním a západním svahu kopce Žďár. Vegetace je velice chudá, její bylinné patro tvoří *Calamagrostis arundinacea*, *C. villosa* a *Vaccinium myrtillus*, stromové patro pak *Betula pendula*, *Carpinus betulus* a *Picea abies*.

Vodní toky a plochy

V území je několik malých rybníků s rozlohou menší než 1 ha. Mezi druhy, které lemují tyto nádrže, patří *Glyceria fluitans*, *G. notata*, *Juncus effusus*, *J. inflexus*, *Phragmites australis*, *Sparganium erectum*, *Typha latifolia* nebo *Veronica beccabunga*. Na hladině se občas vyskytuje *Lemna minor* a zřídka i *Lemna gibba*. V lesní tůňce na území Vendryně roste v hojném počtu *Calla palustris*. Specifická je také vodní plocha na odkališti s výskytem *Myriophyllum spicatum* a parožnatek *Charophyceae*. (2014 NK607).

Pobřežní vegetace potoků

Podél potoků a příkopů podél cest se stojatou vodou se vyskytují různé druhy vrbovek (*Epilobium* spp.), sítin (*Juncus* spp.) a krabilic (*Chaerophyllum* spp.). Dále se vyskytuje např. *Alopecurus aequalis*, *Cardamine flexuosa*, *Mentha longifolia*, *Myosotis palustris*, *Ranunculus flammula*, *Scirpus sylvaticus* a *Stachys palustris*. Na jaře v blízkosti potoků rozkvétá *Cardamine amara*, *Corydalis cava*, *Dentaria glandulosa*, *Lathraea squamaria* a *Lysimachia nemorum*. Zřídka se objevuje *Carex pendula* a podél potoka Kopytná tvoří bohaté porosty *Petasites kablikianus*.

Štěrkové a písčité říční náplavy

Štěrkové a písčité náplavy jsou významné hlavně jako stanoviště mnoha druhů vrb, např. *Salix alba*, *S. fragilis*, *S. purpurea*, *S. viminalis* a vzácná *S. elaeagnos*. Časté jsou divizny *Verbascum densiflorum*, *V. nigrum*, *V. phlomoides* a *V. thapsus*. Dále na náplavech můžeme najít *Alopecurus aequalis*, *Barbarea vulgaris*, *Bidens frondosa*, *Conyza canadensis*, *Echium vulgare*, vrbovky (*Epilobium* spp.), *Erigeron annuus*, *Hypericum maculatum*, *H. tetrapterum*, *Leontodon hispidus*, *Melilotus albus*, a *Tussilago farfara*. Na náplavech se běžně vyskytují také různé zplanělé druhy, původně pěstované pro okrasu, např. *Oenothera glazioviana*, nebo druhy vyrostlé ze semen z kuchyňského odpadu, např. *Citrullus lanatus* a *Solanum lycopersicum*. Místy se nacházejí souvislé porosty křídlatky (*Reynoutria japonica*).

Podhorské a horské louky

Horské louky jsou velmi květnaté a druhově bohaté. Druhovná pestrost je zachována díky relativně šetrnému obhospodařování. Tyto louky jsou jednosečné a jen výjimečně jsou přepásány. Mezi typické luční druhy patří *Agrostis capillaris*, *Campanula patula*, *Carlina acaulis*, *Danthonia decumbens*, *Dianthus deltoides*, *Hieracium pilosella*, *Leucanthemum vulgare*, *Nardus stricta*, *Platanthera bifolia* a *Thymus pulegioides*.

Mezofilní louky a pastviny

Extenzivně obhospodařované louky v nižších polohách hostí chrpu *Centaurea erdneri* a také některé lokálně vzácnější druhy, např. *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *fuchsii*, *Danthonia decumbens*, *Gladiolus imbricatus*, *Listera ovata*, *Platanthera bifolia*, *Rhinanthus minor*, *Salvia pratensis* a *Sanguisorba minor* subsp. *minor*. Většina mezofilních luk je dvojsečná nebo trojsečná ročně; pastviny se celoročně vypásají. Ve srovnání s horskými a podhorskými loukami jsou méně květnaté a druhově méně bohaté. Nejčastějšími druhy na nich jsou *Agrostis capillaris*, *Ajuga reptans*, *Alopecurus pratensis*, *Anthoxanthum odoratum*, *Campanula patula*, *Cruciata laevipes*, *Cynosurus cristatus*, *Elytrigia repens*, *Leucanthemum vulgare*, *Leucanthemum ircutianum*, *Lolium perenne*, *Poa pratensis*, *Phleum pratense*, *Ranunculus repens* a *Vicia sepium*.

Vlhké louky

Vlivem odvodňovacích systémů zůstalo v území jen málo vlhkých nebo trvale podmáčených luk. Vyznačují se přítomností zejména ostřic, mj. *Carex nigra*, *C. pallescens*, *C. panicea* a *C. vesicaria*, a pcháčů *Cirsium palustre* a *C. rivulare*. Dále se na vlhkých loukách nachází např. *Eleocharis palustris*, *Equisetum palustre*, *Galium palustre*, *Juncus articulatus*, *J. effusus*, *J. inflexus*, *Myosotis nemorosa*, *Poa trivialis*, *Ranunculus flammula* a *Scirpus sylvaticus*. Na jaře rozkvétají *Caltha palustris*, *Chrysosplenium alternifolium* a *Dactylorhiza majalis*.

Pole

Plochy orné půdy mají ve studovaném území omezenou velikost. Mezi nejtypičtější polní plevely zde patří *Anagallis arvensis*, *Anthemis arvensis*, *Apera spica-venti*, *Centaurea cyanus*, *Galinsoga quadriradiata*, *Papaver rhoeas*. Druhy, se kterými se můžeme na polích ve studovaném území potkat jen sporadicky, jsou *Galinsoga parviflora*, *Sherardia arvensis* a *Valerianella dentata*.

Lesní lemy

V lesních lemech se vyskytují některé statné nebo nápadné druhy, mj. *Agrimonia eupatoria*, *Astragalus glycyphyllos*, *Betonica officinalis*, *Calamagrostis arundinacea*,

C. epigejos, *Clinopodium vulgare*, *Digitalis purpurea*, *Fragaria moschata*, *F. vesca*, *Genista tinctoria*, *Hypericum perforatum*, *H. maculatum*, *Knautia arvensis*, *Melampyrum nemorosum*, *Origanum vulgare*, *Rubus caesius*, *Salvia verticillata* a *Vinca minor*. Některé z nich se v jiných typech vegetace vyskytují jen vzácně.

Acidofilní bučiny

V acidofilních bučinách převládá *Fagus sylvatica* a doprovázejí jej další druhy, zejména *Acer pseudoplatanus* a *Quercus robur*, místy i smrk *Picea abies*. Keřové patro v těchto lesích obvykle schází. Bylinné patro tvoří např. *Athyrium filix femina*, *Avenella flexuosa*, *Carex remota*, *Hieracium murorum*, *Luzula luzuloides*, *Maianthemum bifolium*, *Oxalis acetosella*, *Poa nemoralis*, *Polygonatum verticillatum*, *Prenanthes purpurea*, *Senecio ovatus*, *Vaccinium myrtillus* a *Veronica officinalis*. Ve vyšších polohách k nim přistupují *Blechnum spicant*, *Dryopteris dilatata* a *Luzula sylvatica*.

Květnaté bučiny

V květnatých bučinách opět převládá buk *Fagus sylvatica*, který provází další druhy, zejména *Acer platanoides*, *A. pseudoplatanus*, *Carpinus betulus*, *Tilia cordata*, *T. platyphyllos* a *Ulmus glabra*, jakož i jedle *Abies alba*. V keřovém patře se nachází *Daphne mezereum* a na porostních okrajích *Corylus avellana*, *Sambucus nigra* nebo *S. racemosa*. Bylinné patro je druhově bohatší než u acidofilních bučin. Vyskytuje se v něm mj. *Actaea spicata*, *Dentaria bulbifera*, *D. glandulosa*, *Euphorbia amygdaloides*, *Fragaria moschata*, *Galeobdolon montanum*, *Galium odoratum*, *G. schultesii*, *Mercurialis perennis*, *Mycelis muralis*, *Paris quadrifolia*, *Salvia glutinosa*, *Sanicula europaea* a *Viola reichenbachiana*, vzácně též *Adoxa moschatellina*, *Dentaria enneaphyllos*, *Lilium martagon* a *Melica nutans*.

Dubohabřiny

Ve stromovém patře těchto lesů převládá *Carpinus betulus*. V bylinném podrostu se nachází mj. *Campanula persicifolia*, *C. rapunculoides*, *C. trachelium*, *Euphorbia amygdaloides*, *Fragaria vesca*, *Galium schultesii*, *Poa nemoralis* a *Viola reichenbachiana*. V jarním aspektu se uplatňuje *Anemone nemorosa*, *Carex digitata*, *Dentaria bulbifera*, *D. glandulosa*, *Isopyrum thalictroides*, *Lathyrus vernus*, *Polygonatum multiflorum*, *Primula elatior* a *Pulmonaria obscura*.

Sut'ové lesy

V sut'ových lesích převládají javory *Acer platanoides* a *A. pseudoplatanus* a dále *Carpinus betulus*, *Fagus sylvatica*, *Fraxinus excelsior*, *Tilia cordata* a *T. platyphyllos*. Keřové patro se podobá keřovému patru květnatých bučin. Tvoří je *Corylus avellana*, *Sambucus nigra*, *S. racemosa* a *Viburnum opulus*. Mezi druhy bylinného patra těchto lesů patří *Aruncus vulgaris*, *Campanula trachelium*, *Calamagrostis arundinacea*, *Galium odoratum*, *Geranium robertianum*, *Impatiens noli-tangere*, *Lamium maculatum*, *Mercurialis perennis*, *Polystichum aculeatum* a *Pulmonaria obscura*.

Odkaliště

Odkaliště je neobvyklý biotop kvůli specifickému substrátu. Ve stromovém patře převládají břízy *Betula pendula* a modřiny *Larix decidua*, které doprovázejí topoly *Populus alba*, *P. balsamifera*, *P. nigra* agg. a *P. tremula*. V keřovém patře, které je nejlépe vyvinuto kolem otevřené vodní plochy, se uplatňují vrby *Salix alba*, *S. caprea* a *S. purpurea*. V podmačené části odkaliště roste i *Salix pentandra*. V nezapojeném bylinném porostu se vyskytuje např. *Achillea millefolium*, *Arenaria serpyllifolia*, *Calamagrostis epigejos*, *Conyza canadensis*, *Epilobium angustifolium*, *E. dodonaei*,

Equisetum telmateia, *Erigeron annuus*, *E. macrophyllus*, *Festuca brevipila*, *Hypericum perforatum*, *Lathyrus sylvestris*, *Lupinus polyphyllus*, *Medicago lupulina*, *Potentilla anserina*, *Rubus caesius*, *Salvia verticillata*, *Silene vulgaris* subsp. *vulgaris*, *Solidago canadensis*, *Tanacetum vulgare*, *Thymus pulegioides* *Trifolium hybridum*, *T. repens*, *Tussilago farfara*, *Verbascum phlomoides* a *Vicia tetrasperma*. Vodní plochu lemují *Juncus compressus*, *Alopecurus aequalis* a zejména *Phragmites australis*. Za pozoruhodné druhy tohoto biotopu lze považovat *Centaurium erythraea*, *Epipactis atrorubens*, *E. palustris*, *Equisetum ramosissimum*, *E. variegatum*, *Monotropa hypophegea*, *Myriophyllum spicatum* a *Odontites vernus* subsp. *serotinus*.

Na základě literatury a vlastního terénního průzkumu bylo ve Vendryni a jejím širším okolí zjištěno 805 druhů cévnatých rostlin, z čehož výskyt 587 druhů jsem terénu ověřila nebo poprvé zaznamenala (tab. 1).

Tab. 1. Počty nalezených druhů
Tab. 1. Number of species found

	Údaje získané rešerší (Data from published sources)	Z toho nepotvrzeno (Not confirmed)	Terénní výzkum (Verified by field research)	Z toho nově nalezeno (Newly found)	Celkem v území (Totally in the surveyed area)
Počet druhů (Species number)	778	218	587	27	805

Ze všech 805 druhů je 12 nepůvodních druhů uvedeno jako přechodně zavlékané nebo přechodně zplaňující. Tyto druhy nejsou do počtů nepůvodních druhů zahrnuty, jelikož tvoří trvalou součást naší květeny.

Tab. 2. Nepůvodní druhy studovaného území a jejich klasifikace (PYŠEK et al. 2012). Použitá označení: ar – archeofyt, neo – neofyt, nat – zdomácnělý druh, inv – invazní druh.

Tab. 2. Non-native species of surveyed area and classification (PYŠEK et al. 2012). Used abbreviations: ar – archaeophyte, neo – neophyte, nat – naturalized, inv – invasive species.

Původ a zdomácnění (Origin and domestication)	Údaje získané rešerší (Data from published sources)	Z toho nepotvrzeno (Not confirmed species)	Terénní výzkum (Species verified by field research)	Z toho nově nalezeno (Newly found species)	Celkem v území (Species found in the surveyed area in total)	Podíl v květeně území (%) (Share in the flora of the surveyed area in %)
nat ar	76	22	58	4	80	10
inv ar	4	0	4	0	4	0,5
ar	79	22	61	4	83	10,5
nat neo	29	10	24	5	34	4,3
inv neo	22	7	18	3	25	3,2
neo	51	17	42	8	59	7,5
nat	104	32	81	9	113	14,3
inv	26	7	22	3	29	3,7
celkem nepůvodní	130	39	103	12	142	18

V území byla zaznamenána řada ohrožených druhů (tab. 3.) nejvíce druhů patřilo k taxonům vyžadujícím pozornost C4 (54 druhů) a k taxonům ohrožených druhů C3 (53 druhů).

Tab. 3. Počty ohrožených druhů ve studovaném území a jejich klasifikace (GRULICH 2012)
Tab. 3. The numbers of red listed vascular plants of surveyed area and their classification (GRULICH 2012)

Ohrožení (Threat)	Údaje získané rešerší (Data from published sources)	Z toho nepotvrzeno (Not confirmed species)	Terénní výzkum (Species verified by field research)	Z toho nově nalezeno (Newly found species)	Celkem v území (Species from red list in the surveyed area in total)
C1	18	16	2	0	18
C2	28	18	11	1	29
C3	53	24	29	0	53
C4	48	19	35	6	54

DISKUSE

Na základě dostupných dat bylo z oblasti známo 778 druhů. Nepodařilo se mi ověřit 218 druhů, zatímco jsem 27 nalezla nově (tab. 1).

Mnoho literárních údajů pochází především z Nýdku, kde se nachází Velká Čantoryje, nejvyšší vrchol Slezských Beskyd, jenž přitahoval botaniky mnohem více než zbytek studovaného území. Mezi pozoruhodné druhy z V. Čantoryje, které uvádí např. Král in SKALICKÝ et al. (1978), KOLBENHEYER (1862) a Kotschy a Uechtritz sec. FIEK (1881) lze zařadit např. *Antennaria dioica*, *Anthyllis vulneraria*, *Gnaphalium norvegicum*, *Trollius altissimus*. Tyto druhy se mi nepodařilo ověřit. Také okolí Horní a Dolní Lištné nezůstalo nepovšimnuto. Z Vendryně a Bystřice byl zaznamenáván výskyt převážně vzácnějších druhů. Mezi ně patří např.: *Blysmus compressus*, *Cypripedium calceolus*, *Gentiana asclepiadea*, *Gentiana cruciata*, *Gentiana pneumonanthe*, *Iris graminea*, *Pedicularis palustris*, *Spiranthes spiralis*. Tyto druhy zmiňuje např. KOLBENHEYER (1862), Ascherson, Uechtritz a Kotschy sec. FIEK (1881) a KILIÁN & KILIÁN (1956). Recentní výskyt byl ověřen pouze u *Gentiana cruciata* v D. Lištné.

Do souborného počtu 805 nalezených druhů jsem z různých důvodů nezařadila 94 taxonů, o jejichž výskytu v daném území existují údaje v literatuře nebo floristických databázích.

Nebyly započítány mylné nebo velmi pravděpodobně mylné údaje o výskytu druhů: *Angelica archangelica*, *Anthriscus cerefolium*, *Asperula cynanchica*, *Asplenium adiantum-nigrum*, *Bupleurum longifolium*, *Cardamine trifolia*, *Carduus nutans*, *Carex pseudocyperus*, *Centaureum pulchellum*, *Cephalanthera longifolia*, *Chamaecytisus ratisbonensis*, *Dactylorhiza maculata*, *Dryopteris cristata*, *Eleocharis mamillata* subsp. *mamillata*, *Festuca heterophylla*, *Fragaria viridis*, *Fumaria schleicheri*, *Galium rivale*, *G. sylvaticum*, *Genista pilosa*, *Geranium pratense*, *G. sylvaticum*, *Hieracium vulgatum*, *Hypericum montanum*, *Juncus atratus*, *Lycopodiella inundata*, *Lysimachia thyrsoiflora*, *Myosotis ramosissima*, *Nasturtium officinale*, *Orchis morio*, *O. tridentata*, *Phyteuma orbiculare*, *Polystichum lonchitis*, *Potamogeton pusillus*, *Primula veris*, *Prunella grandiflora*, *Pulmonaria officinalis*, *Pulsatilla vulgaris*, *Ranunculus nemorosus*, *Scrophularia vernalis*, *Senecio erraticus*, *Stellaria palustris*, *Trifolium alpestre*,

Valeriana dioica, *Viburnum lantana*, *Vicia sativa* a *Viola collina*. Při vymezování těchto taxonů jsem se řídila zejména údaji o jejich rozšíření, jak je uvádí Květena České republiky (HEJNÝ & SLAVÍK 1990, 1992, 1997; SLAVÍK & ŠTĚPÁNKOVÁ 2004; SLAVÍK 1995, 1997, 2000; ŠTĚPÁNKOVÁ 2010) a další publikované zdroje např. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce (ZAJĄC & ZAJĄC 2001) a také výsledkem konzultací s dr. Danihelkou a dalšími členy Ústavu botaniky a zoologie, jakož i informacemi od regionálních expertů. Např. pokud jde o výskyt černohlávků velkokvětého *Prunella grandiflora* a pryskyřníku velkého *Ranunculus lingua* ve Vendryni, které v databázi NDOP uvádí Hustáková, jde jednoznačně o determinální chyby (Hustáková, in litt.). Mezi druhy, které považuji za mylné na základě rozšíření druhů v Květeně ČR (HEJNÝ & SLAVÍK 1990, 1992, 1997; SLAVÍK & ŠTĚPÁNKOVÁ 2004; SLAVÍK 1995, 1997, 2000; ŠTĚPÁNKOVÁ 2010) patří např. *Asplenium adiantum-nigrum*, který uvádí Zlík in Oborný sec. SCHUBE (1903–1904), *Asperula cynanchica* a *Fumaria schleicheri* zaznamenané J. Vicherekem sec. ZATLOUKAL (1969), *Anthriscus cerefolium* a *Myosotis ramosissima* uváděné ZATLOUKALEM (1969) a další. Sem zčásti patří i údaje o výskytu chrp: *Centaurea jacea* evidovaná R. Kočvarou & A. Czerníkem in NDOP a *C. jacea* subsp. *oxylepis* zmiňovaná např. J. Vicherekem in SKALICKÝ et al. (1978). Ve skutečnosti se údaje pravděpodobně vztahují k druhu *C. erdneri*, který byl rozlišen a popsán teprve nedávno nebo k jeho křížencům.

Dále do celkového počtu nebyly zahrnuty nálezy určené jen do úrovně druhových agregátů, pokud byl zaznamenán alespoň jeden druh, který do příslušného agregátu patří.

Ve výsledném součtu není zahrnuto ani 17 nahodile se vyskytujících kříženců, a to *Arctium* × *ambiguum*, *Centaurea* × *melanocalathia*, *Centaurea erdneri* × *C. jacea* subsp. *oxylepis*, *Centaurea erdneri* × *C. jacea* × *C. jacea* subsp. *oxylepis*, *Cirsium* × *subalpinum*, *C.* × *subspinuligerum*, *C.* × *sessile*, *Crataegus* × *macrocarpa* × *C. praemonticola*, *C. laevigata* × *C.* × *media*, *Dianthus* × *helwigii*, *Dryopteris* × *ambroseae*, *Dryopteris* × *tavelii*, *Orchis* × *lorenziana*, *Polystichum* × *luerssenii*, *Salix* × *subcaprea*, *Tilia* × *vulgaris* a *Verbascum* × *brockmuelleri*. Kříženci většinou nepředstavují trvalou součást květeny.

Jelikož jsem při výzkumu pomíjela pěstované rostliny, a to jak na zahrádkách, tak na polích, nezahrnuji do souhrnných počtů ani dřívě nalezené druhy: *Aconitum lycoctonum* (KOLBENHEYER 1862), *Asparagus officinalis* (Mladý in SKALICKÝ et al. 1978), *Butomus umbellatus* (Hlisnikovský in Excerpta pro atlas), *Cichorium endivia* (Mladý in SKALICKÝ et al. 1978), *Hieracium aurantiacum* (nalezený recentně v průběhu mého průzkumu), *Iris pseudacorus* (Višňák in NDOP), *Lunaria annua*, *Primula vulgaris* subsp. *vulgaris* (oba nalezené recentně v průběhu mého průzkumu), *Myricaria germanica* (domácí druh, ale ve zpracovávaném území jen vysazený, dokladoval ZATLOUKAL (1969)), jakož i pěstované jedince rodu *Nymphaea* sp. (RYDLO 2010) a *Ranunculus lingua* (nalezený recentně v průběhu mého průzkumu). Rovněž pomíjím zplanělý výskyt melounu *Citrullus lanatus* a mastňáku *Guizotia abyssinica* (Hlisnikovský in ND MSP ČBS) a jednorázově zavlečenou diviznu *Verbascum phoeniceum* (KILIÁN & KILIÁN 1956), jelikož zde tento druh přirozeně neroste ani se nepěstuje (Hlisnikovský in litt.).

Poslední skupina druhů, která není zahrnuta v konečných součtech, sdružuje rostliny, u kterých je vzhledem k charakteru údajů málo pravděpodobné, že se skutečně nacházely ve studovaném území, byť jejich výskyt v minulosti nelze s jistotou vyloučit. Týká se druhů *Aconitum variegatum*, *Coeloglossum viride*, *Corallorhiza trifida*, *Cruciata glabra*, *Dactylorhiza incarnata*, *Hieracium cymosum*, *Hypochaeris glabra*,

Listera cordata, *Orchis militaris*, *Polygonatum odoratum* a *Stachys annua*. Tyto druhy např. uvádí KOLBENHEYER (1862), WIMMER (1832, 1841), FIEK (1881), SCHUBE (1903–1904).

Celkově jsem neověřila 218 druhů, o jejichž výskytu jsem měla důvěryhodné informace. Sem patří druhy, které ze studovaného území téměř jistě vymizely, což je např. střevíčník *Cypripedium calceolus*. Z Horní i Dolní Lištné a Vendryně jej zmiňují a někteří botanici také dokladují, např. KOLBENHEYER (1862), KILIÁN & KILIÁN (1956), MÍČKOVÁ (1958) a Liberdová, Olšanská, Krkavec sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996).

Větší skupinu však jistě představují četné rostliny, které byly při terénním průzkumu přehlédnuty z důvodu nedostatečné floristické erudice – často jde o méně nápadné nebo obtížněji určitelné rostliny, především z rodů *Carex*, *Chenopodium*, *Hieracia* a *Rumex*. Studované území je navíc rozsáhlé, a tak nebylo možné jej prozkoumat důkladně po celé ploše. Nepotvrdila jsem tak např. lokality s výskytem suchopýru úzkolistého (*Eriophorum angustifolium*), které zaznamenal ZATLOUKAL (1969) a Hustáková in NDOP nebo vrance jedlového (*Huperzia selago*), kterého evidovali Uechtritz sec. FIEK (1881) a KUDĚLOVÁ (1997).

V území jsem naopak zapsala mnoho nových lokalit u druhů v území již dříve nalezených např. Z. Kiliánem (KILIÁN 1960), WIMMEREM (1832), SCHUBEM (1903–1904), ZATLOUKALEM (1969) a KUDĚLOVOU (1997). Jedná se např. o krušík tmavočervený (*Epipactis atrorubens*) a hruštičku okrouhlostou (*Pyrola rotundifolia*) na odkališti v D. Lištné, o hruštičku menší (*Pyrola minor*) v D. Lištné a v Nýdku, mečík střechovitý (*Gladiolus imbricatus*) v Bystřici a ve Vendryni a voskovku menší (*Cerinth minor*) ve Vendryni.

Dále jsem zaznamenala 27 druhů zcela nově, např. *Apera spica-venti*, *Epilobium lamyi*, *Erigeron macrophyllus*, *Hieracium glomeratum*, *Monotropa hypophaea*, *Silene noctiflora* a *Veronica filiformis*. Jedná se o druhy, které mohly být v minulosti zaměňovány nebo se v území nachází velmi vzácně, a proto ještě nebyly dosud nikým zaznamenány.

V tab. 2 je ze 793 druhů 142, tedy 18 %, nepůvodních (zdomácnělých a invazních), což je o něco víc, než činí podíl nepůvodních druhů z celkového počtu druhů květeny České republiky, kde je jich 16,1 % (DANIHELKA 2013). Největší podíl nepůvodních druhů z květeny studovaného území mají zdomácnělé archeofyty, a to 10 %. Ve studovaném území je ze zdomácnělých a invazních rostlin 58,5 % archeofytů a 41,5 % neofytů. Podíl archeofytů k neofytům v květeně České republiky je 45,4 % ku 54,6 % (DANIHELKA 2013). V květeně České republiky je tedy více neofytů nežli archeofytů, kdežto v květeně studovaného území je tomu právě naopak. Z toho soudím, že květena studovaného území není natolik ovlivněna neofytizací jako květena celé České republiky. Šíření neofytů je možné hlavně podél železnice a silnice táhnoucí se na Slovensko, ty však vedou územím paralelně vedle sebe. Dále se v území kromě odkaliště nenachází žádné větší degradované plochy. Rumištní stanoviště, v těsné blízkosti Třineckých železáren, budou obohacena o mnohé další neofyty, které ve studovaném území zatím schází. V přírodě blízkém charakteru zbývajících biotopů pak neofyty nemají tolik možností vytlačit původní druhy.

Z invazních rostlin (tab. 2) jsem ověřila výskyt čtyř archeofytů uvedených i v jiných zdrojích, např. Láníková-Simonová, Kropáč, Cimalová in ČNFD, Vicherek, Král a Mladý in SKALICKÝ et al. (1978) a LADÁNYI (2008), a žádný nenašla nově. V území roste hojně *Arrhenatherum elatius* subsp. *elatius*, *Cirsium arvense*, *Echinochloa crus-galli* a jen na odkališti *Eragrostis minor*. Z invazních neofytů jsem

dokladovala tři druhy nově, zatímco výskyt sedmi se mi nepodařilo ověřit. Mezi nově zaznamenané patří *Ambrosia artemisiifolia*, *Aster novi-belgii* a *Prunus serotina*. Naopak mezi neověřenými zůstává *Reynoutria sachalinensis* (uvádí např. Mladý a Král in SKALICKÝ et al. 1978), která se v území vyskytuje pravděpodobně jen ojediněle. Oproti tomu *R. japonica* je dosti hojná. V terénu jsem nenarazila ani na loubinec *Parthenocissus inserta*, který zaznamenali Kočvara & Czernik in NDOP a jenž kdysi pravděpodobně zplaněl ze zahrádky na krátkém úseku Kopytné.

Výrazně ubylo druhů z kategorií kriticky ohrožených druhů (C1) a silně ohrožených druhů (C2), ve srovnání s počtem uváděných v minulosti. Naopak výskyt větší části druhů z kategorie ohrožených druhů (C3) a vzácnějších druhů vyžadujících další pozornost (C4) byl v terénu ověřen (tab. 3.). Druhy z těchto kategorií publikovali např. KOLBENHEYER (1862), SCHUBE (1903–1904), ZATLOUKAL (1969), KILIÁN (1969), JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996), KRZYŽANKOVÁ (2004), LADÁNYI (2008). Z kriticky ohrožených druhů (C1) jsem zaznamenala jelení jazyk celolistý (*Phyllitis scolopendrium*), který tvoří rozsáhlou populaci při potoce na hranici vsí Vendryně a Dolní Lištné (HÁJKOVÁ 2005), a třtinu pobřežní (*Calamagrostis pseudophragmites*), kterou evidovala Hustáková in NDOP, Šigutová FMM a Hlisnikovský FMM sec. POPELÁŘOVÁ et al. (2011)

Vzácné polní plevely *Bromus secalinus* a *Silene gallica* ustoupily pravděpodobně v důsledku změn agrotechniky. Oba byly poprvé zaznamenány Aschersonem sec. FIEK (1881) a naposledy v 1975 během floristického kursu (SKALICKÝ et al. 1978). *Malaxis monophyllos* a *Spiranthes spiralis* jsou citlivé druhy z čeledi vstavačovitých, které vymizely zřejmě v důsledku lidských zásahů do jejich biotopů, jakými jsou např. odvodnění luk a zánik dřívějších pastvin.

Ze silně ohrožených druhů (C2) jsem potvrdila výskyt dříve nalezeného kruštíku drobnolistého (*Epipactis microphylla*; Ladányi in litt.), vstavače mužského znamenaného (*Orchis mascula* subsp. *signifera*) a vstavače bledého (*O. pallens*), který zde má jednu z největších populací na severní Moravě a ve Slezsku. Oba druhy vstavačů eviduje a zároveň také dokladuje mnoho autorů např. KILIÁN & KILIÁN (1956), Hájková FMM, Burša CESK i FMM, Raszka OP sec. JATIOVÁ & ŠMITÁK (1996) a LADÁNYI (2008). Potvrdila jsem také hořec křížatý (*Gentiana cruciata*), jehož výskyt poprvé od Lištné uvádí KOLBENHEYER (1862), později z Jahodné i KILIÁN & KILIÁN (1956), KILIÁN (1969) a V. Skalický in SKALICKÝ et al. (1978). Lokality z Horní Lištné a Vendryně, kde je zmiňují např. Uechtritz sec. FIEK (1881) a rovněž KILIÁN 1969 a Skalický in SKALICKÝ et al. (1978), už nebyly později potvrzeny. Ze silně ohrožených druhů roste na odkališti v D. Lištné *Epipactis palustris*, kde ho zapsal i V. LADÁNYI (2008). Historický údaj o jeho výskytu, ještě před vznikem odkaliště, pochází také z Bystřice (1889 Schube in SCHUBE 1903–1904). Dále je z odkaliště známa *Equisetum ramosissimum* a *E. variegatum* (obojí uvádí např. Hlisnikovský 2006 FMM sec. HADINEC & LUSTYK 2007). Poprvé jsem také z odkaliště zaznamenala hnilák lysý (*Monotropa hypophaea*) a hrůštičku okrouhlostou (*Pyrola rotundifolia*). Odkaliště je člověkem vytvořené druhotné stanoviště, které v době průzkumů v minulém i předminulém století neexistovalo a dnes představuje relativně nerušené refugium těchto druhů. Podél potoka Kopytná roste *Salix elaeagnos*, kterou zaznamenali již na počátku 20. století Formánek sec. SCHUBE (1903–1904) a OTRUBA (191925–192626), novější nálezy pak uvádějí LADÁNYI (2008) a Kočvara & Czernik in NDOP. *Salix elaeagnos* se v ČR vyskytuje převážně jen ve Slezsku např. také podél toků Lomná a řeky Ostravice (Vašut in Excerpt pro atlas a FLDOK). Vzácně na vlhkých

loukách roste *Gladiolus imbricatus*, kterou např. z Nýdku zmiňuje WIMMER (1832) už v 19. stol.

Z ohrožených druhů (C3) stojí za zmínku kruštík modrofialový (*Epipactis purpurata*), který jsem na lokalitě uváděné KRZYŽANKOVOU (2004) zaznamenala v roce 2014 v počtu tří jedinců, a kruštík tmavočervený (*Epipactis atrorubens*), historicky známy z D. Lištné (KILIÁN 1960) a recentně nalezený z nové lokality na odkališti během floristického minikurzu v červnu 2018 (TKÁČIKOVÁ in prep.). Dále se v území vzácně nachází např. *Hypericum humifusum* (uvádí např. Král in SKALICKÝ et al. 1978), *Lycopodium clavatum* (ZATLOUKAL 1969), *Pyrola minor* (KUDĚLOVÁ 1997) a *Valeriana simplicifolia* (Sedláčková NJM sec. HÁJKOVÁ & PRYMUSOVÁ 2011). Ze vzácnějších druhů vyžadujících další pozornost (C4) bych zmínila ustupující voskovku menší (*Cerinth minor*), lokálně velmi vzácnou lilii zlatohlavou (*Lilium martagon*), parazitický hlístník hnízdák (*Neottia nidus-avis*) a silenku noční (*Silene noctiflora*), kterou jsem v území našla pouze jednou.

Pozoruhodný je i výskyt některých běžnějších druhů. Například *Anemone ranunculoides*, převažující v teplejších oblastech, se v okolí Vendryně vyskytuje jen zřídka, zatímco *A. nemorosa* je běžnější. Na skalních výchozech, které nejsou v území časté, roste zřídka *Asplenium trichomanes* a na kamenné zídce kolem dřevěného kostela v Bystřici i *A. ruta-muraria*. Vzácnost těchto dvou petrofytů je dána především nedostatkem přirozených i umělých stanovišť. Ve vlhkých lesních průsecích se vzácně objevuje vřes *Calluna vulgaris*, který celkově ustupuje v důsledku eutrofizace krajiny, jelikož vyžaduje kyselé půdy s minimem živin. Ve zkoumaném území jsou také vzácnější druhy rostoucí na loukách, např. *Danthonia decumbens*, *Polygala vulgaris*, které uvádí také Král in SKALICKÝ et al. (1978) a *Gagea lutea*, zmiňovaná také ZATLOUKALEM (1969) a KUDĚLOVOU (1997), rostoucí i v lese podél Olše. Na polích se vzácně objevují *Centaurea cyanus* a *Sherardia arvensis*, publikované např. ZATLOUKALEM (1969), J. Vicherkem, F. Mladým a V. Skalickým in SKALICKÝ et al. (1978). Také je uvádějí Burša a Hájková FMM, Sedláčková NJM a Čáp OLM sec. CIMALOVÁ 2006.

Flóra studovaného území je relativně bohatá, ale lokalit s výskytem ohrožených druhů nebo lokálně vzácnějších druhů ubývá. Pravděpodobně ustupují i druhy, které byly dle záznamů z literatury kdysi hojné, např. kmín *Carum carvi*, který uvádí např. Vicherek, Mladý a Král in SKALICKÝ et al. (1978). Tyto druhy jsou zřejmě nahrazovány konkurenčně silnějšími druhy, které najdeme téměř na všech lokalitách dotyčného biotopu.

SOUHRN

Tato práce pojednává o cévnatých rostlinách Vendryně a sousedních vsí a zahrnuje primárně výsledky vzniklé na základě rešerší a terénního průzkumu v letech 2012–2015 v obcích Vendryně, Bystřice, Nýdek a třineckých městských částí Dolní Lištná a Horní Lištná. Údaje o výskytu jednotlivých druhů jsou doplněny o data z databáze Pladias a o pozdější terénní nálezy do srpna roku 2018. Celé studované území se nachází v základním poli 6378 středoevropského síťového mapování.

V článku jsou ve zkratce popsány přírodní poměry studovaného území z hlediska geologického, geomorfologického, klimatického, pedologického a potenciální a současná vegetace. Většina území spadá do fytogeografického podokresu 84a. Beskydské podhůří, jen vrchy Malý Kozinec a Žďár patří do podokresu

99a. Radhošťské Beskydy, zatímco hřeben Slezských Beskyd tvoří samostatný podokres 99b. Slezské Beskydy (Skalický in HEJNÝ & SLÁVÍK 1997).

Na základě publikovaných dat a vlastního terénního průzkumu bylo v území zjištěno 805 druhů, z toho 27 nově vlastním terénním výzkumem. Do tohoto počtu nebylo z různých důvodů zahrnuto 94 taxonů získaných převážně z literárních zdrojů; nejčastěji se jedná o mylné údaje. V květeně území připadá na nepůvodní druhy 18 %, z čehož představují 14,3 % zdomácnělé a 3,7 % invazní druhy.

Pokud jde o druhy z červeného seznamu ohrožených druhů (C1, C2, C3, C4), řada z nich byla při terénních průzkumech nalezena, některé naopak již z území vymizely. Významné je ověření některých druhů z rodů *Orchis* a *Epipactis*, jakož i výskyt např. *Cerinth minor*, *Gentiana cruciata*, *Gladiolus imbricatus*, *Equisetum ramosissimum*, *E. variegatum*, *Pyrola minor*, *P. rotundifolia* a *Phyllitis scolopendrium*.

Mezi druhy v území zcela nově nalezené patří např. *Apera spica-venti*, *Epilobium lamyi*, *Erigeron macrophyllus*, *Hieracium glomeratum*, *Monotropa hypophaea*, *Silene noctiflora* a *Veronica filiformis*.

Dokladový herbář je uložen v herbáři Masarykovy univerzity. Texty herbářových sched jsou dostupné v centrální herbářové databázi Virtual Herbaria (HERBARIUM WU 2018).

Poděkování: Chtěla bych tímto poděkovat dr. J. Danihelkovi za velice vstřícný přístup, ochotu a všechny cenné rady při psaní tohoto článku.

LITERATURA

- AOPK ČR 2009: Portál informačního systému ochrany přírody. Mapomat [online]. Dostupné z WWW: <<http://geoportal.gov.cz>> [cit. 18.II.2015].
- BÁRTOVÁ E. & VAŠUT R. 2011: Rozšíření vrby lýkovec (Salix daphnoides Vill.) na Moravě a ve Slezsku. Acta Carpathica Occidentalis, 2: 3–10.
- CIMALOVÁ Š. 2006: Historické a recentní rozšíření vzácných druhů polních plevelů severní a střední Moravy a Slezska. Časopis Slezského zemského Muzea Opava (A), 55: 165–192.
- CULEK M. (ed.) 1996: Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha, 347 pp.
- CULEK M., BUČEK A., GRULICH V., HARTL P., HRABICA A., KOCIÁN J., KYJOVSKÝ Š. & LACINA J. 2005: Biogeografické členění České republiky. II. díl. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 589 pp.
- ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA 2012: Geologické lokality [online]. Dostupné z WWW: <<http://lokality.geology.cz/d.pl?item=1>> [cit. 18.II.2015].
- DANIHELKA J. 2013: Botanické součty, rozdíly a podíly. Živa, 60: 69–71.
- DANIHELKA J., CHRTEK J. & KAPLAN Z. 2012: Checklist of vascular plants of the Czech Republic. Preslia, 84: 647–811.
- DANIHELKA J., PETŘÍK P. & WILD J. 2009: Databanka flóry České republiky [online]. Dostupné z WWW: <<http://florabase.cz/databanka/index.php>> [cit. 5.XI.2018].
- DEMEK J. & MACKOVČIN P. (eds) 2006: Hory a nížiny: Zeměpisný lexikon ČR. 2. vydání. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno, 582 pp.
- DUDA J. 1959: Příspěvek ke květeně Těšínska a Beskyd II. Časopis Slezského Muzea Opava (A), 8: 64.
- DUCHOSLAV M. & KRAHULEC F. 2009: Rozšíření druhů rodu česnek (Allium) v České republice. IV. druhy sekce Allium (A. scorodoprasum, A. rotundum). Zprávy České Botanické Společnosti, 44: 53–88.
- DUCHOSLAV M. & KRAHULEC F. 2012: Rozšíření druhů rodu česnek (Allium) v České republice. V. druhy sekce Allium (A. sphaerocephalon, A. vineale). Zprávy České Botanické Společnosti, 47: 11–41.
- ESRI 2013: Environmental Systems Research Institute. ARCDATA ArcGIS Desktop Release 10.2 [online]. Dostupné z WWW: <<https://www.esri.com/en-us/store/arcgis-desktop>> [cit. 20.XI.2018].
- FIEK E. 1881: Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Antheils, enthaltend die wildwachsenden, verwilderten und angebauten Phanerogamen und Gefässs-Cryptogamen. Kern Verlag, Breslau, 571 pp.
- FORMÁNEK E. 1887: Květena Moravy a rakouského Slezska. Vol. 1. Nákladem vlastním, Brno, 864 pp.
- GRULICH V. 2012: Red List of vascular plants of the Czech Republic. 3rd edition. Preslia, 84: 631–645.


- HADINEC J. & LUSTYK P. (eds) 2007: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. VI. Zprávy České Botanické Společnosti, 42: 247–337.
- HADINEC J., LUSTYK P. & PROCHÁZKA F. (eds) 2002: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. I. Zprávy České Botanické Společnosti, 37: 51–105.
- HADINEC J., LUSTYK P. & PROCHÁZKA F. (eds) 2004: Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. III. Zprávy České Botanické Společnosti, 39: 63–130.
- HÁJKOVÁ A. & PRYMUSOVÁ Z. 2011: Příspěvek k rozšíření karpatského druhu kozlíku celolistého (*Valeriana simplicifolia*) na území severovýchodní Moravy a Slezska. Acta Musei Beskidensis, 3: 31–48.
- HÁJKOVÁ A. 1989: Vegetace státní přírodní rezervace Čantoria (Slezské Beskydy). Časopis Slezského zemského muzea Opava (A), 38: 165–171.
- HÁJKOVÁ A. 2005: Poznámky k výskytu jeleního jazyku celolistého (*Phyllitis scolopendrium*) v Podbeskydské pahorkatině. Práce a Studie Muzea Beskyd, Přírodní Vědy, 15: 163–167.
- HEJNÝ S. & SLAVÍK B. (eds) 1990: Květena České republiky 2. Academia, Praha, 540 pp.
- HEJNÝ S. & SLAVÍK B. (eds) 1992: Květena České republiky 3. Academia, Praha, 542 pp.
- HEJNÝ S. & SLAVÍK B. (eds) 1997: Květena České republiky 1. (2. vydání). Academia, Praha, 557 pp.
- HERBARIUM WU 2018: Virtual Herbaria JACQ, Institute of Botany University of Vienna, Austria [online]. Dostupné z WWW: <http://herbarium.univie.ac.at/database/search.php> [cit. 20.XI.2018].
- HRUBAN R. 2015: Moravské Karpaty.cz [online]. Dostupné z WWW: <http://moravske-karpaty.cz/> [cit. 18.II.2015].
- JAROŠOVÁ L. 2006: *Pulmonaria obscura* a *P. officinalis* v České republice. [Diplomová práce]. Depon. in: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 64 pp. [online]. Dostupné z WWW: <https://is.muni.cz/th/rlnmr2/DP.pdf> [cit. 5.XI.2018].
- JATIOVÁ M. & ŠMITÁK J. 1996: Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha. 539 pp.
- KAPLAN Z., DANIHELKA J., ŠTĚPÁNKOVÁ J., BUREŠ P., ZÁZVORKA J., HROUDOVÁ Z., DUCHÁČEK M., GRULICH V., ŘEPKA R., DANČÁK M., PRANČL J., ŠUMBEROVÁ K., WILD J. & TRÁVNÍČEK B. 2015: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. Preslia, 87: 417–500. [citováno jako PLADIAS 1].
- KAPLAN Z., DANIHELKA J., ŠTĚPÁNKOVÁ J., EKRT L., CHRTEK J. jr., ZÁZVORKA J., GRULICH V., ŘEPKA R., PRANČL J., DUCHÁČEK M., KÚR P., ŠUMBEROVÁ K. & BRŮNA J. 2016a: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 2. Preslia, 88: 229–322. [citováno jako PLADIAS 2].
- KAPLAN Z., DANIHELKA J., LEPŠÍ M., LEPŠÍ P., EKRT L., CHRTEK J. jr., KOCIÁN J., PRANČL J., KOBRLOVÁ L., HRONEŠ M. & ŠULC V. 2016b: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 3. Preslia, 88: 459–544. [citováno jako PLADIAS 3].
- KAPLAN Z., DANIHELKA J., KOUTECKÝ P., ŠUMBEROVÁ K., EKRT L., GRULICH V., ŘEPKA R., HROUDOVÁ Z., ŠTĚPÁNKOVÁ J., DVORÁK V., DANČÁK M., DŘEVOJAN P. & WILD J. 2017a: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 4. Preslia, 89: 115–201. [citováno jako PLADIAS 4].
- KAPLAN Z., DANIHELKA J., ŠUMBEROVÁ K., CHRTEK J. JR., ROTREKLOVÁ O., EKRT L., ŠTĚPÁNKOVÁ J., TARAŠKA V., TRÁVNÍČEK B., PRANČL J., DUCHÁČEK M., HRONEŠ M., KOBRLOVÁ L., HORÁK D. & WILD J. 2017b: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 5. Preslia, 89: 333–439. [citováno jako PLADIAS 5].
- KAPLAN Z., KOUTECKÝ P., DANIHELKA J., ŠUMBEROVÁ K., DUCHÁČEK M., ŠTĚPÁNKOVÁ J., EKRT L., GRULICH V., ŘEPKA R., KUBÁT K., MRÁZ P., WILD J. & BRŮNA J. 2018a: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 6. Preslia, 90: 235–346. [citováno jako PLADIAS 6].
- KAPLAN Z. (ed.) in prep.: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 7. Preslia, 91. [citováno jako PLADIAS 7].
- KILIÁN Z. & KILIÁN O. 1956: Zpráva o floristickém průzkumu Těšínska. Přírodovědný Sborník Ostravského Kraje, 27: 289–290.
- KILIÁN Z. 1960: Floristický průzkum Těšínských Beskyd. Těšínsko, 3/14–15: 29–31.
- KILIÁN Z. 1969: Nejvýznačnější a vzácné rostliny Těšínska. Poznej a chraň. Zpravodaj severomoravského obvodu sboru ochrany přírody, 5: 27–29.
- KOCIÁN P., HLISNIKOVSKÝ D. & TKÁČIKOVÁ J. 2014: Několik nálezů rozhodníku španělského (*Sedum hispanicum*) na severovýchodě ČR. Zprávy Moravskoslezské Pobočky České Botanické Společnosti, 3: 47–49.
- KOLBENHEIMER K. 1862: Vorarbeiten zu einer Flora von Teschen und Bielitz. Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien, 12: 1185–1220.
- KOLLÁROVIČOVÁ M. 2011: Rozšíření druhů *Veronica austriaca*, *V. prostrata* a *V. teucrium* v České republice. [Diplomová práce]. Depon. in: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 106 pp.

- KOŽDOŇOVÁ N. 2015: Květena Vendryně a sousedních vsí. [Diplomová práce]. Depon. in: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 237 pp. [online]. Dostupné z WWW: <https://is.muni.cz/th/380313/prif_m/> [cit. 5.XI.2018].
- KRZYŽANKOVÁ B. 2004: Ohrožené druhy a flora Jahodné (Dolní Lištná). [Diplomová práce]. Depon. in: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, 126 pp.
- KUBÁT K., HROUDA L., CHRTEK J. jr., KAPLAN Z., KIRSCHNER J. & ŠTĚPÁNEK J. (eds) 2002: Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha, 928 pp.
- KUDĚLOVÁ J. 1997: Rostlinná společenstva lesní vegetace Slezských Beskyd. [Diplomová práce]. Depon. in: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 132 pp.
- LADÁNYI V. 2008: Floristicko-fytoecenologický průzkum ruderální vegetace antropogenně vytvořeného území (odkaliště) v Třinci–Dolní Lištné. [Práce středoškolské odborné činnosti]. Depon. in: Střední škola zemědělská, Český Těšín, 47 pp. [online]. Dostupné z WWW: <<https://is.muni.cz/publication/1423263?studium=694690;vysledek=56664>> [cit. 5.XI.2018].
- MÍČKOVÁ R. 1958: Příspěvek ke květeně Těšínska a Beskyd. Časopis Slezského Musea Opava, 7: 64.
- MOLTAŠOVÁ H., ROTREKLOVÁ O., DANIHELKA J., GOTTSCHLICH G. & CHRTEK J. jr. 2014: Jestřábník hroznatý (*Hieracium racemosum*) v České republice. Zprávy České Botanické Společnosti, 49: 26–27.
- NEUHÄUSLOVÁ Z., BLÁŽKOVÁ D., GRULICH V., HUSOVÁ M., CHYTRÝ M., JENÍK J., JIRÁSEK J., KOLBEK J., KROPÁČ Z., LOŽEK V., MORAVEC J., PRACH K., RYBNÍČEK K., RYBNÍČKOVÁ E. & SÁDLO J. (eds) 1998: Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Academia, Praha, 341 pp.
- ONDRASZEK B. 2004: Vendryně. Beskydy, Český Těšín, 174 pp.
- OTRUBA J. 1925–1926: Úvod ku květeně československého Slezska. Vlastivědný Sborník Slezský, Opava, 1: 35–50, 2: 283–396.
- PODPĚRA J. 1949: Jak proniká teplobytná květena do údolí jesenických a beskydských. Přírodovědný Sborník Ostravského Kraje, 10: 81–95.
- PODPĚRA J. 1921: Úvod ku květeně na československém Poodří. Sborník Přírodovědecké Společnosti v Moravské Ostravě, 1: 1–69.
- PODPĚRA J. 1927: Květena Moravy. Vol. 6/2. Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti, 2/10: 1–512.
- POPELÁŘOVÁ M., HLISNIKOVSÝ D., KOUTECKÝ P., DANČÁK M., TKÁČIKOVÁ J., VAŠUT R. J., VYMAZALOVÁ M., DVORSKÝ M., LUSTYK P. & OHRYZKOVÁ L. 2011: Rozšíření vybraných taxonů cévnatých rostlin v CHKO Beskydy a blízkém okolí (Výsledky mapování flóry z let 2006–2009). Zprávy České Botanické Společnosti, 46: 277–359.
- PYŠEK P., DANIHELKA J., SÁDLO J., CHRTEK J. jr., CHYTRÝ M., JAROŠÍK V., KAPLAN Z., KRAHULEC F., MORAVCOVÁ L., PERGL J., ŠTAJEROVÁ K. & TICHÝ L. 2012: Catalogue of alien plants of the Czech Republic: checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. 2. Preslia, 84: 155–255.
- QUITT E. 1971: Klimatické oblasti Československa. Studia Geographica, Brno, 16: 1–74.
- RYDLO J. 2010: Vodní makrofyt ve Slezských Beskydech a v Jablunkovském mezihoří. Muzeum a Současnost. Řada Přírodovědná, 25: 222–226.
- SEZNAM.CZ 2015: Mapy.cz [online]. Dostupné z WWW: <<http://mapy.cz/>> [cit. 18.II.2015].
- SCHUBE T. 1903–1904: Die Verbreitung der Gefäßpflanzen in Schlesien. Breslau, 240 pp.
- SKALICKÝ V. 1997: Regionální fytogeografické členění. In: HEJNÝ S. & SLAVÍK B. (eds): Květena České republiky 1. Academia, Praha, pp. 121.
- SKALICKÝ V., HÁJKOVÁ A., NEUSCHLOVÁ Š., SEDLÁČKOVÁ M. & ŠVENDOVÁ K. (eds) 1978: Materiály ke květeně Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a okrajové části Ostravské pánve. Práce a Studie Okresního Vlastivědného Muzea Frýdek-Místek, 3: 1–245.
- SLAVÍK B. & ŠTĚPÁNKOVÁ J. (eds) 2004: Květena České republiky 7. Academia, Praha, 767 pp.
- SLAVÍK B. (ed.) 1995: Květena České republiky 4. Academia, Praha, 529 pp.
- SLAVÍK B. (ed.) 1997: Květena České republiky 5. Academia, Praha, 568 pp.
- SLAVÍK B. (ed.) 2000: Květena České republiky 6. Academia, Praha, 770 pp.
- SLAVÍK B., CHRTEK J. jr. & TOMŠOVIC P. (eds) 1997: Květena České republiky. 5. Academia, Praha, 568 pp.
- ŠMARDA J. 1956: Význam Moravské brány pro migraci teplomilných rostlin z panonské oblasti do Slezské nížiny. Časopis Slezského Musea, 5: 57–69.
- ŠTĚPÁNKOVÁ J. (ed.) 2010: Květena České republiky 8. Academia, Praha, 706 pp.
- TKÁČIKOVÁ J. (ed.) in prep.: Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti ve Slezských Beskydech a Jablunkovském mezihoří (22–24. června 2018). Zprávy Moravskoslezské Pobočky České Botanické Společnosti.
- TOMÁŠEK M. 2000: Půdy České republiky. 2. Český geologický ústav, Praha, 67 pp.
- WIMMER F. & GRABOWSKI H. 1829: Flora Silesiae. XVI–XXII. Vol. 2/2. G. T. Korn, Vratislaviae, 400 pp.
- WIMMER F. 1832: Flora von Schlesien: Handbuch Zur Bestimmung und Kenntniss der phanerogamischen Gewächse dieser Provinz, Berlin, 414 pp.
- WIMMER F. 1841: Flora von preussischen und österreichischen Antheils oder vom oberen Oder-und Weichsel-Quellen-Gebiet. Ferdinand Hirt Verlag, Breslau, 464 pp.

ZAJĄC A. & ZAJĄC M. (eds) 2001: Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Kraków, 716 pp.
 ZATLOUKAL O. 1969: Nárys florografických a geobotanických poměrů Slezských Beskyd. [Diplomová práce]. Depon. in: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 171 pp.

Obr. 1. Topografické vymezení území (AOPK ČR 2009, upraveno). Zeleně jsou znázorněny hranice kvadrantů středoevropské mapovací sítě. Hranice studované oblasti je znázorněna červeně.

Fig. 1. Topographical definition of the surveyed area (AOPK ČR 2009, modified). The grids of the Central European grid system are marked green. Boundaries of the surveyed area are marked red.



Obr. 2. Vzácné druhy rostlin potvrzené ve zkoumaném území: a) *Dactylorhiza majalis* (Dolní Líštná, louka pod Jahodnou); b) *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *fuchsii* (Vendryně, louka pod psím hřbitovem); c) *Epipactis palustris* (Dolní Líštná, odkaliště); d) *Orchis mascula* subsp. *signifera* (Vendryně, okraj lesa na Vružné); e) *Epipactis helleborine* (Vendryně, u cesty od Vružnou); f) *Hepatica nobilis* (Dolní Líštná, les na Jahodné); g) *Monotropa hypophegea* (Dolní Líštná, odkaliště); h) *Pyrola rotundifolia* (Dolní Líštná, odkaliště).

Fig. 2. Rare plant species confirmed in the surveyed area: a) *Dactylorhiza majalis* (Dolní Líštná, meadow under Jahodná hill); b) *Dactylorhiza fuchsii* subsp. *fuchsii* (Vendryně, meadow under the dog cemetery); c) *Epipactis palustris* (Dolní Líštná, sludge bed); d) *Orchis mascula* subsp. *signifera* (Vendryně, forest edge on Vružná hill); e) *Epipactis helleborine* (Vendryně, along road under Vružná hill); f) *Hepatica nobilis* (Dolní Líštná, forest on Jahodná hill); g) *Monotropa hypophegea* (Dolní Líštná, sludge bed); h) *Pyrola rotundifolia* (Dolní Líštná, sludge bed).

